



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



Calligraph. 63 m. 1460



LELAND • STANFORD • JUNIOR • UNIVERSITY



Abhandlungen
der
Churfürstlich-bayerischen
Akademie
der
Wissenschaften
Neunter Band.
Philosophische Stücke.



THIS ITEM HAS BEEN MICROFILMED BY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
REFORMATTING SECTION 1994. CONSULT
SUL CATALOG FOR LOCATION.

München, mit akademischen Schriften. 1775.

Kurzes Verzeichniß

Der

In diesem Bande enthaltenen Stücke.

Ausführlicher Entwurf, wie man die Weiber be-
nutzen, und die Karpfen auf böhmische Art erziehen kön-
ne. von Wencesl. Max. Victorini. Seite 1.

Abhandlung von den Kegelschnitten. von Augu-
stin Torporch. Seite 17.

Untersuchungen über die ersten Gründe der Photo-
metrie. von Wencesl. Joh. Gustav Barsten. Seite 55.

Kurze Betrachtungen über einige Ursachen des all-
gemein werdenden Holzmangels in Deutschland, und über
die Mittel demselben abzuhelpen. von Karl August
Scheidt. Seite. 121.

Lithologische Beobachtungen. von Math. Brunn-
wieser. Seite. 153.

Abhandlung von den Kräften der Körper und der
Elemente. von P. Benedict Arbuthnot. Seite 179.

Abhandlung von dem Zusammenhang der Theile
in den Körpern, und dem Anhang der flüssigen Mate-
rien an die Solide. von Xaveri Epp. Seite 221.

Von der Nutzbarkeit der Wiesen und des Heu-
wuchses. von Hr. Anton Grafen von Seefeld. Seite
299.

Kurzes Verzeichniß

Der

In diesem Bande enthaltenen Stücke.

Ausführlicher Entwurf, wie man die Wehher benutzen, und die Karpfen auf böhmische Art erziehen könne. von Wencesl. Max. Victorini. Seite 1.

Abhandlung von den Kegelschnitten. von Augustin Torporch. Seite 17.

Untersuchungen über die ersten Gründe der Photometrie. von Wencesl. Joh. Gustav Barsten. Seite 55.

Kurze Betrachtungen über einige Ursachen des allgemein werdenden Holzmangels in Deutschland, und über die Mittel demselben abzuhelpen. von Karl August Scheidt. Seite. 121.

Lithologische Beobachtungen. von Math. Brunnwieser. Seite. 153.

Abhandlung von den Kräften der Körper und der Elemente. von P. Benedict Arbuthnot. Seite 179.

Abhandlung von dem Zusammenhang der Theile in den Körpern, und dem Anhang der flüssigen Materien an die Solide. von Xaveri Epp. Seite 221.

Von der Nutzbarkeit der Wiesen und des Heuwuchses. von Hr. Anton Grafen von Seefeld. Seite 299.

Entdeckung der Seleniten in der Nahbarbar.
von Johann Georg Model. Seite 317.

Ausnahme von den Gefäßen der Hydrostatick. von
Benedict Stattler. Seite 333.

**Abhandlung über die Preisfrage, ob und was
für Mittel es gebe, die Hochgewitter zu vertreiben, und
eine Gegend vor Schauer und Hagel zu bewahren.** von
P. Benedict Arbuthnot. Seite 399.

**Beantwortung der Preisfrage, welche die leichtes-
te und wohlfeilste Art vom Wasserbau sey u.** von Jo-
hann Helfenrieder. Seite 437.



Aus:

Ausführlicher
E n t w u r f ,
Wie man die Wenher benutzen, und die
Karpfen auf Böhmishe Art erzie-
hen könne.

von

Benzel Max Victorini,
Hochgräfl. Taufkirchischem Wirthschafter zu En-
gelburg.



Präliminaria.

Wenn die Weyher in einem Lande, oder auf einer großen Herrschaft einmal in rechten Stand hergestellet sind, so kostet die Erziehung der Karpfen das Jahr hindurch gar wenig; weil die Karpfen von keinen Getreidern, noch anderer Fütterung etwas nöthig haben; sondern alles bloß allein auf die Wissenschaft und einen besondern Fleiß ankommt. Das Einkommen aber erstrecket sich sehr hoch, nach dem allgemeinen Sprichwort in Böhmen.

Die Bräuhäuser, Schäfereyen, und Teich,
Machen die Böhmischen Herren reich.

Dieses verhält sich auch in der Wahrheit so; denn ob schon die anderen Einkünfte, als Getreid, Rind: Vieh, Holz, Stift u. hier zu Land ein nahmhafteſtes ertragen, so kommen sie dennoch bey weitem den drey angezogenen nicht gleich.

Die Bräuhäuser sind zwar hier Landes in großem Ansehen; werden aber die Unkosten; besonders da, wo man die Gerste,

hern fischen möge, denn die 2. kleineren Weyher können eben die Zahl eines großen Weyhers ausmachen, und eben den Nutzen bringen.

Nota.

Von rechts wegen sollte man vier Haupt-Karpfen-Weyher haben, und dieser 4te wird Brach-Weyher genannt, welcher nach der Ausfischung nicht mehr gesteckt wird, sondern ruhig, und so liegen bleiben muß.

Damit aber dieser in der Brach liegende Weyher nicht ohne Nutzen liege, so muß man Frühlingszeit, so bald man zur Erde kommen kann, in der Mitte des Weyhers gleich vom Zapfen-Haus anfangend, bis Ende des Weyhers, breite und tiefe Wasser-Graben auswerfen lassen, damit das Wasser abfließen, und bey ereignenden Güssen, durch den Wasser-Graben, und Grundrinnen abfließen könne: alsdenn bauet man in diesem Weyher, Gerste, Haber, Linsen, Kraut, Rüben, Erdäpfel ic. nach eingebrachten Früchten aber steckt und besetzt man den Weyher neuerdings mit Karpfen-Setzlingen, wo alsdenn die Fische vortreflich wachsen werden; will sich aber einer mit dem Anbauen keine Mühe geben, so kann man solchen gegen gewissen Geld-Erlag verpfichten.

2.

Die jetzt besagten 3. Haupt-Karpfen-Weyher mit tauglichen, und genugsam erwachsenen Karpfen-Setzlingen besetzen zu können, sind wenigstens 50. oder 60. Streck-Weyher zu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Schock, sie mögen groß oder klein seyn, anzulegen; je mehr Streck-Weyher man erschwingen und zuwege bringen kann, desto größern Nutzen hat man zu hoffen, und sie können mit geringen Unkosten hergestellt werden.

Von den Streichern, oder hier Landes- genannten Altvätern.

3

Wie man aber die Karpfen erziehen, und wachsen lassen soll: dieß ist erstlich zu bedenken, daß man einen erlesenen und vollständigen Fischweiber, und neben ihm einige Fischweiber, nachdem der Weiber viel oder wenig sind, habe, jedoch daß der Fischweiber nicht mehr davon verpöge, als drey; sonst würde seine Beschäftigung schlecht bestehen.

4

Die Altväter müssen von einer guten Gattung sein, und kommen aus Böhmen durch die Fischweiber die schönsten, größten, und besten 4. jährigen Negner- und Rübner-Karpfen, die von den andern Karpfen alle leicht ausgetrieben, und nicht eine einzige Nachzucht, weder an der Schuppen noch sonst anderswo haben, sondern ganz weiß, und erstündlich sind, bezieht, und erkaufet werden: deswegen muß man solche den Winter über auf die Weiber setzen, und recht ruhig stehen lassen.

5.

Nach Verfluß des Winters aber, so bald im Frühling alles Eis und Schnee von den Weibern wegzit, werden diese Altväter nach Größe des Webers, 6. 10. 15. 21. oder so viel es vermag, in solche Weiber, die recht tief, und auf feinem fließenden (wegen der Fische) sondern auf stehendem Wasser, das einen dast sandigen, und halt leichten Boden hat, auf 2. Negner 1. Rübner eingeworfen; zu diesen setzt man noch hinzu 1. Scheel oder 60. Stuch jährige Fische, damit die Karpfen leben, quasi was sie machen sollen, welche also 1. ganzes Jahr zum streichen stehen bleiben.

6.

Es haben gemeiniglich viele Fischmeister diese Superstition, daß man in Aussetzung der Altväter allzeit eine ungerade Zahl nehmen soll: ich habe es aber durch viele Jahre per Praxim selbst befunden, daß die gerade Zahl mir so viel gebracht, als die ungerade, weil solche gerade und ungerade Zahl keine Kraft hat, sondern erstlich der Segen Gottes, hernach der gute Grund und Boden des Weyhers das mehreste beytragen muß.

7.

Nach Verfluß eines Jahrs, fischet man im Frühling die- selbigen Streich-Weyher, und versetzet den Saamen, oder die Brut Schockweise in die hierzu verordneten Streck-Weyher, welche den Herbst zuvor wohl vermacht seyn sollen, damit keinem in Frühling etwas abgehe.

8.

Die Karpfen-Brut muß man einheimisch auferziehen, und vermehren, erstens wegen Ersparung der jährlichen Unkosten: zwey- tens, weil es vielmal geschiehet, daß man die benöthigte Brut weder ums Geld erfragen, noch bekommen kann, und statt einer guten Brut, Bastarden bekommt, die nur die Karpfen verderben, und hernach nichts, oder gar wenig zunehmen.

9.

Ich muß anbey noch dieses bekannt machen, daß man in kei- nen Haupt-Karpfen-Weyher, welcher auf einem fließenden Wasser liegt, oder Geröhr hat, Brut einsetzen soll: hat er fließend Was- ser, so fressen solche Brut die Hechte; hat er Geröhr, so werden
die

die Reiher, und andere dergleichen Wasser-Vögel ihre tägliche Lust im Fischfang haben.

10.

Ob schon der Weyher kein stießend Wasser hat, sondern ohne, dem groß ist, werden sich doch Hechten darinn finden, weil solche die Enten hinein tragen, und dieses geschieht im Netz, wann die Hechten streichen; da fressen die Enten den Saamen, und werfen ihn per Vomitum wieder in andere Weyher aus, und daher kommen die Hechten in die Weyher, ob man sie schon nicht hinein setzt.

11.

Dieses ist noch Anmerkens würdig, daß es sehr gefährlich sey, einen Haupt-Karpfen-Weyher mit Brut zu besetzen, weil zu besorgen ist, daß bey Fischung dessen man die Fische in der Reiher- und Hechten-Bäuchen suchen müßte.

Von den Streck-Weyhern.

12.

Ich habe Nro. 7. gemeldet, daß man den Karpfen-Saamen oder die Brut, Schockweise in die vorordneten Streck-Weyher versehen soll. Die Fischknechte müssen aber im voraus dahin bedacht seyn, und vor Einsetzung besagter Brut zur Frühlingszeit vor ausleinendem Wetter die Weyher alle wohl stecken, und mit geringsamem Wasser versehen, auch hin und her kleine Gräben machen, damit das Schnee- und Regen-Wasser allenthalben zufließen könne.

13.

der Weyher.

13.

Die besetzten Streck-Weyher bleiben mit den Seelingsen oder mit der Brut nur über einen Sommer stehen, und werden im Herbst alle wieder ausgefischet, und in die ausersehenen Kammer- oder Winter-Weyher versetzt.

14.

Jedoch dürfen die übern Sommer gestandenen, und im Herbst ausgefischten Streck-Weyher nicht gleich wieder gesteckt, und mit Wasser neuerdings angelassen werden, sondern sie müssen öd, und trocken liegen verbleiben, damit die Winter-Kälte und der Frost hieraus die Säure ausziehen möge; wenn das unterlassen wird, so werden die im Frühling eingesetzten Seelinge und Brut eine saure Nahrung finden, folglich wenig zunehmen.

Von den Kammer- oder Winter-Weyhern.

15.

Im Monat März, wann der Schnee hinweg, und das Eis in den Weyhern gänzlich zerschmolzen ist, können die Kammer-Weyher, nach diesen die Brut-Weyher, wenn es die Kälte zuläßt, jedoch im ersten Viertel besagten Monats gefischet, und die Seelinge und Brut dergestalt versetzt werden:

16.

Die Seelinge werden theils in die Haupt-Karpfen-Weyher, theils und zwar die kleinsten in die Streck-Weyher versetzt. Allhier muß man aber einen Ausschuß thun, und die größten Seelinge auf einen Sommer, das ist, auf 1. Jahr, die mittleren auf 2. Sommer,

Das

das

das ist, auf 2. Jahre, und die kleinsten Seelinge auf 3. Sommer, das ist, auf 3. Jahre, versehen: wenn ein Oeconomus dieses nicht weiß, und beobachtet, entziehet er seiner Obrigkeit einen merklichen Nutzen, denn wenn ich die obgemeldten 3. Gattungen Seelinge in einem Weyher auf drey Sommer zusammen thue, so geschieht leichtlich, daß die größten streichen, welche Brut man Bastard nennet, womit dann die Karpfen verderben, und nichts, oder gar wenig zunehmen werden; und wenn man auch die größten Seelinge, welche in einem Sommer können groß werden, mit den kleinen auf 3. Sommer versetzt, ist dieses ein nicht geringer Verlust und Schaden, weil der Gewinn, welcher in einem Jahre kommen würde, mit erst in 3. Jahren zukömmt.

Von den Haupt-Karpfen-Weyhern.

17.

In den großen Haupt-Karpfen-Weyhern sind sonst die Hechten nicht allein zu gedulden, sondern bringen einen großen Nutzen: erstlich kostet hier zu Land 1. Centner Hechten 20. fl., zum zweyten fressen sie viel Weiß- und andere Fische weg, die den Karpfen ihre Nahrung benehmen: darum in den Weyhern, wo es viele kleine Fische giebt, die Karpfen nicht gerne fett werden: obwohl man die kleinen Fische ebenfalls wohl verkauffen, und zu Gelde machen kann.

18.

Die Perschlinge hingegen, wiewohl sie in demjenigen Werth wie die Hechten stehen, sind den Karpfen-Weyhern sehr schädlich, weil sie die Karpfen im Winter mit ihren Stickslossen aus dem Lager jagen, und also diese aufstehen, und sterben, welches hernach einen großen Schaden verursachet. Die Schleihen aber sind in den Kar-

pfen, Weyhern die nutzbarsten Fische, weil sie durch ihr beständiges Aufwällen den Karpfen die Nahrung vermehren.

19.

Dieses ist bey den Karpfen-Weyhern auch sonderlich zu observiren, daß man sie im Winter bey hartem Frost, und großem Schnee alle Tag zweymal aufeisen lasse: man muß aber die Eislöcher nicht auf der Tiefe machen, wo sie ihr Lager haben, damit die Sonne sie nicht bescheine, indenn sie sonst aufrührisch werden, und in der Meinung, daß der Frühling schon vorhanden sey, aufstehen und verderben, sondern man muß auf der Seite, jedoch nicht allzuweit vom Lager aufeisen.

20.

Wenn sie aber auf- und abstehen wollen, so lassen sich etliche Tage zuvor große schwarze und breite Käfer sehen, nach diesen folgen die Hechte, und Verschlinge, und alsdenn die Karpfen, welche man nun auffangen, und alsobald in frisches Wasser bringen kann; dieselben kommen davon. Ich habe einst aus einem Weyher über 20. Centner, welche aufgestanden, auffangen, und alsobald in frisches Wasser bringen lassen; sie waren schier alle todt, so bald sie aber in das frische Wasser gekommen, sind sie so zu sagen wieder lebendig geworden.

21.

Es sind mir aus vielen Orten Recepte wider die Krankheit der Karpfen zu Handen gekommen, als Gaser, Brod von Weizen, Malz, heiße Ziegelsteine, Schaafmist, und Erbsen, Stroh, sammt anderen Sachen, welches alles man ganz heiß, nämlich das Brod und die Ziegelsteine, in den Weyher zu ihnen lassen soll.

soll; allein da die heißen Sachen der Natur der Fische ganz zuwider sind, so sterben sie vielmehr an diesen Mitteln, wie ich selbst solches probiret habe.

22.

Und wenn auch derley Dinge in sich selbst gut wären, so können sie doch einen großen Weyher, worinn das Wasser verderbt und stinkend geworden, nicht wieder frisch, und gut machen: denn sonst würden die Fische nicht aufstehen, weil augenscheinlich zu sehen ist, daß wenn die Fische in frisches Wasser kommen, sie wieder erquicket werden. Es ist auch falsch, daß die Fische unterm Eis und Schnee ersticken; nur die Vernachlässigung des Aufeisens, und die daraus entstehende Fäulung des Weyhers ist Ursache, wenn sie ersticken.

23.

Das allerbeste Mittel ist also, daß man erstlich die Weyher wohl aufeise: zweitens wenn es möglich, allezeit frisches Wasser durch die Weyher lasse: drittens, wenn man vermerkt, daß die Fische aufstehen wollen, oder schon wirklich aufgestanden sind, alle Gelegenheit suche, solche heraus zu fangen, in frisches Wasser zu bringen, und zu verkauffen.

24.

Noch ist bey diesen Weyhern hauptsächlich zu beobachten, daß bey Gieß- oder Fließbettern alle Rechen aufs fleißigste vermacht werden, damit kein Fisch durchschwimmen könne; sonst wird die Zahl bey der Fischung gar gering seyn, und ist eine aus den vornehmsten Ursachen, daß manchmal bey Fischung der Weyher so viel an der Zahl abgehe.

25.

Darum dann ein guter Oeconomus, oder Fischmeister die Weyher zum öftern besuchen, und den Fischknechten bey Strafe auferlegen soll, damit sowohl bey den Rechen, als Dockenhäusern kein einziger Sprüßel abgehe, auf daß die Fische nicht durchschwimmen können.

26.

Wenn aber ein oder anderer Haupt-Weyher viel Gerbhe hat, ist kein besseres Mittel, als daß man nach Ausfischung desselben den Weyher trocken werden lasse, einen Stichtief das Gerbhe sammt dem Roth auf einen nächstgelegenen Acker führe; sonst ist es schwer zu vertreiben, denn ob schon solches angezündet, und verbrannt wird, so wächst es doch nur desto dicker wieder hervor.

27.

Die großen Weyher müssen mit gutem steinernen Terras, guten starken Wasser-Rinnen, zu welchen das Holz im zunehmenden Mond muß gefällt werden, und welche auf fließenden Wasser liegen, mit guten großen und starken Fließbettern versehen seyn, auf daß, wenn Wassergüsse kommen, dieselben nicht abreißen, und um etliche 1000. fl. Schaden thun, worauf dann allezeit die beste Obacht muß gehalten werden.

Von den Weyhern insgemein.

28.

Mit wie viel an der Zahl ein oder anderer Weyher besetzt werden soll, kann man ausdrücklich nicht bestimmen, sondern der Fischmeister, oder der sonst hierüber die Oberaufsicht trägt, muß ig

den Fischen gründlich geübt seyn: er muß in acht nehmen, wie groß der Weyher sey, was dieser oder jener für ein Klima, und ob er einen mageren oder fetten Boden habe, was und wie viel Fett- und andere nughare Güte darein laufen können; alsdenn kann er nach seiner Ueberzeugung seine Abtheilung zu Papier bringen, und die Quantität der Fische a proportionem des Weyhers versehen.

29.

Es geschieht oft, daß man zwar schöne Weyher von Ansehen hat, jedoch aber die Fische darinn nicht allerdings wachsen und zunehmen wollen: man kann also, wo die Weyher einen mageren Boden haben, im Monat December oder Jenner bey der größten Kälte auf das Eis etwas Schaaf-Mist ausführen, und solchen ausbreiten lassen, damit die Fische, wann das Eis zerschmelzen wird, desto bessere Nahrung haben mögen.

Von Anlegung neuer Weyher.

Weil ich mich so weit gewagt, von Auferziehung der Karpfen alle Nothwendigkeiten vorzutragen, so wird mir zum Beschluß noch erlaubt seyn, etwas wenigens von Anlegung neuer Weyherbezug zu sehen.

30.

Will man einen neuen Weyher anlegen, so muß des Damms Fundament 2. Ellen tief gegraben werden. Wenn der Damm unten 12. Ellen breit ist, muß er oben das Drittel haben, nämlich 4. Ellen; der Grund wird mit leimigter oder fetter Erde, durch Schubkarren zugeführt, und gut ausgestossen. Alsdenn kann man bey diesem neugemachten Grund, vorne und hinten zur Aufführung

arbeitung wohl würdig. Sie werden gemeiniglich als algebraische Linien betrachtet: aus ihren Fundamentalgleichungen, und so genannten Formeln werden ihre Eigenschaften erklärt, und zum Beschluß beweiset man, daß sie eben jene Linien sind, welche bey den Alten Kegelschnitte hießen, ohne daß man weiter gehe, und um den Regel, in welchem jede gegebene algebraische Linie von dieser Gattung ihren Platz findet, oder um die Art und Richtung, wie sie in selbem gleichsam verborgen liegt, sich viel bekümmere. Wenigst habe ich noch keinen Autor gesehen, der dieses ausdrücklich abgehandelt hätte.

2. S. Ich dachte der Sache weiter nach, und glaubte nicht ganzlich unnütz zu schreiben, wenn ich diese kleine algebraische Lücke wie immer auszufüllen mich bestrebe. Der Gegenstand dieser Abhandlung ist also, zu zeigen, erstens wie jedem gegebenen Kegelschnitte der ihm zugehörige Regel, und zweitens wie die Lage des Kegelschnittes in seinem Regel zu bestimmen sey. Meine Leser werden die Gefälligkeit haben, und soviel Kenntniß der Geometrie, Trigonometrie und Algebra mitbringen, als Schriften von derley Art erheischen.

3. S. Wir wollen einige Beobachtungen voraus schicken, welche den Weg bereiten werden, das, was nachkömmt, klarer und gründlicher einsehen zu können. Es seyen (Fig. 1.) ABC und ADE Durchschnitte zweener gleichen Regel: GAF die Achse derselben: $a d$ der Durchmesser eines Kreises, der herauskäme, wenn der Regel durch a und d , das ist, durch die Achse vormal geschnitten würde. Man nehme in c einen unbeweglichen Punkt an, um welchen sich eine andere Linie fg als um ihr Centrum bewegt. Diese nenne ich die Fundamentalachse der Kegelschnitte. Ihr Theil $a d$ inner dem Regel heißt die Hauptachse: fa , was außer dem Regel ist, die Zwerchachse. So lange fg die Linie ad deckt, ist sie der Durchmesser, oder die Achse, und folglich sich selbst gleich. Der Theil fa sey die.



Abhandlung


von dem

Regelschnitten

von

Augustin Forporch.





1. §.



as großen Zuwachs sowohl die philosophischen als mathematischen Wissenschaften in unserm Jahrhunderte durch die Algebra erhalten haben, erkennen alle, welche sich die Mühe geben, das, was die Alten von diesen Wissenschaften wußten, mit dem unpartheyisch zu vergleichen, dessen sich unsre Zeiten mit Rechte rühmen können. Sie, die Algebra ist es, welche auch die abstractesten Gegenstände auf wahren praktischen Nutzen zu wenden weiß; wo unsre Vorfahrer bey zwar künstlichen, aber unfruchtbaren Beschauungen stehen geblieben sind. Unter diese Gattung gehören gewiß die beruffenen Kegelschnitte. Es war eine Zeit, wo man zwar im Stande war, viel von ihren Eigenschaften, Verhältnissen, Entstehungsart, u. s. a. herzusagen; aber ihr Daseyn in der Natur, die Geseze der Bewegung sowohl im luftvollen als leeren Raume durch sie zu erklären, sich mittelst derselben mit den ungeheuern, und so sehr entfernten Körpern unsers Weltsystems genauer bekannt zu machen, alles dieses war nur unsern Taugen vorbehalten. Diese krummen Linien dann sind es, welchen die heutige Philosophie so viel zu verdanken hat: und darum sind sie ja nicht nur unsrer speculativen Achtung, sondern auch weitem practischen Be-

arbeitung wohl würdig. Sie werden gemeiniglich als algebraische Linien betrachtet: aus ihren Fundamentalgleichungen, und so genannten Formeln werden ihre Eigenschaften erklärt, und zum Beschluß beweiset man, daß sie eben jene Linien sind, welche bey den Alten Kegelschnitte hießen, ohne daß man weiter gehe, und um den Regel, in welchem jede gegebene algebraische Linie von dieser Gattung ihren Platz findet, oder um die Art und Richtung, wie sie in selbem gleichsam verborgen liegt, sich viel bekümmere. Wenigst habe ich noch keinen Autor gesehen, der dieses ausdrücklich abgehandelt hätte.

2. §. Ich dachte der Sache weiter nach, und glaubte nicht gänzlich unnütz zu schreiben, wenn ich diese kleine algebraische Lücke wie immer auszufüllen mich bestrehe. Der Gegenstand dieser Abhandlung ist also, zu zeigen, erstens wie jedem gegebenen Kegelschnitte der ihm zugehörige Regel, und zweitens wie die Lage des Kegelschnittes in seinem Regel zu bestimmen sey. Meine Leser werden die Gefälligkeit haben, und soviel Kenntniß der Geometrie, Trigonometrie und Algebra mitbringen, als Schriften von derley Art erheischen.

3. §. Wir wollen einige Beobachtungen voraus schicken, welche den Weg bereiten werden, das, was nachkömmt, klarer und gründlicher einsehen zu können. Es seyen (Fig. 1.) ABC und ADE Durchschnitte zweener gleichen Regel: $GA F$ die Achse derselben: $a d$ der Durchmesser eines Zirkels, der herauskäme, wenn der Regel durch a und d , das ist, durch die Achse vormal geschnitten würde. Man nehme in c einen unbeweglichen Punkt an, um welchen sich eine andere Linie fg als um ihr Centrum bewegt. Diese nenne ich die Fundamentalachse der Kegelschnitte. Ihr Theil $a d$ inner dem Regel heißt die Hauptachse: fa , was außer dem Regel ist, die Zwerchachse. So lange fg die Linie ad deckt, ist sie der Durchmesser, oder die Achse, und folglich sich selbst gleich. Der Theil fa sey die

die Zwerchachse, und hier unendlich; denn es läßt sich auch bey dem Birkel wie ein Parameter, so eine Zwerchachse denken. Beweget man $f g$ aus a gegen A : bey der ersten Bewegung fängt sie sogleich an, die Achse einer Ellipse zu werden, wie z. E. 1 c 1. Beweget man sie weiter, so wird sie noch eine gute Zeit lang eine Achse verschiedener Ellipsen seyn, nämlich so lange, als sie die Seite $A C$ des Kegels durchschneiden kann. In einem Augenblicke, wo sie mit $A C$ parallel läuft, und also $A C$ nicht mehr berührt, z. E. in 2 c 2 hört sie auch auf, die Achse einer Ellipse zu seyn, und wird die Achse der Parabel, folglich unendlich. Die Zwerchachse $f a$ ist indessen auch immer weiter gegen A , oder was das nämliche ist, gegen der Seite $A D$ des Kegels $A D E$ gerückt; jetzt steht sie ebenfalls, weil sie mit 2 c 2 eine gerade Linie ausmacht, der Seite $A D$ parallel, und ist noch unendlich. Rückt $f g$ nur das mindeste aus seiner parallelen Richtung, so fährt zwar die Hauptachse fort, unendlich zu seyn: die Zwerchachse $a f$ aber wird endlich; indem sie $A D$ zu berühren anfängt. Hier fangen dann die Hyperbeln an, deren Hauptachse 3 c 3; die Zwerchachse $f 3$ ist. Doch siehet man, daß, wie weiter man $f g$ gegen A rückt, die Zwerchachse $f 3$ u. sich immer verkürze, bis sie endlich in A völlig verschwindet. Was wird aber in dieser Richtung aus der Hauptachse? und was wird aus der vorigen, so zu sagen, letzten Hyperbel? der Sachen Verständige sehen sogleich ein, daß sich die Hyperbel in einen Triangel verkehren, und $c A$, oder was eines ist, die Achse dieses Triangels werde. Rückt $c A$ oder $f g$ über A hinaus gegen d , so werden alsogleich neue, und von den vorigen ganz verschiedene Hyperbeln entstehen, und dieses so lange, bis die Fundamentalachse in 4 c 4 mit der Seite $A B$ und $A E$ der zween Regel parallel zu stehen kommt. Nun haben wir eine andre Parabel: von da aus giebt es wieder Ellipsen, bis endlich $f g$ abermal $a d$ deckt und die Achse oder der Durchmesser des vorigen Birkels $a d$ wird.

4. S. Nun hat die Fundamentalachse $f g$ ihre Reise durch alle Gattungen der Kegelschnitte vollendet. Sie hatte sie aber Stationenweise verrichtet. Im Zirkel ist sie ausgefahren, sodann sah sie das Land der kleinern Ellipsen: in der Parabel war die erste Station; von da aus kam sie in die Gegend der Hyperbeln (wir können sie ebenfalls die kleinern, oder die ersten nennen). Im Triangel hielt sie die zweite Station: nach diesem besuchte sie das Vaterland der größern Hyperbeln: die dritte Station nahm sie in der größern Parabel: aus welcher sie die größern Ellipsen durchlief, und endlich im Zirkel glücklich wieder nach Hause kam. Was das wunderlichste ist, hielt sie sich in den zwei Parabeln, und im Triangel nur einen Augenblick auf: ein gleiches würde sie auch im Zirkel thun, wenn wir sie als eine immer reisende Pilgerin annähmen.

5. S. Mein Leser wird mir diese scherzhaften Ausdrücke zugute halten. Wir wollen sogleich ernsthafter seyn, und ihm den nämlichen Weg in den bekannten algebraischen Formeln zeigen. Die Gleichung der Ellipse ist: (Algebra)

$$(a - x) x : y^2 = a : b.$$

In dem Zirkel ist $a = b$. Die Achse (der Durchmesser) ist dem Parameter gleich. So ist dann im Zirkel

$$(a - x) x : y^2 = a : a.$$

Also $(a - x) x = y^2$, welches die Gleichung des Zirkels ist. Mithin ist die einseitige Gränze der Ellipse der Zirkel. Wiederum in der Ellipse kann die Hauptachse immer wachsen, also kann sie auch unendlich werden. Wenn sie es ist, verändert sich die Gleichung

$$(a - x) x : y^2 = a : b,$$

in diese:

$$\infty x :$$

des Scheitels des Kegelschnittes von dem Scheitel des Kegels: der Winkel, den die Achse des Kegelschnittes mit der einen Seite des Kegels macht: die Linie $a c$ (Fig. 1. 2. 3. x.) und andere in sich unbestimmte Größen als bestimmt können angenommen werden: so habe ich doch, und wie ich leicht erweisen könnte, aus guten Gründen die Linie $a c$, als die unbestimmte Größe zur Auflösung ersagter Aufgabe gewählt. Was nun diese Linie $a c$ eigentlich sey, soll sogleich erklärt werden.

14 §. Der Keg. $A B F$ (Fig. 6.) sey geschnitten nach der Richtung $E c o F$, so sieht jedermann, daß der Kegelschnitt eine Ellipse sey, nämlich die krumme Linie $E b p F$. $E c$ sey eine gegebene Abscisse: $b c$ ihre Ordinate. $E o$ eine andere Abscisse: $p o$ ihre Ordinate. Schneidet man durch c den Keg. der Achse perpendicular, gleicher Weise durch o , so bestimmt man die Zirkel $a b d a$, und $m p n m$, deren Durchmesser $a d$, und $m n$ sind. Die Ordinate der Ellipse $b c$ ist demnach zugleich auch eine Ordinate des Zirkels $a b d a$, und $p o$ zu gleich eine solche in Ansehen des Zirkels $m p n m$. Nun ist aus der Geometrie bekannt, daß $b c$ die mittlere Proportional zwischen $a c$, und $c d$, wie auch $p o$ zwischen $m o$, und $o n$ sey. Es ist also

$$a c \times c d = b c^2$$

$$\text{und} \quad m o \times o n = p o^2$$

$a c$ ist demnach der eine Factor und $c d$ der andere der Quantität $b c^2$. $m o$ und $o n$ sind die Factoren der Quantität $p o^2$, folglich sind sie auch ihre Theiler. $a c$ ist daher nichts anders als der nach Willkür angenommene Theiler des Quadrats der kleinern bekannten Abscisse, und gleichwie jede Zahl durch unzählige kleinere Zahlen, wenn von ganzen und gebrochenen Theilern die Rede ist, kann getheilt werden: also kann auch $a c$ unzähligmal anders angenommen werden: ihre Gränze aber ist $b c^2$ selbst; denn in solchem Falle würde $c d = 1$ als der kleinste ganze Theiler werden.

jede andere zu der ihrigen. Z. E. es sey eine Abscisse $= x$, ihre Ordinate $= y$, eine andere Abscisse $= u$; ihre Ordinate $= z$, so wird seyn:

$$x : y = u : z.$$

welches die Gleichung für die proportionalen Triangel ist. Hier haben wir die zweite Gränze der Hyperbel den Triangel.

Sollte jemand an der Stärke des letzten Beweises zweifeln, der bedenke, daß in der Gleichung $ox + x^2b = oy^2$ das Zeichen $=$ die Gleichheit; in der Gleichung $(o+x)x : y^2 = o : a$ aber das Verhältniß anzeige, so ist aller Zweifel gehoben. Doch genug. Hier ist ein andrer Beweis: Das Verhältniß der Abscissen und Ordinaten in der Hyperbel ist dieses: (Algebra)

$$y^2 : z^2 = (a+x)x : (a+u)u.$$

a sey $= 0$, mithin

$$\begin{aligned} y^2 : z^2 &= 0 + x^2 : 0 + u^2, \\ &= x^2 : u^2. \end{aligned}$$

$$y : z = x : u.$$

$$x : y = u : z. \text{ wie oben.}$$

§. 1. Wir beobachten ferner, daß die Fundamentalachse, daſſe (Fig. 1.) von a nach 1. 2. 3. α . geht, den Winkel bey c immer ändere, also, daß er Anfangs spitzig, sodann recht, und zu letzt stumpf werde; der Winkel α hingegen unverändert bleibe: mithin muß der Winkel c im Anfange kleiner, einmal gleich, und nachgehends größer als der Winkel α werden. Fragt sich, wo jedes geschehe. Ich antworte: in den Ellipsen geschieht das Erste: in der Parabel das Zweyte: und in den Hyperbeln das Dritte.

Wenn bewiesen ist, daß der Winkel c dem Winkel α in der Parabel gleich sey, hat es ohnehin mit den übrigen seine Richtigkeit; dieses

dieses aber beweise ich also: der Winkel α ist gleich dem Winkel d , (3 S.) und weil die Fundamentalachse $2c2$ in der Parabel der Seite des Kegels AC parallel ist, (3 S.) ist der Winkel $2ca =$ dem Winkel Ada , also auch dem Winkel α . (geom.)

7. S. Sind die Winkel α und c in der Parabel gleich, so sind auch die ihnen entgegen gesetzten Seiten des Triangels $\alpha x c$ einander gleich. Wenn also der Winkel c kleiner ist als der Winkel α , wie in den Ellipsen geschieht, ist auch die Seite αx kleiner als $c x$; ist er größer, ist auch die ihm entgegen gesetzte Seite größer, welches den Hyperbeln zukommt. Aus dieser Beobachtung sind wir nun schon im Stande, in einem gegebenen Kegel mit dem Abstände A von α , und a von c die Lage der drey Kegelschnitte zwischen ihren Grenzen zu bestimmen.

8. S. Weil in der Parabel der Winkel α dem Winkel c gleich ist, wird auch der Winkel 3 dem Winkel A gleich seyn: also folget (6. 7. SS) daß, wenn der Winkel, den die Hauptachse des Kegelschnittes mit der Seite AB des Kegels macht, größer ist als der Winkel αAd des Kegels, der Kegelschnitt eine Ellipse sey: sind sie gleich, ist er eine Parabel: ist er kleiner, wird er eine Hyperbel seyn. Hier können wir aus einem andern Grunde, nämlich aus dem gegebenen Winkel des Kegels, und dem Winkel, den die Achse des Kegelschnittes mit der Seite des Kegels macht, die Gattung desselben wissen.

Es sey z. E. der Winkel des Kegels $= 50^\circ$, und die Achse des Kegelschnittes macht mit der Seite des Kegels 49° , giebt es sich von selbst, daß der Kegelschnitt eine Hyperbel sey; weil aber ihr Unterschied nur 1 Grad ist, welches in den kleinern Kegelschnitten, wie et-

Wann an den Sonnenuhren, nicht viel zu sagen hat, so wird ihre Zwerchachse noch ziemlich groß seyn, folglich wird sie von der Parabel nicht viel abweichen. Ich habe dieses Exempel sammt seiner Anmerkung geflüßentlich hergesetzt: es giebt Gelegenheit zu weiterm Denken.

9. S. In dem Regel $a A d$ (Fig. 2.) sey $a b d$ der halbe Birkel des Durchmessers $a d$. $E c o$ sey die Hauptachse eines Kegelschnittes, so ist $E c$ eine Abscisse und $b c$ ihre Ordinate. Bewegt sich $E c o$ um c wie immer, bleibt $b c$ unveränderlich, $E c$ aber verlängert oder verkürzt sich. Also kömmt es auf ihre Länge oder Kürze, oder was eines ist, auf die Größe des Winkels c oder E an, ob $E c$ die Abscisse einer Ellipse, Parabel, oder Hyperbel sey. Die in diesem Falle unveränderte Ordinate bleibt gleichgiltig, zu welcher Gattung der Kegelschnitte man sie bestimmen wolle.

10. S. Wir hatten bisher den Regel als beständig angenommen, und die verschiedenen Phänomene, welche durch die Bewegung der Fundamentalachse in selbstem entstehen, betrachtet. Wir wollen nun die Fundamentalachse mit unverändertem Winkel c von c nach E wachsen und zunehmen lassen, und was sich dabey ereignet, beobachten.

Es sey (Fig. 3.) Anfangs die Länge der Abscisse $= E c$, so ist der Regel $a E A d$, in welchen sie gehört. Wächst $E c$ bis in 1 , verändert sich nothwendig der Winkel $E a c$ in den Winkel $1 a c$, und entsteht ein neuer Regel $a 1 B e$. Ein gleiches geschieht, wenn $E c =$ wird $2 c$. da bekommen wir den Regel $a C f$, u. s. f. Wie nun mit verlängerter Abscisse $E c$ der Winkel a immer wächst, folglich jetzt kleiner, sodann gleich, und leztens größer als der Winkel c werden kann, also verändert sich (6 S) nach Beschaffenheit der Sache auch die Gattung des Kegelschnittes. Wir beobachteten anbey, daß die Linie $a d$ sich immer verkürze; indem sie jetzt $= a e$ nachgehends $= a f$, u. s. f. wird. Wird sie $= a c$, hat die Veränderung
des

des Kegels ihre Gränze erreicht, in so weit, daß $a d$ völlig verschwindet, und die Abscisse $c z$ mit der Seite $D c$ des letzten Kegels $a D$ überein kömmt, und also den Kegel nicht mehr schneiden kann. Auch die Ordinate $b c$ wird in diesem Falle $= 0$; denn weil $b c$ nicht nur allein die zur Abscisse $E c$ gehörige Ordinate ist, sondern auch zugleich die Ordinate der Birkel $a d$, $a e$, $a f$ &c. ausmacht: verliert sie in Rücksicht auf den Birkel $a d$ den Name und die Stelle der Ordinate, und wird dessen Tangent.

11. §. Bleibt die Länge der Abscisse $E c$ (Fig. 4.) und verändert sich nur der Winkel $a c E$, so daß er wird $\angle C = a c e$. $a c f$ &c. in diesem Falle ist es gegen den vorigen umgekehrt, nämlich hier nimmt der Winkel a immer ab, und $a d$ verlängert sich, wie in gleichen die Ordinate $b c$ immer wächst. Die Gränzen sind $a A + A d = a d$. Wo ebenfalls der $\Delta a A d$ verschwindet, und $a A + A d$ die Linie $a d$ deckt.

12. §. Ein gleiches geschieht, wenn $E c$ sammt dem Winkel ϵ unverändert ist; die Linie $a c$ aber wächst, wie die 5te Figur ohne hin selbst zeigt.

13. §. Aus diesen verschiedenen Fällen ersieht man, wie vielen ja unzähligen Veränderungen sowohl die Kegelschnitte selbst, als die ihnen zugehörigen Kegel unterworfen sind. Und wenn wir die Sache reif bedenken, finden wir, daß eben der nämliche Kegelschnitt ohne seine Gattung zu verändern in verschiedenen Kegeln Platz habe, also zwar, daß die Aufgabe: jedem Kegelschnitte seinen Kegel, und dessen Lage in demselben anzuweisen, eine unbestimmte Aufgabe sey, das ist eine solche, in welcher eine gewisse Größe willkürlich angenommen wird. Obwohl aber diese Größe in ihrer Gattung selbst verschieden ist; indem z. B. der Scheitelwinkel des Kegels; die Entfernung

des Scheitels des Kegelschnittes mit dem Scheitel des Kegels: der Winkel, den die Abse des Kegelschnittes mit der einen Seite des Kegels macht: die Linie $a c$ (Fig. 1. 2. 3. 4.) und andere in sich unbestimmte Größen als bestimmte Zahlen angenommen werden: so habe ich doch, und wie ich auch anderen Sinne, aus gleicher Ursache die Linie $a c$, als die unbestimmte Größe zur Aufklärung erhaltener Aufgäbe genommen. Alles was diese Linie $a c$ eigentlich ist, soll sogleich erklärt werden.

14. §. Der Kreis $A B F$ (Fig. 5.) sey geschnitten nach der Richtung $E c o F$, so sey wiederum, daß der Kegelschnitt eine Ellipse sey, nämlich die kleinere Linie $E k p F$. $E c$ sey eine gegebene Abscisse: $b c$ ihre Ordinaten. $E o$ eine andere Abscisse: $p o$ ihre Ordinaten. Schneidet man durch c den Kreis der Ellipse perpendicular, gleicher Weise durch o , so bestimme man die Punkte $a i d a$, und $m p n m$, deren Durchmesser $a d$, und $m n$ sind. Die Ordinate der Ellipse $b c$ ist demnach zugleich auch eine Ordinate des Punktes $a i d a$, und $p o$ ist gleich einer solche m d. h. des Punktes $m p n m$. Nun ist aus der Geometrie bekannt, daß $b c$ die mittlere Proportional zwischen $a c$, und $c d$, wie auch $p o$ zwischen $m o$, und $o n$ sey. Es ist also

$$a c \times c d = b c^2$$

$$\text{und} \quad m o \times o n = p o^2$$

$a c$ ist demnach der eine Factor und $c d$ der andere der Quantität $b c^2$. $m o$ und $o n$ sind die Factoren der Quantität $p o^2$, folglich sind sie auch ihre Theiler. $a c$ ist daher nichts anders als der nach Willkür angenommene Theiler des Quadrats der kleinern bekannten Abscisse, und gleichwie jede Zahl durch unabhngige kleinere Zahlen, wenn von ganzen und gebrochenen Theilen die Rede ist, kann getheilt werden: also kann auch $a c$ unabhngigmal anders angenommen werden: ihre Grnze aber ist $b c^2$ selbst; denn in solchem Falle wrde $c d = 1$ als der kleinste ganze Theiler werden.

15. S. Ich kann nicht umhin einige nützliche Anmerkungen hier einzurücken. Erstens der Leichtigkeit in bevorstehender Berechnung halber, sollen $a c$ und $c d$, wenn es sich thun läßt, als ganze Zahlen ohne Bruch bestimmt werden; zu dem Ende kann man gleich anfangs alle ganze Theiler von $b c^2$ suchen (Arithm.), und aus selben einen für $a c$ erwählen. Ist $b c^2$ eine Primzahl, so nehme man wenigstens $a c$ als ein ganzes an, der Bruch bey $c d$ macht ohnehin keine große Schwierigkeit in der Berechnung. 2 Wenn $a c$ angenommen ist, wird $c d$ entweder größer, oder gleich, oder kleiner als $a c$ seyn. Aus diesem siehet man schon vorläufig, wie der Stand der Achse des Kegelschnittes in dem Regel selbst werde herauskommen; denn ist $a c < c d$, so fällt der Punkt c disseite der Achse des Regels $A x y$ (Fig. 6.) und die Achse des Kegelschnittes schneidet erst unter $a d$ die Achse des Regels. Ist $a c = c d$, so schneidet jene diese in x und folglich ist $a c = a x = c d = b c$ der Ordinate selbst. Dieses aber wird allzeit geschehen, wenn man $a c = b c$ annimmt. Ist $a c > c d$, so fällt c zwischen x und d , und die Achse der Ellipse (ein gleiches ist auch von den andern Kegelschnitten zu sagen) hat die Achse des Regels schon ober $a d$ durchkreuzet.

16. S. Nun nach so vielen, doch wie mich dünkt, zur Erläuterung der Sache sehr dienlichen Vorbereitungen schreiten wir zur Auflösung der Aufgabe selbst.

Wir verlangen zu dem Ende mehr nicht, als zwei gegebene Abscissen, und die ihnen zugehörigen Ordinaten. Wir haben nicht vonnöthen, die Gattung des Kegelschnittes, ob es z. E. eine Parabel oder Hyperbel sey, zu wissen, dieß giebt die Auflösung der Aufgabe selbst, wie wir erfahren werden. Wir wollen alles so gleich in einem practischen Exempel zeigen.

17. S. Es wird gegeben eine Abscisse = 12, 00, ihre Ordinate
D 2
nate

N. 2. Suche die Linie $m o$.

$$E c = 7660 = 3.88422.$$

$$a c = 9848 = 3.99334.$$

$$E o = 12000 = 4.07918.$$

$$\underline{8.07252.}$$

$$m o = 15428 = 4.18830.$$

N. 3. Suche $o n$.

$$o p = 10755 = 4.03160.$$

$$\sigma p^2 = 8.06320. \quad \text{2. multi.}$$

$$\text{dit. mit } m o = 15428 = 4.18830.$$

$$o n = 7498 = 3.87490.$$

$$+ m o = 15428.$$

$$m n = 22926.$$

N. 4. und 5.

$$E o = 12000.$$

$$- E c = 7660.$$

$$\underline{e o = 4340.}$$

$$a d = 19285.$$

$$\frac{1}{2} a d = 9642 = a x.$$

$$a c = 9848.$$

Hier sehen wir, daß $a c >$ ist als $\frac{1}{2} a d = a x$, also fällt der Punkt c jenseits der Achse $A x y$ zwischen x und d , etwann wie in der 7 Figur. Dergleichen hypothetische Figuren dienen, wie ich bereits im 17 S gemeldet habe, sehr gut, ohne daß sie in allen wahr seyn dürfen, ja es nicht einmal als von ohngefähr seyn können, gleichsam die Hand in fernerer Berechnung zu leiten. Man soll dann in der 7 Figur, welche jetzt statt der 6 angenommen wird, $q o$ finden, und siehet so gleich, was man zu thun hat; denn die Figur zeigt,

E 2

daß

nate = 5, 00, und eine andere Abscisse = 38, 88 sammt ihrer Ordinate = 9, 00. Man soll auch ohne zu wissen, was es für eine Gattung der Kegelschnitte sey, den Keget, die Lage dieser krummen Linie in demselben, und folglich auch die Gattung suchen. Es ist mithin (Fig. 6.) $Ec = 12, 00$. $bc = 5, 00$, $EO = 38, 88$. $op = 9, 00$. In der Figur wird die Wahrheit nicht erfordert, sie dienet ohnehin nur der Phantasie, und leitet in der Berechnung. Weil die Decimalfractionen zur Genauigkeit der Berechnungen von dieser Art sehr vieles beytragen, so habe ich sie nicht weglassen wollen, aus dieser Ursache gebrauche ich mich auch durchgehens der Logarithmen. Man bestimme demnach

N. 1. die Linie ac . z. B. = 4, 00 und suche

ad

$$bc = 5, 00 = 2.69897. \quad \text{mit 2 multi.}$$

$$bc^2 = 5.39794.$$

$$\text{div. mit } ac = 4, 00 = 2.60206.$$

$$\text{Also ist } cd = 6, 25 = 2.79588.$$

$$ac = 400.$$

$$+ cd = 625.$$

$$ad = 1025.$$

$$\frac{1}{2} ad = 512. = ax.$$

N. 2. Man suche die Linie mo . Der $\triangle aEc$ ist proportional

dem $\triangle mEo$. sage:

$$\text{Wie } Ec = 1200 = 3.07918.$$

$$\text{zu } ac = 400 = 2.60206.$$

$$\text{Also } Eo = 3888 = 3.58972.$$

$$6.19178.$$

$$\text{zu } mo = 1296 = 3.11260.$$

N. 3. Man suche on . Da p o die mittlere Proportional zwischen m o und o n ist, (13. S.) so läßt sich o n also finden:

$$\begin{array}{r} op = 900 = \underline{2.95424.} \text{ mit 2 mult.} \\ op^2 = \underline{5.90848.} \\ \text{div. mit } mo = \underline{3.11260.} \\ \text{Also } on = 625 = \underline{2.79588.} \\ mo = 1296. \\ 4\ on = 625. \\ mn = \underline{1921.} \end{array}$$

N. 4. Aus c ziehe man c q zu m n perpendicular, so bekommt man einen rechtwinklichten $\triangle c$ q o . Weil auf diesen \triangle fast alles ankommt, und selber gleichsam den Ausschlag der ganzen Berechnung giebt: wollen wir ihn zum Unterschiede der andern $\triangle\triangle$ den Haupttriangel nennen.

N. 5. In diesem Haupttriangel kann man wissen 1 die Seite c o oder die Hypotenuse. 2 Die Seite o q , und sodann durch die Trigonometrie seine Winkel; Die Hypotenuse wird also gefunden:

$$\begin{array}{r} Eo = 3888. \\ - Ec = \underline{1200.} \end{array}$$

Die Hypotenuse c $o = 2688.$

Die Seite o q läßt sich zwar allzeit finden; doch weil der Haupt \triangle in verschiedenen Fällen auch in seiner Lage verschieden ist, so ist die Art ihn zu bestimmen nicht allzeit die nämliche. Wenn man sich die Lage der Hauptachse aus dem, was man bereits von selber durch die Berechnung weiß, in einem Regel (Fig. 6.) beyläufig zeichnet, giebt sich die Bestimmung der Seite o q von selbst. In gegenwärtigem Exempel ist a $c = 400$ kleiner als $\frac{1}{2} a$ $d = ax = 512$ (n 1 huius §) folglich fällt der Punkt c zwischen a und x disjunct der Achse Ax ,
mit

mithin fällt auch der Punkt q zwischen m und y , und qy ist $= cx$
 $= ax - ac = 512 - 400 = 112$.

$$yo = yn - on = \frac{1}{2} mn - on.$$

mn aber ist $(n. 3.) = 1921$. Ihre Hälfte $= 961$. on ist $= 625$, also
 ist $yn - on = 961 - 625 = 336 = yo$. Es ist demnach qo , wie die
 sechste Figur selbst zeigt, $= qy + yo = 112 + 336 = 448$. Auf
 solche Art wird in unserm Falle die Seite qo bestimmt. Wer diese
 Weise sie zu suchen wohl einsieht, kann sich in andern Fällen
 auch leicht helfen. Die nachkommenden Exempel werden die Sa-
 che noch mehr beleuchten.

N. 6. Es sind mithin in dem Haupt \triangle die Hypotenuse co
 $= 2688$, und die Seite $qo = 448$ bekannt. Man sucht mit diesen den
 Winkel c .

$$co = 2688 = 3.42942.$$

$$\text{Sin. totus} = 10. \underline{\hspace{2cm}}$$

$$qo = 448 = 2.65127.$$

$$\text{Der Winkel } c = 9^\circ. 35'. 39'' = 9.22185.$$

$$\text{Der Winkel } o = 80. 24. 25.$$

Der Winkel o des Haupt \triangle ist gleich dem Winkel acE des
 $\triangle Eac$ (Geom.) folglich und

N. 7. Haben wir im $\triangle Eac$ drey Data, 1. die Seite ac
 $= 400$. 2. Die Seite $Ec = 1200$, und 3. den eben jetzt gefun-
 denen Winkel $acE = 80^\circ. 24'. 21''$. Es lassen sich also die übrigen
 Winkel sammt der Seite Ea bestimmen.

$$Ec = 1200.$$

$$+ ac = 400.$$

Also 1600. die Summe der beyden Seiten.

$$Ec - ac = 800 \text{ der Unterschied derselben.}$$

Weil der Winkel $acE = 80^\circ. 24'. 21''$, so ist die Sum-
 me

me der unbekannten Winkel $= 99^{\circ}. 35'. 39''$, die halbe Summe derselben $= 49^{\circ}. 47'. 49''$.

$$1600 = 3. 20412. \quad (\text{Trig.})$$

$$800 = 2. 90309.$$

$$\text{Tang. } 49^{\circ}. 47'. 49'' = 10. 07305.$$

$$\hline 12. 97614.$$

$$\text{Tang. des halben Unt. } 9. 77202. = 30^{\circ}. 36'. 30''.$$

$$\text{Mithin ist der größte Winkel} = Eac = 80^{\circ}. 24'. 19''.$$

$$\text{und der kleinere} = aEc = 19^{\circ}. 11'. 19''.$$

N. 8. Suche letztlich die Seite Ea .

$$\angle Eac = 80^{\circ}. 24'. 19'' = 9. 99387.$$

$$Ec = 1200. = 3. 07918.$$

$$\text{Sin. } \angle a c E = 80. 24. 21. = 9. 99387.$$

$$Ea = 1200 = 3. 07918.$$

Also ist die Seite $Ea =$ der Seite Ec , wie in gleichen auch der Winkel a dem Winkel c gleich ist, der Unterschied von $2''$ kommt ohnehin nicht in Betrachtung. Man siehet demnach (§ 6 & 7), daß die Berechnung selbst die Gattung des gegebenen Kegelschnittes verrathe, so wie sie hier sagt, daß unser Kegelschnitt eine Parabel sey, dessen Regel im Scheitelwinkel $= 19^{\circ}. 11'. 19''$; denn in der Parabel ist nothwendig der Winkel $E =$ dem Winkel A . Ueber das habet ihr die Lage der Achse dieser Parabel; indem sie dem Winkel aEc gleich ist: folglich macht die Achse mit der Seite Aa des Regels einen Winkel $= 19^{\circ}. 11'. 19''$, und bleibt nichts mehr übrig, als daß wir

N. 9. Die Entfernung des Scheitels des Kegelschnittes von dem Scheitel des Regels $=$ der Linie AE suchen.

$$\text{Sin. } \angle a A d = 19^{\circ}. 11'. 19'' = 9. 51679.$$

$$(n 1) a d = 1025 = 3. 01072.$$

$$\text{Sim. } \angle A d a = 30, 24, 19 = 9, 99387.$$

$$\underline{13, 00459.}$$

$$A a = 3075. = 3, 48789.$$

$$- E a = 1200.$$

$$\underline{A E = 1875.}$$

N. 10. Will man sich einen klaren Begriff von dieser ganzen Operation machen, so zeichne man (Fig. 11.) Tab. 2. den Ke gel $B A C$, dessen Scheitelwinkel $= 19^\circ. 11'. 19''$. man setze von A in E 1875 Theile eines beliebigen Maasstabes, und ziehe in E eine Linie Ec , welche mit AC parallel läuft, oder was eines ist, welche mit AB einen Winkel $= 19^\circ. 11'. 19''$ macht, so ist sie die Achse der Parabel. Man mache $E a = 1200$, und ziehe $a d$ der Achse des Kegels perpendicular, so wird sie die kleinere Abscisse Ec selbst abschneiden. Man mache $E o = 3888$, und ziehe durch den Punkt o zu $a d$ die Parallel $m n$. Aus c lasse man auf $m n$ eine Perpendicular $c q$ fallen &c. und wenn man die verschiedenen Linien, die wir oben durch die Berechnung gefunden haben, mit diesen im Riße vergleicht, besonders wenn selber was größers ist; so wird man eine Gattung von Beweis überkommen, daß die Operation richtig sey. Einen genauern Beweis aber werden wir weiter unten finden. Wir wollen noch zwey Exempel von den zwey andern Gattungen der Kegelschnitte her setzen; doch die Berechnung so kurz zusammenziehen, als es ohne unverständlich zu werden möglich ist.

$$18. \text{ S. Es sey (Fig. 6) } E c = 7, 660. b c = 9, 640. E o = 12, 000. o p = 10, 755. a c = 9, 848.$$

$$\text{N. 1. } b c = 9640 = 3, 98407. \text{ mit 3 multi.}$$

$$\underline{b c^2 = 7, 96812.}$$

$$\text{div. mit } a c = 9848 = 3, 99334.$$

$$\underline{c d = 9437 = 3, 97480.}$$

$$\underline{a c + c d = a d = 19286.}$$

N.

N. 2. Suche die Linie $m o$.

$$E c = 7660 = 3.88422.$$

$$a c = 9848 = 3.99334.$$

$$E o = 12000 = 4.07918.$$

$$\underline{8.07252.}$$

$$m o = 15428 = 4.18830.$$

N. 3. Suche $o n$.

$$o p = 10755 = 4.03160.$$

$$\underline{o p^2 = 8.06320.} \quad \text{2. mult.}$$

$$\text{dit. mit } m o = 15428 = 4.18830.$$

$$o n = 7498 = 3.87490.$$

$$+ m o = 15428.$$

$$\underline{m n = 22926.}$$

N. 4. und 5.

$$E o = 12000.$$

$$- E c = 7660.$$

$$\underline{c o = 4340.}$$

$$a d = 19285.$$

$$\frac{1}{2} a d = 9642 = a x.$$

$$a c = 9848.$$

Hier sehen wir, daß $a c >$ ist als $\frac{1}{2} a d = a x$, also fällt der
 mlt c jenseits der Achse $A \times y$ zwischen x und d , etwann wie in
 : 7 Figur. Dergleichen hypothetische Figuren dienen, wie ich be-
 ts im 17 § gemeldet habe, sehr gut, ohne daß sie in allen wahr-
 m dürfen, ja es nicht einmal als von ohngefähr seyn können, gleich-
 n die Hand in fernerer Berechnung zu leiten. Man soll dann in
 : 7 Figur, welche jetzt statt der 6 angenommen wird, $q o$ finden,
 d siehēt so gleich, was man zu thun hat; denn die Figur zeigt,

E 2

daß

Daß $q o = \text{sen } m n - m y (= \frac{1}{2} m n) - y q (= x c) - o n$
 $c x \text{ aber} = x d = a c - a x.$

Es ist demnach $m n (n. 3. = 22926.$

$$\frac{1}{2} m n = 11463 = m y.$$

$$a c = 9848.$$

$$- a x = 9642.$$

addire diese drey. $\begin{cases} c x = 206 = y q. \\ o n (n. 3.) = 7498. \\ m y = 11463. \end{cases}$

Summe = 19197. diese ziehe ab

$$\text{von } m n = 22926.$$

$$\text{also ist } q o = 3759.$$

N. 6. In dem Haupt \triangle suche den Winkel $c.$

$$c o = 4340 = 3. 63748.$$

$$R. = 10. \text{-----}$$

$$q o = 3759 = 3. 57507.$$

$$< c = 60^\circ = 9. 93759.$$

$$< o = 30^\circ = < a c E \text{ des } \triangle E a c.$$

N. 7. Suche in dem $\triangle E a c$ die Winkel.

$$E c = 7660.$$

$$+ a c = 9848.$$

$$\text{die Summe der Seiten} = 17508.$$

$$\text{Ihr Unterschied} = 2188.$$

$$< c = 30^\circ.$$

Die Summe der zu suchenden Winkel = 150° . die halbe
 Summe = 75° .

$$17508 = 4. 24323$$

$$2188 = 3. 34004$$

Tang.

$$\text{Tang. } \angle C = 75^\circ = 10.57194.$$

$$13.91198.$$

$$\text{Unterschied} = 25^\circ = 9.66875.$$

$$\text{Also ist der Winkel } a E c = 100^\circ.$$

$$\text{und } E a c = 50^\circ.$$

2. mult.

$$\text{der Winkel } a \text{ und } d = 100.$$

$$\text{folglich der Winkel } A = 80.$$

N. 8. Suche auch die Seite $E a$.

$$\text{Sin. } \angle a = 50^\circ = 9.88425.$$

$$E c = 7660 = 3.88422.$$

$$\text{Sin. } \angle c = 30^\circ = 9.69897.$$

$$13.58319.$$

$$E a = 5000 = 3.69894.$$

N. 9. Suche $A E$. Im $\triangle A a d$. ist

$$\text{Sin. } \angle A = 80^\circ = 9.99335.$$

$$a d = 19285 = 4.28521.$$

$$\text{Sin. } \angle d = 50^\circ = 9.88425.$$

$$14.16946.$$

$$A a = 15000 = 4.17611.$$

$$- E a = 5000.$$

$$A E = 10000.$$

Wenn man also in einem Kegel den Scheitelwinkel $= 80^\circ$ macht, und in der Entfernung von selbem $= 100$, o die Achse des Kegelschnittes dergestalt zieht, daß sie mit der Seite des Kegels $A B$ einen Winkel $= 100^\circ$ macht, so hat man, was man gesucht, und weil

der Winkel $E a c = 50^\circ$ größer ist als der Winkel $E c a = 30^\circ$, und ingleichen $E c$ größer als $E a$, folget, (S. 6 & 7) daß dieser Kegelschnitt eine Ellipse sey. Man kann anbey, wie n. 10 vorigen § angezeigt worden, den Riß der ganzen Berechnung machen, in selbstem neben andern auch die Hauptachse der Ellipse finden, und sich wegen der Richtigkeit der Berechnung selbst überzeugen.

19. §. Da die Hyperbeln die meiste Verschiedenheit unter sich und in ihrer Gattung haben können, wie aus dem 3 und 4 § erhellt; so wollen wir auch von diesen ein und anders Beispiel hersehen, und uns eben der vorigen Kürze bedienen. Man wird in selbstem besonders wegen Berechnung des Haupt Δ den Unterschied von den andern Kegelschnitten zu bemerken haben. Die gegebenen Sätze sind denmach die Abscisse $E c = 8$. Ihre Ordinate $b c = 6$. Die zweyte Abscisse $E o = 22$. Ihre Ordinate $p o = 15$. $a c = 5$. Wir wollen indessen annehmen, daß (Fig. 8) der Regel $m A n$ der Wahre, und die Achse $E c o$ in ihrer wahren Lage sey.

Wenn $a c = 5$, und $b c^2 = 36$, so ist $c d = 7, 20$, und $a d = 12, 20$. $\frac{1}{2} a d = 6, 10$, suche also $m o$:

$$\begin{array}{r}
 E c = 8, 00 = 2. 90309. \\
 a c = 5, 00 = 2. 69897. \\
 E o = 22, 00 = 3. 34242. \\
 \hline
 6. 04139. \\
 \hline
 m o = 13, 75 = 3. 13830. \\
 \hline
 p o^2 = 22500 = 4. 35218. \\
 \text{div. mit } m o = 1375 = 3. 13830. \\
 \hline
 o n = 16, 36 = 1. 21388. \\
 + m o = 13, 75. \\
 \hline
 m n = 30, 11.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} a d = a x = 610. \\ - a e = 500. \\ \hline c x = 110. \end{array}$$

Weil $a x > a c$: so fällt die Achse des Kegelschnittes $E c o$ hen a und x .

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} m n = 1505. \\ o n = 1636. \end{array}$$

Da $o n > \frac{1}{2} m n$, muß der Punkt o der Achse zwischen m und y fallen, und also die Achse des Kegelschnittes, die Achse des Ellipses auch im Punkte o noch nicht durchschneiden.

Nach der 8 Figur, die wir vor Händen haben, ist klar und bar, daß $o q = m o - m q$:

$$m q \text{ aber} = m y - c x \text{ sep.}$$

$$\begin{array}{r} m y = 1505. \\ - c x = 110. \\ \hline m q = 1395. \end{array}$$

Es ist aber $m o = 1375$ folglich kleiner als $m q$.

Also muß der Punkt o nicht zwischen q und y sondern zwischen m und q fallen, und die Achse des Kegelschnittes divergirt von der Achse des Kegels, etwann wie Fig. 9. Nach dieser dann ist $o q$ zu bestimmen. Wir sehen aber alsogleich, daß $o q = m y - q y - c x - m o = 1505 - (110 + 1375) = 0$, 20 sep. Ich habe in Fall umständlicher abgehandelt, theils zu zeigen, wie in andern Fällen zu verfahren sey, theils abermal zu beweisen, daß, wenn man auch die Gattung des Kegelschnittes anfangs nicht wüßte, die Berechnungsart unumgänglich auf den mindesten Vorfall uns zu leite.

Es kann demnach (Fig. 9.) in dem Haupt $\triangle o c q$ der Winkel c gefunden werden :

$E c$

$$\begin{array}{r}
 E c = 2272. \\
 - E z = 800. \\
 \hline
 c o = 1472. \\
 c o = 1472 = 1.14512. \\
 K. = 12. \\
 o q = 0.20 = 1.20102. \\
 \hline
 < c = 49' 6'' = 1.15451.
 \end{array}$$

Hier ergibt sich die Anmerkung, daß, da der Winkel c so klein, die Lage der Achse der Symmetrie mit der Achse des Kreises fast parallel laufe, und also sich der Fall erweisen konnte, daß $o q$ mit dem ganzen Haupt Δ verschwinde: welches aber nur in der Hyperbel, und über das nur, wenn die zwei Achsen parallel sind, geschieht. Daher, wenn man den Kreis nicht gar genau bestimmen will. Kante man die zwei Achsen als wirklich parallel annehmen: wo die Berechnung weit leichter und kürzer abzuwickeln würde, wie wir im nächsten S sehen werden. Indessen wollen wir doch die gegenwärtige Aufgabe völlig ausmachen. Der Winkel g im Punkt Δ ist also $= 49' 6''$. So lange $c o$ jenseits der Perpendicularen $c q$ liegt, wie in den vorhergehenden Exempeln geschieht, war der Winkel $c o q =$ dem Complement des Winkels $g c o$ also: das Maas des Winkels $E c a$: da aber hier die Linie $c o$ die Perpendicularen passiert hat, und der Winkel $E c a$ nunmehr ein stumpfer Winkel ist, ist auch das Maas desselben sein ihm verticalentgegenstehender Winkel $o c x = 90^\circ + o c q = 90^\circ + 49' 6''$. Dieser Fall glaube ich, macht, daß dieses dritte Exempel nicht für die lange Weile hier stehe. Man sehe, wie sich die Fälle abändern, und wie jedem zu begegnen sey. Da nun man im $\Delta a c E$ $a c = 500$, und $E c = 800$ mit dem von denselben eingeschlossenen stumpfen Winkel $= 90^\circ + 49' 6''$ haben, können wir wie oben, die übrigen Winkel stamm der Seite $E a$ finden:

von den Regelschnitten.

41

$$ac = 500.$$

$$Ec = 800.$$

$$\text{die Summe} = 1300.$$

$$\text{der Unterschied} = 300.$$

$$\text{die Summe der unbekannten Winkel} = 89^\circ. 10'. 54''.$$

$$\text{die halbe Summe} = 44. 35. 27.$$

$$1300 = 3. 11394.$$

$$300 = 2. 47712.$$

$$\text{Tang. } 44^\circ. 35'. 27'' = 9. 99379.$$

$$12. 47091.$$

$$\text{der halbe Unt.} = 12^\circ. 49' = 9. 35697.$$

$$\text{Ist also der Winkel } Eac = 57^\circ. 24'. 27''.$$

$$\text{und der Winkel } aEc = 31. 46. 27.$$

$$\text{Sin. } \angle a = 9. 92557.$$

$$Ec = 2. 90309.$$

$$\text{Sin. } \angle c = 9. 99995.$$

$$12. 90304.$$

$$Ea = 949 = 2. 97747.$$

$$\angle a = 57^\circ. 24'. 27''.$$

$$114. 48. 54.$$

$$65. 11. 6. = \angle aAd.$$

$$\text{Sin. } \angle A = 65. 11. 6. = 9. 99792.$$

$$ad = 1220 = 3. 08635.$$

$$\text{Sin. } \angle a = 57. 24. 27. = 9. 92557.$$

$$13. 01192.$$

$$Aa = 1132 = 3. 05400.$$

$$Ea = 949.$$

$$AE = 183.$$

§

Der

Der Regel dann, in dem diese Hyperbel Platz findet, hat im Scheitelwinkel $65^{\circ} 11' 6''$, die Scheiteln sind 183 Theile entfernt, und die Neigung der Hyperbel gegen die Seite des Kegels AK ist $31^{\circ} 46' 27''$.

20. S. Jede Hyperbel in verticaler Lage, nämlich also, daß ihre Achse mit der Achse des Kegels parallel stehe, in den Regel zu bringen, kann auf nachfolgende Art geschehen. Wir nehmen die vorige Hyperbel zum Exempel, in welcher $Ec = 800$, $cb = 600$, $EO = 2200$, $Op = 1500$, und $ac = 500$. Es steht also (Fig. 10.) EO die Achse der Hyperbel mit AX parallel, so wird der $\triangle Eac$ rechtwinklicht seyn, in welchem ac und Ec bekannt sind. Suche die Winkel a und E , wie auch die Seite aE .

$$Ec = 800 = 2. 90309.$$

$$ac = 500 = 2. 69897.$$

$$R. = 10. \text{-----}$$

$$\text{Tang. } \angle E = 32^{\circ} - ' 20'' = 9. 79582.$$

$$\angle a = 57. 59. 40.$$

$$\text{Sin. } \angle a = 9. 92839.$$

$$Ec = 2. 90309.$$

$$R. = 10. \text{-----}$$

$$aE = 944 = 2. 97470.$$

$$ad = 1220 \text{ wie oben } \S 19.$$

Der Winkel $E =$ dem Winkel aAX , mithin selbst doppelt genommen, macht den Winkel aAd aus $= 64^{\circ} - ' 40''$.

$$\text{Sin. } \angle aAd = 64^{\circ} - ' 40'' = 9. 95366.$$

$$ad = 1220 = 3. 08635.$$

Sin.

$$\sin. < A a d = 57. 59. 40 = 9. 92839.$$

$$13. 01474.$$

$$A d = A a = 1151 = 3. 06108.$$

$$A a = 1151.$$

$$- a E = 944$$

$$A E = 207.$$

Also ist der Scheitelswinkel des Kegels $= 64^{\circ} - ' 40''$. und $A E$ die Entfernung der Scheitel $= 207$.

21. S. Diese Lage der Hyperbeln hat viel ähnliches mit den Parabeln; denn wie hier der Parallelismus zwischen den Achsen obwaltet, also hat er in den Parabeln zwischen der Achse derselben, und der einen Seite des Kegels statt. Es läßt sich hiemit diese Berechnungsart auch in den Parabeln anwenden; wenn man einmal weiß, daß der Kegelschnitt von dieser Gattung ist. Deswegen wir sie im 18 § noch nicht gebrauchen konnten, da wir aus den dort gegebenen Sätzen vorläufig noch nicht wußten, zu was für einer Gattung der Kegelschnitte sie gehöre. Wir wollen obiges Exempel (17 §) beybehalten, und in selbem gegenwärtige Berechnungsart zeigen.

22. S. Fig. 11. sey $E c = 1200$. $a c = 400$. Weil in der Parabel $E c$ allzeit $E a$ gleich ist (7 §), so haben wir in dem $\triangle a E c$ die drey bekannten Seiten, aus welchen sich (Trig.) die Winkel finden lassen.

$$1200 = 3. 07918.$$

$$1600 = 3. 20412.$$

$$400 = 2. 90309.$$

$$6. 10721.$$

$$\text{der Unterschied der Segmenten} = 3. 02803 = 1067$$

$$\begin{array}{r}
 1200. \\
 - 1067. \\
 \hline
 133. \\
 2 \overline{) 66\frac{1}{2}} = 66, 5. \\
 4000 = 3. 60206. \\
 R. = 10. \\
 665 = 2. 82282. \\
 \hline
 9^\circ. 34'. 12'' = 9. 22076. \\
 < a = < c = < d = 80^\circ. 25'. 48''. \\
 \hline
 < a + < c = 160. 51. 36. \\
 < E = < A = 19. 8. 24. \\
 \hline
 < A = 19. 8. 24 = 9. 51570. \\
 a d (\S 17. n 1.) = 1025 = 3. 01072. \\
 < a = 80. 25. 48 = 9. 99388. \\
 \hline
 13. 00460. \\
 \hline
 A d = A a = 3083 = 3. 48890. \\
 - E a = 1200. \\
 \hline
 A E = 1883.
 \end{array}$$

Es ergibt sich zwar zwischen dieser und der im 17 § gemachten Berechnung einiger Unterschied, welcher aber nicht merklich, und durch genauere Anwendung mehrerer Decimaltheile zc. leicht gehoben werden kann, und also in keine Betrachtung kommt.

23. §. Wir haben im 16 § zum Grunde angesetzt, daß man zur Auflösung unsrer Aufgabe zwar nicht die Gattung des Regelschnittes, doch aber zwei Abscissen sammt ihren Ordinaten wissen müsse. Gibt man nun anstatt der Abscissen, und Ordinaten andre Data, so folgt, daß, wenn die Aufgabe nicht auch in diesem Stücke soll unbestimmt ausfallen, man nothwendig solche und so viele haben müsse, als

als reflectlich sind, mittelst selber die Abscissen und Ordinaten zu finden. Welche aber, und wie viele solche Data zu dem Ende erfordert werden, lehrt die Algebra, auf welche wir uns sohin beziehen. Einen einzigen Fall, weil selber in algebraischen Schriften nicht überall vorkommt, wollen wir behandeln, nämlich wenn eine Abscisse, ihre Ordinate, und eine zweyte Abscisse, doch ohne Ordinate, oder eine zweyte Ordinate ohne Abscisse gegeben sind, wie die zweyte Ordinate oder Abscisse zu finden sey.

24. §. Da eine Abscisse und Ordinate zu allen Gattungen der Kegelschnitte, ja so gar zum Zirkel, und zu proportionalen Triangeln gleichgiltig ist: muß vor allem die Gattung des Kegelschnittes bestimmt seyn; in den Ellipsen und Hyperbelen wird überdas zu endlicher Bestimmung eines Individui in seiner Gattung entweder die Achse, oder der Parameter als gegeben erfordert. Alles nach Ausweisung folgender § §.

25 §. Es sey in einer Parabel gegeben, die Abscisse $= x$, ihre Ordinate $= y$, und die zweyte Abscisse $= u$: es soll ihre Ordinate $= z$ gefunden werden.

Auflösung.

$$y^2 : z^2 = x : u. \text{ (Algebra) }$$

$$y^2 u = z^2 x.$$

$$\frac{y^2 u}{x} = z^2.$$

$$\frac{\sqrt{y^2 u}}{x} = z.$$

26. §. Es sind in der Parabel gegeben die Abscisse x , die Ordinate y , und die Ordinate z , man soll ihre Abscisse u finden.

Auflösung.

$$y^2 : z^2 = x : u.$$

$$y^2 u = z^2 x.$$

$$u = \frac{z^2 x}{y^2}.$$

27. S. In einer Ellipse sind gegeben x und y , wie auch u sammt der Achse a : wird gesucht z .

Auflösung.

$$y^2 : z^2 = (a - x)x : (a - u)u.$$

$$= ax - x^2 : au - u^2.$$

$$au y^2 - u^2 y^2 = ax^2 - x^2 z^2.$$

$$\frac{au y^2 - u^2 y^2}{ax - x^2} = z^2.$$

$$\frac{\sqrt{au y^2 - u^2 y^2}}{ax - x^2} = z$$

28. S. In der Ellipse sind gegeben x, y, z und a : wird u gesucht.

Auflösung.

$$y^2 : z^2 = ax - x^2 : au - u^2$$

$$au y^2 - u^2 y^2 = ax z^2 - x^2 z^2.$$

$$au - u^2 = \frac{ax z^2 - x^2 z^2}{y^2}.$$

$$\frac{x^2 z^2 - ax z^2}{y^2} = u^2 - au.$$

$$\frac{x^2 z^2 - ax z^2}{y^2} + \frac{1}{4} a^2 = u^2 - au + \frac{1}{4} a^2.$$

$$\left(\frac{\sqrt{x^2 z^2 - ax z^2}}{y^2} + \frac{1}{4} a^2 \right) = u - \frac{1}{2} a, \text{ oder } \frac{1}{2} a - u.$$

Dier

Hier ist es willkürlich, ob man die gegebene Ordinate z ober oder unter das Centrum der Ellipse setzen wolle, im ersten Falle heißt es:

$$\left(\frac{\sqrt{x^2 z^2 - a \times z^2}}{y^2} + \frac{1}{4} a^2 \right) \left[\frac{1}{2} a - u. \text{ und im zweyten} \right. \\ \left. u - \frac{1}{2} a, \right.$$

folglich ist die Auflösung

$$\text{im ersten Falle } u = \frac{1}{2} a - \left(\frac{\sqrt{x^2 z^2 - a \times z^2}}{y^2} + \frac{1}{4} a^2 \right). \\ \text{und im zweyten } u = \frac{1}{2} a + \left(\frac{\sqrt{x^2 z^2 - a \times z^2}}{y^2} + \frac{1}{4} a^2 \right).$$

29. §. Eben diese zween Fälle können in den Hyperbel vorkommen. Es sey gegeben x, y , und u mit der Zwerchachse a . Man soll die Ordinate z finden.

Auflösung.

$$y^2; z^2 = a \times x + x^2; a u + u^2.$$

$$a u y^2 + u^2 y^2 = a \times x^2 + x^2 z^2.$$

$$\frac{\sqrt{a u y^2 + u^2 y^2}}{a x + x^2} = z.$$

30. §. Man weis in der Hyperbel x, y, z , und a , und soll die Abscisse u suchen.

Auflösung.

$$a u y^2 + u^2 y^2 = a \times x^2 + x^2 z^2 \quad (29. §.)$$

$$a u + u^2 = \frac{a \times x^2 + x^2 z^2}{y^2}$$

$$u^2 + a u + \frac{1}{4} a^2 = \frac{a \times x^2 + x^2 z^2}{y^2} + \frac{1}{4} a^2.$$

$$u = \sqrt{\frac{a \times x^2 + x^2 z^2}{y^2} + \frac{1}{4} a^2} - \frac{1}{2} a.$$

31. §. Aus diesem ist zu schließen, daß x , y , u und z ein gewisses Verhältniß gegen einander haben müssen, und daß zwar jede Zahlen als Abscissen oder Ordinaten eines Kegelschnittes als einzelne Zahlen betrachtet, aber nicht in Verbindung mit andern seyn können. Es sey x eine Abscisse, y ihre Ordinate, u eine andere Abscisse, z ihre Ordinate, so wie diese Buchstaben in gegenwärtiger Abhandlung durchgängig angenommen werden. Sehen wir sie in einer Zeile her.

$x. y. u. z.$

Wollen wir ihren Werth bestimmen, wohl an, setzen wir unter jeden Buchstabe die nächste beste Zahl, und stellen die in dieser Abhandlung angezeigte Berechnung darüber an. Was wird folgen? entweder werden wir auf einen Kegelschnitt kommen, auf den wir selbst nicht dachten, oder wir werden in der Berechnung stecken bleiben: wir werden Widersprüche finden, als so viele Zeichen, daß diese Zahlen, wenigst, wie sie jetzt stehen, unmöglich für Kegelschnitte taugliche Zahlen seyn können. Verändert sie nur in ihrer Stellung, und wiederholet die vorige Berechnung, vielleicht werden sie im neuen Plazze mit den übrigen Zahlen doch zu einer Gattung Kegelschnitte tauglich seyn. Veränderet sie öfters untereinander: vier Zahlen lassen sich nach den Permutationenregeln 24mal versetzen. Es wird doch eine und die andere zum Kegelschnitte schicklich seyn. Doch wir mahnen andere zu einer mühsamen Arbeit an, die wir selbst in die Länge nicht wohl aushalten möchten. Wer sich hierinn üben will, dem wollen wir doch die Arbeit erleichtern, und einen kürzern Weg zur Kenntniß des Verlangten zu kommen zeigen. Es sey z. B.

$x. y. u. z.$

$1. 3. 5. 7.$

Die Formel der Parabel ist:

$$y^2 : z^2 = x : u$$

$$9 : 49 = 1 : 5$$

Well

Weil $9 : 45 = 1 : 5$ eine wahre Proportion hat : wenn $x = >$ einer Decimalsfraction vermindert würde , als z. E. 6, 7, würden die vier Zahlen in voriger Ordnung = 1. 3. 5. 6, 7 zur Parabel n näher schiefen. Wir wollen sehen, wie sie zur Ellipse paßen, in Formel ist :

$$y^2 : x^2 = a x - x^2 : a u - u^2.$$

$$9 : 49 = 1 a - 1 : 5 a - 25.$$

Man suche den Werth der Achse = a .

$$\begin{array}{r} 49 a - 49 = 45 a - 225. \\ \hline 49 a = 45 a - 176. \end{array} \quad \begin{array}{l} 49 \text{ add.} \\ \hline \end{array}$$

Hier käme der Werth von a negativ heraus , welches unmd. ist , und also anzeigt , daß diese vier Zahlen, wenigst in dieser Stellung zur Ellipse untauglich sind. Auf diese Art könnte man sie in der Hyperbel probiren. Man versetze aber die vier Zahlen z. E.

$$\begin{array}{l} x. y. u. z. \\ 1. 5. 3. 7. \end{array}$$

und probire sie nochmal in der Ellipse.

$$y^2 : x^2 = a x - x^2 : a u - u^2.$$

$$25 : 49 = a - 1 : 3 a - 9.$$

$$75 a - 225 = 49 a - 49.$$

$$\begin{array}{r} 75 a - 225 = 49 a - 49. \\ \hline 75 a - 176 = 49 a. \end{array}$$

$$27 a = 176.$$

$$a = 6 \frac{1}{3} = 6, 518 = \text{der Achse.}$$

In dieser Versetzung sind also die Zahlen 1. 3. 5. 7. das ist, ersten vier Zahlen der arithmetischen ungleichen Progreßion zu Kegelschnitten, benanntlich zur Ellipse tauglich. Auf gleiche Weise kann n andere Progreßionen , sogenannte Series, polygonische, harmonische Zahlen zc. prüfen, und sodann, wenn es beliebt, ihr auch Regel, und Lagen in selben durch die Berechnung anweisen.

32. S. Man wird schon längst den in 17 S. u 10 versprochenen Beweis erwartet haben: ich habe ihn aber geflissentlich bis zum Ende der Abhandlung gespart; weil selber einerseits das Verfahren in unsrer Hauptaufgabe rechtfertigt, andererseits aber als eine zweite Aufgabe mag angesehen werden. Mich dünkt, eines strengen geometrischen Beweises habe die angezeigte Berechnung nicht nöthig. Wer sie von Schritte zu Schritte betrachtet, sieht ihren Zusammenhang, und die auf geometrisch-oder trigonometrische Gründe sich stützende Berechnungen belehnen sich in einzelnen Schriften ohnehin auf jene Wissenschaften, aus denen der Grund geborget ist. Mein Beweis also ist vielmehr für eine Probe richtiger Berechnung, als für einen Beweis im engen Verstande anzusehen. Wie in der Arithmetik z. B. die Division durch die Multiplication und diese durch jene erprobet wird; also läßt sich auch die Auflösung unsrer Aufgabe durch den Rückweg rechtfertigen, wenn wir das, was wir gefunden, zum Grunde der Frage legen, und das, was wir zuvor als gegeben angenommen, nunmehr zum Stoffe derselben machen. Man fraget demnach jetzt um die Beschaffenheit des Kegelschnittes, der aus einem gegebenen Kegelschnitt, in gegebener Entfernung der Scheitelpunkte, und unter gegebener Neigung seiner Achse gegen die Seite des Kegels geschnitten wird. Bekommen wir durch unsere Berechnung den nämlichen Kegelschnitt, dessen Regel und Lage wir vorher gesucht, so sind wir nicht nur der Richtigkeit unserer Rechnung, sondern auch der Art, der wir uns gebraucht haben, genug überzeugt. Kleine Unterschiede, deren zufällige Ursachen man ohnehin leicht einsieht, bestärken vielmehr diese zweyfache Richtigkeit, als daß sie selbe in Zweifel ziehen machen; denn sonst würden sie gewiß nicht klein seyn.

33. S. Diese Probe wollen wir in der Ellipse (18. S.) machen, und die Aufgabe also stellen: in einem Kegelschnitt, dessen Scheitelwinkel $= 80^\circ$ ist, schneidet eine krumme Linie in der Entfernung vom Scheitel

Schästel = 100, 00 die eine Seite desselben unter einem Winkel von 100 Graden. Welche ist die Gattung und Art dieses Kegelschnittes? Weil der Neigungswinkel desselben größer ist, als der Scheitelswinkel des Kegels, so sehen wir zum voraus, daß der Kegelschnitt eine Ellipse sey. (8. S.) Die Aufgabe dann aufzulösen, nehmen wir zwei Abscissen dieser Ellipse an, und suchen ihre zugehörigen Ordinaten: haben wir diese vier Stücke, so können wir (Algebra) die Achse, den Parameter, u. s. f. mit einem Worte alles finden, was diese Ellipse von allen übrigen ihrer Gattung unterscheidet. Da aber die Auflösung der Aufgabe zugleich als die Probe der in 18. S. gemachten Berechnung gelten soll: so nehmen wir, die weitläufige Reduction zu ersparen, die zwei Abscissen der dortigen Ellipse an, und suchen die Ordinaten. Stimmen diese ebenfalls mit den dort gegebenen überein, so daß der Unterschied nicht beträchtlich ist (32. S.) so sind wir auch der dortigen Operation und der Richtigkeit der Methode selbst hinlänglich versichert. Die kleinere Abscisse nehmen wir demnach an = 7, 660, die größere = 12, 000. Es wird sich zeigen, was ihnen die Berechnung für Ordinaten zutheile.

34. S. II. 1. Der Scheitelpunkt A (Fig. 6.) sey = 80° . $AE = 100, 00$, und der Winkel $aEc = 100^\circ$. Man setze aus E in c die angenommene kleinere Abscisse = 7, 660. Durch c ziehe man die Linie ac der Achse des Kegels perpendicular. Der Winkel a wird = seyn dem Winkel d , und beyde zusammen = 100° . also jeder = 50° . Der halbe Winkel in $A = aAx$ ist = 40° .

N. 2. In dem $\triangle aEc$ sind die zween Winkel $a = 50^\circ$, und $E = 100^\circ$ bekannt, folglich ist der Winkel $c = 30^\circ$. überdas wissen wir die Seite $Ec = 7660$. Man suche die übrigen zwei Seiten.

$$\text{Sin. } \angle a = 50^\circ = 9.88425.$$

$$Ec = 7660 = 3.88422.$$

⊙ 2

Sin,

$$\text{Sin. } \angle c = 30^\circ = 9.69897.$$

$$\underline{13.58319.}$$

$$Ea = 5000 = 3.69894.$$

$$\text{Sin. } \angle a = 50^\circ = 9.88425.$$

$$Ec = 7660 = 3.88422.$$

$$\text{Sin. } \angle E = 100^\circ = 9.99335.$$

$$\underline{13.87757.}$$

$$ac = 9848 = 3.99332.$$

N. 3. In dem rechtwinklichten $\triangle a A \times$ ist bekannt,

1. Der Winkel $a A \times = \frac{1}{2} A = 40^\circ$.

2. Die Seite $Aa = Ea + Ea = 10000 + 5000 = 15000$.

Man suche die übrigen Seiten.

$$R. = 10. \text{-----}$$

$$Aa = 15000 = 4.17609.$$

$$\text{Sin. } \angle A = 40^\circ = 9.80806.$$

$$a \times = 9642 = 3.98415.$$

$$. R. = 10. \text{-----}$$

$$Aa = 15000 = 4.17609.$$

$$\text{Sin. } \angle a = 50^\circ = 9.88425.$$

$$A \times = 11490 = 4.06034.$$

$$\text{N. 4. } a \times = 9642.$$

2 mult.

$$ad = 19284.$$

$$- ac = 9848.$$

$$cd = 9436 = 3.97478.$$

$$\text{mult. mit } ac = 9848 = 3.99334.$$

$$bc^2 = 7.96812.$$

$$bc = 9640 = 3.98406.$$

N. 5.

$$\begin{array}{r} \text{N. 5. } Eo = 12000 \\ - Ec = 7660 \\ \hline co = 4340. \end{array}$$

ch o ziehe man mn mit ad parallel. Da der Winkel $dco = Eco = 30^\circ$; also ist der Winkel $qco = 60^\circ$, und $coq = 30^\circ$. Man lasse sc die Perpendicular cq auf mn fallen, und suche im $\triangle cqo$ Linie cq .

$$\begin{array}{r} R. = 10. \text{-----} \\ co = 4340 = 3.63748. \\ \text{Sin. } \angle coq = 30^\circ = 9.69897. \\ \hline cq = xy = 2170 = 3.33645. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{N. 6. } Ax = 11490. \\ + xy = 2170. \\ \hline Ay = 13660. \end{array}$$

In dem $\triangle Amy$ suche man die Seite my .

$$\begin{array}{r} Ax = 11490 = 4.06034. \\ ax = 9642 = 3.98415. \\ Ay = 13660 = 4.13545. \\ \hline 8.11960. \\ \hline my = 11462 = 4.05926. \\ \hline \text{2. mult.} \\ mn = 22924. \end{array}$$

N. 7. In dem $\triangle Em o$ suche man mo .

$$\begin{array}{r} Ec = 7660 = 3.88422. \\ ac = 9848 = 3.99332. \\ Eo = 12000 = 4.07918. \\ \hline 8.07250. \\ \hline mo = 15427 = 4.18828. \end{array}$$

$$m n = 22924.$$

$$- m o = 15427.$$

$$o n = 7497.$$

N. 8. Man suche die Ordinate $o p$.

$$m o = 15427 = 4. 18828.$$

$$o n = 7497 = 3. 87488.$$

$$o p^2 = 8. 06316.$$

$$o p = 10754 = 4. 03158.$$

Also ist die angenommene erste Abscisse $E c = 7, 660.$

ihre gefundene Ordinate $b c = 9, 640. (114.)$

die andere Abscisse $E o = 12, 000.$


und ihre gefundene Ordinate $o p = 10, 754.$

35. §. Man vergleiche nun diese Ellipse mit jener des 18. §., so findet man, daß sie in allen vollkommen gleich, und folglich beyde Berechnungen richtig sind. Ein gleiches würde man in der Hauptsache gefunden haben, wenn man auch zwei andere Abscissen angenommen hätte: aber die Reduction und gleichsam Confrontirung beyder Ellipsen kostete eine neue nicht gar zu bequeme Berechnung. Die leichteste würde doch seyn, wenn man für die Ellipse des 18. §. die Achse suchete, sodann selbe in die elliptische Gleichung: $y^2 : z^2 = (a - x) x : (a - u) u$ neben den im vorigen Absätze gefundenen Ordinaten und Abscissen setzte. Behält die Gleichung ihr gehöriges geometrisches Verhältniß, so haben die Berechnungen auch die Probe gehalten.

36. §. Ich war gesinnt, hier am Ende der Abhandlung meine Gedanken auch über die in der Lehre von Kegelschnitten bekannten Asymptoten in etwas zu äußern: ich fand aber, daß sie wohl hinlänglichen Stoff zu einer besondern kleinen Abhandlung darreichen können, dahin ich es indessen verspare, und gegenwärtige Abhandlung ende.

Tabl

Fig. i.



Untersuchungen
über die ersten Gründe
der
Photometrie,
von
Wencesl. Joh. Gustav Karsten.


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial statements. It also highlights the need for regular audits and the importance of transparency in financial reporting.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls to prevent fraud and ensure the accuracy of financial data. It outlines the key components of a robust internal control system, including segregation of duties, authorization procedures, and regular monitoring and evaluation.

3. The third part of the document addresses the challenges faced by organizations in managing their financial resources effectively. It discusses the importance of budgeting, forecasting, and cost management, and provides practical advice on how to overcome common financial management challenges.

4. The fourth part of the document explores the role of technology in modern accounting and finance. It discusses the benefits of using accounting software and the importance of staying up-to-date with the latest technological advancements in the field.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of ethical behavior in financial reporting and the role of the accounting profession in maintaining the trust of stakeholders. It also provides a summary of the key points discussed throughout the document.



Untersuchungen

über die ersten Gründe der

Photometrie.

Wäre die Photometrie schon eine ganz bekannte Wissenschaft, so dürfte eine umständliche Abhandlung von ihrem ersten Gründen unter den Aufsätzen einer Akademie der Wissenschaften eben keinen Platz verdienen: allein es scheint, daß die Gründe der Photometrie noch nicht so bekannt sind, wie es diese sehr angenehme und nützliche Wissenschaft verdienet, ob gleich Herr Lambert schon im Jahre 1760. den ersten eigentlichen Lehrbegriff geliefert hat. Ich werde weiter unten veranlaßt werden, ein paar ganz neue in diese Wissenschaft einschlagende Aufsätze zu beurtheilen, und dann wird es sich zeigen, daß es eben noch nicht überflüssig sey, die Gründe der

Photometrie immer mehr ins Licht zu setzen, damit in einer Wissenschaft, die vom Licht handelt, keine Dunkelheit übrig bleibe. Es sey mir also erlaubt, ganz von vorne auch mit Betrachtung der allerersten Gründe anzufangen: vielleicht wird dadurch die Wissenschaft auch von dem Verdacht befreiet, als wenn es schwer sey, sie auf solche Art abzuhandeln, daß man einen logischen Zirkel vermeide, welchen Verdacht ein Ueingeübter leicht aus des Herrn Lamberts vorzüglich schönen Lehrbegriff der Photometrie schöpfen könnte, wenn er sich nicht die Mühe gäbe, das Lambertische System in seinem ganzen Zusammenhange kennen zu lernen.

Theorie der Erleuchtung,

Wenn das Licht von einem Leuchtenden Punkt ausgehet.

I. §.

Ein dunkler Körper wird uns sichtbar, wenn ein für sich leuchtender Körper auf demselben sein Licht verbreitet, und wir schreiben alsdenn beyden, sowohl dem leuchtenden, als auch dem erleuchteten Körper eine gewisse Klarheit zu, jedoch in verschiedener Betrachtung. Die Klarheit des leuchtenden Körpers ist die Ursache, die Klarheit des erleuchteten aber die Wirkung. Ich werde die Klarheit des leuchtenden Körpers seinen Glanz, die Klarheit des erleuchteten aber seine Erleuchtung nennen.

2. §.

Wenn man sich um einen strahlenden Punkt L als um einen Mittelpunkt eine Kugelfläche $ABEF$ vorstellt, so werden alle Elemente dieser Kugelfläche gleich stark erleuchtet, auf gleiche Elemente fallen gleich viele Lichtstrahlen, und alle Strahlen treffen diese Kugel.

gekrümmte Fläche senkrecht. Auf jedes Stück der Kugeloberfläche, wie AB , fallen so viele von allen den Punkt L umgebenden Lichtstrahlen, als in dem Raum der Pyramiden- oder kegelförmigen Spitze ALB enthalten sind, so wie die ganze Kugeloberfläche die gesammte Menge aller den Punkt L umgebenden Lichtstrahlen auffängt. Man kann sich vorstellen, daß die ganze Kugeloberfläche in gleiche und ähnliche Elemente getheilt sey, über jedes dieser Elemente kann man sich eine Pyramide vorstellen, deren Spitze in L liegt: alsdenn sind die innern Räume der in L zusammenlaufenden Ecken oder Spitzen alle gleich groß: und die Summe aller der Ecken oder Spitzen, welche die Ecke ALB ausmachen, ist in der Summe aller den Punkt L umgebenden Ecken so vielmal enthalten, als die Summe der Elemente der Kugeloberfläche, welche das Stück AB ausmachen, in der Summe aller Elemente der ganzen Kugeloberfläche, oder mit andern Worten: die körperliche Ecke oder Spitze ALB verhält sich zur Summe aller Ecken, die den Punkt L umgeben können, wie das Stück AB der Kugeloberfläche zwischen den Seitenflächen der Ecke ALB (oder zwischen der die Spitze L umgebenden conischen Fläche, wenn diese Spitze kegelförmig ist) zur ganzen Kugeloberfläche.

Diesemnach verhält sich die Menge Lichts, welche AB auffängt, zur Menge aller von L ausgehenden Lichtstrahlen, wie das Stück AB der Kugeloberfläche zur ganzen Kugeloberfläche.

Wenn also EF ein andres Stück derselben Kugeloberfläche ist, so verhält sich die Menge Lichts, welche AB auffängt, zu derjenigen, die EF auffängt, wie AB zu EF , und eben diese Stücke der Kugeloberfläche verhalten sich wie die dazu gehörigen körperlichen Ecken oder Spitzen ALB , ELF am Mittelpunkt der Kugel.

3. §.

Um die Ausdrücke desto mehr abzukürzen, werde ich im folgenden die Pyramiden- oder kegelförmige Ecke oder Spitze, wie ALB , schlechthin eine Ecke nennen, und die Fläche, welche sie von allen Seiten umgiebt, selbige mag aus ebenen Winkeln bestehen, oder eine kegelartige Fläche seyn, soll schlechthin die Gränze der Ecke heißen. Von einer solchen Ecke und ihrem innern Raum kann man sich in der körperlichen Geometrie eine ähnliche Vorstellung machen, wie von einem ebenen Winkel in der ebenen Geometrie. Die Schenkel des ebenen gradlinichten Winkels laufen von seiner Spitze aus ins unendliche fort, und der Raum zwischen den Schenkeln erweitert sich immer mehr und mehr, je weiter die Schenkel von der Spitze aus fortlaufen. Die Gränze einer körperlichen Ecke läuft ebenfalls von ihrer Spitze aus ins unendliche fort, und ihr innerer Raum erweitert sich immer mehr, je weiter die Gränze fort läuft. Wie nun ein Kreisbogen zwischen den Schenkeln eines gradlinichten ebenen Winkels aus seiner Spitze als dem Mittelpunkt mit dem Halbmesser $= r$ zwischen seinen Schenkeln beschrieben dazu dienet, die Größe des Winkels auszudrücken, wenn derjenige $= 1$ angenommen wird, wozu der seinem Halbmesser gleiche Bogen gehört; so kann hier ein Stück einer Kugel- oder Kugelfläche aus der Spitze einer körperlichen Ecke als dem Mittelpunkt zwischen der sie umgebenden Gränze mit dem Halbmesser $= r$ beschrieben, dazu dienen, die Größe der Ecke auszudrücken, wenn diejenige Ecke $= 1$ angenommen wird, wozu ein Stück der Kugelfläche gehört, das dem Quadrat des Halbmessers gleich ist.

4. §.

Mit dem Halbmesser al sey um die Spitze l der Ecke alb eine Kugelfläche $abef$ beschrieben, wovon das Stück ab zwischen der die Ecke umgebenden Gränze fällt, so ist $abef$; $ABEF = al^2$:
 AL^2 .

AL^2 . Wenn also auch $ab:AB=a^2:AL^2$ angenommen wird, so ist $ab:AB=abef:ABEF$, oder $ab:abef=AB:ABEF$, ferner hat man $ab:abef=alb$: Summe aller Ecken um l , und $AB:ABEF=ALB$: Summe aller Ecken um L ; also alb : Summe aller Ecken um $l=ALB$: Summe aller Ecken um L . Weil nun die Summe aller Ecken um l mit der Summe aller Ecken um L einerley ist, so hat man $alb=ALB$, wenn $\frac{ab}{a^2}=\frac{AB}{AL^2}$ ist: oder zwei Ecken sind gleich groß, wenn die Kugelflächen zwischen ihren Gränzen sich wie die Quadrate der zugehörigen Halbmesser verhalten.

Daraus fließt der besondere Satz, daß diejenige Ecke allemal einerley Größe habe, wozu ein Stück der Kugelfläche gehört, das dem Quadrat des dazu gehörigen Halbmessers gleich ist.

Ueberhaupt aber ist das Verhältniß zweier Ecken zusammen gesetzt aus dem Verhältniß der Kugelflächen zwischen ihren Gränzen und dem umgekehrten Verhältniß der Quadrate der Halbmesser. Es sey nämlich die Summe aller Ecken, die einen Punkt wie L oder l umgeben können, $=S$, so ist $ALB:S=AB:ABEF$, und $S:alb=AB:ab$, mithin $ALB:alb=AB:abef$, $ABEF:ab$, und weil $abef:ABEF=a^2:AL^2$, so ist auch $ALB:alb=AB:a^2:ab, AL^2$, oder $ALB:alb=\frac{AB}{AL^2}:\frac{ab}{a^2}$.

Wenn nun $ab=a^2$ angenommen wird, so ist $ALB:alb=\frac{AB}{AL^2}:1$, und $ALB=\frac{AB}{AL^2} \cdot alb$, oder $ALB=\frac{AB}{AL^2}$, weil nun alb eine bestimmte als bekannt anzunehmende Größe hat, die man $=1$ setzen kann.

§. 5.

Es sey die Menge Lichts, welche der leuchtende Punkt L auf

ein Stück der ihn umgebenden Kugelſtäche wirft, das dem Quadrat des Halbmessers gleich ist, $= S$, und diejenige, welche ſich durch jeden andern Pyramiden- oder kegelförmigen Raum, wie ALB , verbreitet, und auf das zwischen seinen Gränzen enthaltene Stück AB der Kugelſtäche fällt, sey $= L$, so hat man $S : L = AL^2 : AB$,

mithin $L = \frac{AB \cdot \sqrt{S}}{AL^2}$. Je stärker der Punkt L glänzt, desto mehr

Strahlen wird derselbe durch einerley Raum ALB verbreiten, oder auf das zwischen den Gränzen einer und eben derselben Ecke enthaltene Stück der Kugelſtäche werfen. Wenn der Punkt L 2mal, 3mal, und überhaupt n mal stärker glänzt, so verbreitet derselbe in einerley Raum ALB , auch 2mal, 3mal, und überhaupt n mal mehr Licht; überhaupt also ist die Menge Lichts, welche der Punkt L in einerley conischen oder pyramidenförmigen Raum verbreitet, dem Glanz desselben proportional. Weis man, wie viel Licht jeder von zweyen verschiedenen leuchtenden Punkten durch einerley Raum dieser Art verbreitet, so kann man den Glanz des einen mit dem Glanz des andern vergleichen. Was also vorhin S hieß, oder die Strahlenmenge, welche der Punkt L durch denjenigen Raum verbreitet, wozu ein Stück der Kugelſtäche so groß als das Quadrat des Halbmessers gehört, ist zugleich als das Maß des Glanzes des Punkts L zu betrachten, und es soll hinführo durch den Glanz eines leuchtenden Punkts diejenige Strahlenmenge verstanden werden, welche er auf ein Stück der ihn umgebenden Kugelſtäche werfen würde, das dem Quadrat des

Halbmessers gleich ist. In dem Ausdruck $L = \frac{AB}{AL^2} \cdot S$. bezeichnet

also S den Glanz des Punkts L , und wenn ein anderer leuchtender Punkt l auf ein Stück ab der Kugelſtäche $abef$ die Strahlenmenge

l wirft, sein Glanz aber $= s$ gesetzt wird; so hat man $l = \frac{ab}{al^2} \cdot s$.

mit

mithin $L: l = \frac{AB}{AL^2} \cdot S: \frac{ab}{al^2} \cdot s$. demnach ist das Verhältniß der Lichtmengen, welche zwey mit verschiedenem Glanz leuchtende Punkte auf ein paar Stücke mit verschiedenen Halbmessern verzeichneter Kugelflächen werfen, zusammen gesetzt aus den Verhältnissen des Glanzes der Punkte, der Größe der erleuchteten Kugelflächen und dem umgekehrten Verhältniß der Quadrate der Halbmesser.

6. §.

Diese Betrachtung leitet zugleich auf den Begriff von der Dichtigkeit des Lichts: der Ausdruck, Dichtigkeit, behält hier eine ähnliche Bedeutung mit derjenigen, die er in den Mechanischen Wissenschaften hat, und man kann sich auch hier das Licht als eine zarte Masse vorstellen, die desto dichter ist, je mehr davon in einem Raum von bestimmter Größe enthalten ist, vorausgesetzt, daß es durch denselben gleichförmig verbreitet sey. Das von einem leuchtenden Punkt L nach allen Seiten ausgehende Licht ist in so fern gleichförmig verbreitet, in wie fern gleich große conische oder pyramidenförmige Ecken, die in L zusammen laufen, eine gleiche Menge des aus L ausgehenden Lichts fassen, mithin ist auch in so fern die Dichtigkeit des nach allen Seiten von L ausgehenden Lichts einerley. In größerer Entfernung aber von dem leuchtenden Punkt breitet sich das Licht in einen größern Raum aus, und die Dichtigkeit desselben wird geringer, in wie weit einerley Lichtmenge, welche die Kugelfläche AB EF erleuchtet, bey einem größern Halbmesser LG sich über eine größere Kugelfläche $GHIK$ verbreitet. Uebrigens wird jede dieser Kugelflächen für sich gleichförmig erleuchtet, oder die Dichtigkeit des über einer und eben derselben Kugelfläche verbreiteten Lichts ist überall einerley. Allemal, wenn auf gleiche Elemente einer Fläche gleich viel Licht fällt, so ist die Erleuchtung der Fläche gleichförmig,
und

und man betrachtet die Fläche selbst als den Raum, durch welchen das Licht verbreitet ist. Diejenige Menge, welche über ein Stück der Kugelfläche, das man $= 1$ angenommen hat, verbreitet ist, kann nun die Dichtigkeit des über der Fläche verbreiteten Lichts heißen: und wenn diese Menge $= D$ gesetzt wird, eine andere Menge $= L$ aber über ein Stück der Fläche verbreitet ist, dessen Quadratinhalt $= V$ ist, so hat man $1^2 : V = D : L$, mithin $D = \frac{L}{V}$, so so wie $L = V \cdot D$, und die Dichtigkeit des Lichts, welches eine Fläche gleichförmig erleuchtet, wird auf ähnliche Art, wie sonst die Dichtigkeit einer durch ihren Raum gleichförmig vertheilten Masse gefunden.

Eben diese Vorstellung von dem, was man Dichtigkeit des über einer Fläche gleichförmig verbreiteten Lichts nennt, giebt zugleich einen mehr bestimmten Begriff von der Klarheit, welche man der gleichförmig erleuchteten Fläche zuschreibt. Diese Klarheit verhält sich wie die Dichtigkeit des über der Fläche verbreiteten Lichts, und selbige läßt sich eben so, wie die Dichtigkeit durch $\frac{L}{V}$ ausdrücken. Ist die Fläche ungleichförmig erleuchtet, so hat sie auch nicht durchgängig einerley Klarheit, und man muß für jede Stelle der Fläche die Dichtigkeit des auf diese Stelle fallenden Lichts, so wie die Klarheit dieser Stelle, besonders suchen.

7. §.

Im 5. §. war die Menge Lichts, welche das Stück AB der Kugelfläche auffängt, oder $L = \frac{AB}{AL^2} \cdot S$, und hier ist AB , was im 6. §. V . war. Mithin wird $D = \frac{L}{V} = \frac{S}{AL^2}$. Bei einerley Glanz des leuchtenden Punkts also ist die Dichtigkeit des über einer Fläche gleich

gleichförmig verbreiteten Lichts, oder die Klarheit der Fläche, dem Quadrat der Entfernung der erleuchteten Fläche vom leuchtenden Punkt umgekehrt proportional. Es muß aber alles Licht senkrecht auffallen, und die Entfernung der Fläche vom leuchtenden Punkt durchgängig einerley, mithin die erleuchtete Fläche eine gegen den leuchtenden Punkt zu hohle Kugelfläche seyn. Je dichter das Licht ist, das eine solche Kugelfläche auffängt, desto größer ist ihre Erleuchtung, und die Erleuchtung der Fläche, so wie ihre Klarheit verhält sich wie die Dichtigkeit des darüber verbreiteten Lichts: demnach drück-

eben der Ausdruck $\frac{S}{AL^2}$, welcher die Dichtigkeit des Lichts giebt, zugleich für eben die Fläche die Größe der Erleuchtung aus. Wenn demnach ungleich stark glänzende Punkte ungleich große Kugelflächen erleuchten, so ist das Verhältniß der Erleuchtungen zusammengefest aus dem Verhältniß des Glanzes beider Punkte, und dem umgekehrten Verhältniß der Quadrate der Entfernungen oder der Halbmesser.

In der Entfernung $AL = 1$ wird $D = S$, und dies will soviel sagen: die Dichtigkeit des von dem Punkt L nach allen Seiten ausgehenden Lichts in der Entfernung $= 1$ vom leuchtenden Punkt ist zugleich das Maaz der Stärke des Glanzes dieses leuchtenden Punkts.

8. §.

Wenn der Punkt L (1. Fig) sein Licht auf eine Ebene CD wirft, so kann er dieselbe nicht gleichförmig erleuchten; auf gleiche Elemente dieser Ebene kann nicht gleich viel Licht fallen. Es sey LE auf dieser Ebene senkrecht, und mit dem Halbmesser LE sey eine Kugelfläche beschrieben, so wird sie die Ebene in E berühren, und das Element Ee der Ebene kann zugleich als ein Element der Kugelfläche betrachtet werden: mithin ist die Menge des Lichts, welches das Element Ee auf-

auffängt $= \frac{E e \cdot S}{E L^2}$, und die Erleuchtung desselben $= \frac{S}{E L^2}$ (7. §.)

Ferner sey Pp ein anderes Element der Ebene CD , durch P aber sey eine neue Ebene auf LP senkrecht gesetzt, wovon das Element $P\pi$ zwischen der die Ecke umgebenden Gränze liegt; so erhellet, daß Pp nur gerade so viel Licht auffangen kann, als $P\pi$ auffangen würde, und $P\pi$ kann als ein Element einer mit dem Halbmesser $L P^2$ beschriebenen Kugelgröße angesehen werden. Mithin ist die Menge

Lichts, welche Pp auffängt, $= \frac{P\pi \cdot S}{L P^2}$. Wenn nun gleich $Pp =$

Ee angenommen wird, so ist doch die Menge Lichts, welche Pp empfängt, kleiner als diejenige Menge Lichts, welche Ee auffängt, weil

die Ecke $PLp < ELE$ ist. Es ist nämlich $\frac{P\pi}{L P^2} < \frac{Ee}{L E^2}$, weil $P\pi$

$< Pp$, oder $P\pi < Ee$, und $LP > LE$ ist. Weil nun bey gleichen Räumen sich die Dichtigkeiten, wie die Massen verhalten, welche durch diese Räume gleichförmig vertheilt sind; so ist auch die Dichtigkeit des über Ee verbreiteten Lichts größer, als die Dichtigkeit des Lichts über Pp , oder die Erleuchtung des Elements Ee ist größer als die Erleuchtung des Elements Pp . Die Erleuchtung nimmt desto mehr ab, je weiter das erleuchtete Element von E entfernt ist: nur dasjenige Element wird am stärksten erleuchtet, wohin eine von dem Punkt L auf die Ebene CD lothrecht gezogene Linie diese Ebene trifft.

9. §.

Weil Ee , Pp , nur als Elemente der Ebene CD betrachtet werden, so sind alle Strahlen, die ein solches Element auffängt, unter sich parallel, und treffen das Element unter einerley Winkel wie LEC , LPC , welcher hier der Einfallwinkel heist. Die Men-

ge des über Pp verbreiteten Lichts war $= \frac{P\pi \cdot S}{L P^2}$, also ist die Dichtigkeit

Zeit desselben $= \frac{P\pi \cdot S}{Pp \cdot L P^2}$. Weil es gleich viel ist, was man dem Element Pp für eine Gestalt geben will, so kann man es als ein unendlich kleines Rechteck betrachten, dessen eine Seitenlinie Pp , und die andere in P auf der Ebene LPC senkrecht ist; alsdenn ist $P\pi$ ebenfalls ein Rechteck, und $P\pi = Pp \cdot \sin LPC$, weil LpC, LPC hier gleiche Winkel sind. Diesemnach ist die Dichtigkeit des über Pp verbreiteten Lichts, oder die Erleuchtung des Elements $Pp = \frac{S \cdot \sin LPC}{L P^2}$,

Werden also zwei unendlich kleine Ebenen von zweien ungleich stark glänzenden Punkten unter verschiedenen Einfallswinkeln erleuchtet, so ist das Verhältniß der Erleuchtungen zusammengesetzt aus dem Verhältniß des Glanzes der Punkte, der Sinus der Einfallswinkel, und dem umgekehrten Verhältniß der Quadrate der Entfernungen der leuchtenden Punkte von diesen Ebenen.

10. §.

Es sey nun die Erleuchtung des Elements $Pp = \mathfrak{J}$, und die auffallende Strahlenmenge $= dM$, so ist $\mathfrak{J} = \frac{S \cdot \sin LPC}{L P^2}$, und $dM = \frac{S \cdot \sin LPC}{L P^2} \cdot Pp$. das sind die ersten Fundamentalgleichungen der Photometrie, so lange der leuchtende Körper als ein Punkt betrachtet werden kann, der nach der gewöhnlichen Vorstellung, die man in der Optik annimmt, nach allen Seiten Strahlen schickt. Beym Gebrauch derselben ist nur noch zu bemerken, daß S eigentlich eine Zahl sey, welche das Verhältniß des Glanzes des leuchtenden Punktes zum Glanz eines andern Punktes ausdrückt, dessen Glanz man $= 1$ setzt. Eben so sind $\frac{1}{L P^2}$ und $\sin LPC$ Zahlen, Pp aber ist eine

Fläche. Mithin ist auch \mathcal{F} eine Zahl, und diejenige Erleuchtung wird $= 1$ angenommen, welche ein Punkt, dessen Glanz $= 1$ ist, auf eine Kugeloberfläche wirft, deren Halbmesser $= 1$ ist, weil nämlich für die auf die Kugeloberfläche fallenden Strahlen der Einfallswinkel $= 90^\circ$ ist.

II. §.

Wenn gleich diese bisher vorgetragene allgemeine Theorie der Erleuchtung auf den Umstand eingeschränkt ist, daß nur ein einziger Punkt ist betrachtet worden, der seine Strahlen nach allen Seiten ausbreitet, dagegen die in der Natur vorkommenden leuchtenden Körper insgesamt ihre bestimmte Gestalt und Größe haben; so giebt es doch einige Fälle, bey welchen diese erwiesenen Gesetze der Erleuchtung, ohne sehr zu fehlen, ihre Anwendung finden, ohne daß es eben nöthig wäre, sich in mehr verwickelte Rechnungen einzulassen. Wenn die Flamme einer angezündeten Kerze oder Lampe ihr Licht um sich her verbreitet, so gelten die erwiesenen Sätze eigentlich nur für jeden einzelnen Punkt der Flamme: und wenn man die von ihr herrührende Erleuchtung einer Fläche suchen wollte, so müßte man eigentlich für jeden Punkt, oder jedes Element der Flamme die Rechnung besonders anstellen: die Summe der Erleuchtungen, welche von allen Elementen zusammen herrührt, wäre dann die gesuchte Erleuchtung. Für jedes Element der erleuchteten Ebene, würde jeder Punkt der Lichtflamme einen andern Abstand, und die aus demselben ausgehenden Strahlen einen andern Einfallswinkel haben. Weil indessen die Lichtflamme gewöhnlich nicht sonderlich groß ist, so kann man sie selbst als einen Punkt betrachten, dessen Glanz aus dem Glanz aller ihrer Elemente zusammen gesetzt ist, oder welches einerley ist: man kann die Rechnung so anstellen, als wenn alle Elemente der Flamme etwa in ihrer Mitte in einem einzigen Punkt beysammen wären.

12. §.

12. §.

Wenn nun hiebey angenommen wird, daß eine solche Flamme ihr Licht nach allen Seiten in so ferne gleichförmig ausbreite, in wie fern gleich große conische oder pyramidenförmige Räume, deren Spitze in der Mitte der Lichtflamme angenommen wird, gleichviel Licht enthalten, so hat solches seinen Grund in der Durchsichtigkeit der Flamme, weswegen auch die innern Theile durchscheinen, den Glanz der Flamme vermehren, und wirklich ihre Strahlen nach allen Seiten auf einerley Art verbreiten können. Wäre die Flamme undurchsichtig, wäre es ein sonst undurchsichtiger Körper, der aber eine glänzende Fläche hätte; so würde es mit der Ausbreitung des Lichts, das von einer solchen leuchtenden Fläche nach allen Seiten ausgehet, eine andere Bewandniß haben. Dieses also vorausgesetzt lassen sich dergleichen Lichtflammen gebrauchen, die Richtigkeit der bisher vorgetragenen Photometrischen Grundsätze durch Versuche zu bestätigen, wofern man sich anders nur darauf verlassen kann, das Aug könne, ohne sehr zu fehlen, richtig schätzen, wenn zwei aneinander gränzende Flächen gleich stark erleuchtet sind. Meine Absicht ist jetzt nicht, dergleichen Versuche hier zu erzählen, sondern nur es kurz zu rechtfertigen, wenn man sich bey solchen Versuchen der Lichtflammen bedient. Wenn der größte Durchmesser einer solchen Lichtflamme in Vergleichung mit ihrer Entfernung von der erleuchteten Fläche sehr klein ist; so ist es wohl beynahе eben so viel, als wenn alle ihre Elemente von einerley Element der erleuchteten Fläche gleich weit entfernt wären, und die von jedem Element der Flamme auf einerley Element der erleuchteten Fläche fallende Strahlen gegen dasselbe unter einerley Winkel geneigt wären.

Die Erleuchtung einer Ebene von einer Lichtflamme, in wie weit letztere als ein Punkt betrachtet werden kann.

13. §.

Wenn nicht auf jedes Element einer erleuchteten Fläche eine gleiche Lichtmenge fällt, wenn die Erleuchtungen aller Elemente dieser Fläche verschieden sind, oder jedes Element seine eigene Klarheit hat, die von der Klarheit eines jeden der übrigen Elemente verschieden ist; so kann eigentlich nie von der Klarheit der ganzen Fläche die Rede seyn. Wenn indessen die gesammte Lichtmenge bekannt ist, welche die Fläche auffängt; so giebt diese Menge des auffallenden Lichts, durch den Quadrat-Inhalt der Fläche dividirt, einen Begriff von ihrer mittleren Klarheit oder mittlern Erleuchtung; man kann nämlich so fragen: wenn die ganze auf die Fläche fallende Lichtmenge über selbige gleichförmig vertheilt wäre, wieviel davon auf ein solches Stück der Fläche fallen würde, das man Z angenommen hat? das wäre dann die mittlere Klarheit, oder mittlere Erleuchtung der Fläche.

Ein einziger Punkt kann eine Ebene nicht gleichförmig erleuchten: wenn also gefragt wird, wie groß die Klarheit einer Ebene sey, die von einem Punkt erleuchtet wird, so kann nur von ihrer mittleren Klarheit die Rede seyn.

14. §.

Es sey (3. Fig.) $LMON$ ein Kreis, und AC eine im Mittelpunkte A auf seiner Ebene senkrecht stehende gerade Linie: in der letzten befinde sich eine Lichtflamme C in gegebener Höhe AC über der Ebene; man soll die mittlere Erleuchtung des Kreises finden.

Aufg.

Aufl. Der Halbmesser $AM = z$ wachse um das Element $M\mu$ und mit dem Halbmesser $A\mu = z + dx$ stelle man sich einen andern concentrischen Kreis $\mu\omega\nu$ beschrieben vor, so ist zwischen beyden ein Ring enthalten, dessen Breite $M\mu$ unendlich klein, und dessen Fläche $= 2\pi x dx$ ist. Ein anderer Halbmesser Am schließe mit AM einen unendlich kleinen Winkel MAm ein; so ist $M\mu nm$ ein Element der Kreisfläche, wovon beyde Abmessungen unendlich klein sind. Man setze $AC = c$, den Winkel $AMC = \psi$, so ist $cM = \sqrt{c^2 + z^2}$ und die Erleuchtung des Elements $M\mu nm = \frac{S \sin \psi}{CM^2}$

$= \frac{S \sin \psi}{c^2 + z^2}$ (9. S.) wenn S den Glanz der Lichtflamme bezeichnet.

Ueberdem ist $\sin \psi = \frac{AC}{CM} = \frac{c}{\sqrt{c^2 + z^2}}$, mithin eben diese Er-

leuchtung $= \frac{S \cdot c}{(c^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$. Für alle Elemente, die zu dem Ringe

$LMON\mu\omega\nu$ gehören, ist diese Erleuchtung einerley, weil für sie alle z , also auch ψ und CM einerley bleibt: mithin wird dieser Ring

gleichförmig erleuchtet, und der Ausdruck $\frac{S \cdot c}{(c^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ giebt zugleich

die Klarheit des ganzen Ringes. Eben dieses Ringes Fläche war $=$

$2\pi x dx$, mithin ist die auf ihn fallende Strahlenmenge $= \frac{2\pi c S x dx}{(c^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$.

durch Integration dieser Formel findet man die Summen der auf alle Ringe der ganzen Kreisfläche fallenden Strahlen, mithin die ganze den Kreis erleuchtende Lichtmenge.

Man setze diese Strahlenmenge $= M$, so ist $dM = \frac{2\pi c S x dx}{(c^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$,

und nach der Integration wird $M = C - \frac{\pi c S}{\sqrt{c^2 + z^2}}$ gefunden.

Mit z muß dieses Integral zugleich verschwinden, also wird $C = 2\pi S$,
und

und $M = 2\pi S \left(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2 + z^2}}\right)$ Weil endlich der Flächen-Inhalt des Kreises $= \pi z^2$ ist, so findet man die gesuchte mittlere Erleuchtung $= \frac{2S}{z^2} \left(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2 + z^2}}\right)$.

15. §.

Weil $\frac{c}{\sqrt{c^2 + z^2}} = \sin AMC = \cos ACM$ war, so ist auch $M = 2\pi S \sinv. ACM$, da dann ACM der scheinbare Halbmesser des erleuchteten Kreises ist, aus dem leuchtenden Punkt C gesehen. Um C als einen Mittelpunkt sey mit dem Halbmesser $CB=1$ eine Kugel beschrieben, so ist zwischen der Fläche des auffallenden Strahlenkegels MCN ein Segment der leuchtenden Kugel enthalten, dessen Fläche $= 2\pi \sinv. ACM$ ist. Wenn also die Fläche dieses Segments $= k^2$ gesetzt wird, so ist auch $M = k^2 S$. Hier aber bezeichnet S die Menge Lichts, welche der Punkt C auf ein Stück der Kugelfläche $BEGD$ wirft, das dem Quadrat des Halbmessers gleich, mithin hier $= 1^2$ ist; also hat man $1^2 : k^2 = S : M$, und der Ausdruck $M = k^2 S$ zeigt an, daß auf den Kreis $LMON$ so viele Lichtstrahlen fallen, als das Kugel-Segment FBG zwischen den Grenzen des auf den Kreis fallenden Strahlenkegels auffängt.

Das hätte man nun auch ohne alle Rechnung von selbst wissen können, denn es ist für sich klar, daß der Kreis $LMON$ nicht mehr und nicht weniger Strahlen auffangen kann, als das Kugel-Segment FBG auffangen würde. Indessen war es nicht unnöthig, in einem so leichten Beispiel zu zeigen, wie die Rechnung mit demjenigen übereinstimmt, was die Natur der Sache von selbst lehret. Auch bey so ganz leichten Untersuchungen kann man zu Fehlschlüssen und falschen Folgerungen verleitet werden, wenn man sich nicht

nicht die Mühe gegeben hat, die ersten Grundbegriffe einer Wissenschaft genau genug auseinander zu setzen. Eine Probe davon geben ein paar ganz neulich bekannt gewordene hieher gehörende kleine Schriften ab, und es wird mir um so mehr erlaubt seyn, selbige hier etwas ausführlich zu beurtheilen, weil das Ansehen verdienter Männer eben so leicht Irrthum als Wahrheit ausbreitet, besonders in einer Wissenschaft, wo so wenige selbst prüfen können.

16. §.

H. Gerlach, Lehrer bey der K. K. Ingenieur-Akademie zu Wien ließ im 52. Stück der K. K. Realzeitung vom 21. Dec. 1771. einen kurzen Brief an die Herausgeber: über die verschiedenen Wirkungen eines verschieden hohen oder niedern Lichts auf eine erleuchtete Fläche, abdrucken, und derselbe veranlaßte H. H. Barstner im 33sten Stück des neuen Hambörschen Magazins unterm 24. April 1772. einen Aufsatz: über H. Gerlachs Vorschrift eine Lampe zu stellen, daß sie einen runden Tisch am besten erleuchtet, einrücken zu lassen. Herrn Barstner ist der Gerlachische Vortrag nicht befriedigend, er trägt die Sache anders vor, trifft indessen doch in Ansehung des Resultats, das H. Gerlach eigentlich suchte, wieder mit ihm überein. Mit H. Barstner ist wiederum H. Gerlach nicht zufrieden, und ist deswegen zu einem neuen Aufsatz unter der Aufschrift: Erläuterung über die beste Erleuchtung der Flächen mittelst einer Lampe, veranlaßt worden. Alle drey Abhandlungen hat H. Gerlach nun unter dem Titel, zusammen drucken lassen: Bestätigte Vorschrift über die beste Erleuchtung einer Ebene mittelst einer Lampe nebst der Untersuchung darüber von H. H. Barstner. Wien 1772.

17. §.

Da einmal Abends eine Kerze ziemlich herab gebrannt war,
S
zündet

zündete H. Gerlach eine längere an, und da er diese auf den Tisch setzte wurde gleich alles heller darauf, als es vorher gewesen war. Er schloß hieraus: also müsse die verschiedene Höhe des Lichts auch verschiedene Helle machen, und es müsse eine gewisse Höhe seyn, bey der die Helle auf dem Tisch am größten ist. So erzählt H. Gerlach die Veranlassung zu seinem ersten Aufsatz in der K. K. Realzeitung, und sucht darauf diese Höhe, bey der es nach seinem Ausdruck auf dem Tisch am hellsten ist. Bey der Rechnung selbst nimmt er einen kreisrunden Tisch an, in dessen Mitte ein Licht stehet, und seine Rechnung giebt: es müsse des Lichts Höhe dem halben Durchmesser des Tisches gleich seyn, und sein Brief schließt mit der Regel:

„ Soll also irgend ein Ort auf einer Horizontfläche so stark
 „ erleuchtet werden, als möglich ist, so muß dieses Licht über
 „ der Fläche so hoch erhöht seyn, als der Ort von dem
 „ Punkt, worauf es stehet, entfernt ist.

Als ich so weit gelesen hatte, sah ich wohl, daß Herr Gerlach sehr unbestimmt und flüchtig geschrieben habe, und gab bey dem Fortlesen Herrn Karstner völlig Beyfall, wenn derselbe urtheilet, H. Gerlach habe nicht den bequemsten Ausdruck gewählt. Weil ich in dessen dergleichen bey andern neuern Schriftstellern, die sich in das mathematische Feld wagen, oft bemerkt habe, so bestemdete es mich eben so sehr nicht, als es mir unerwartet war, daß auch Herrn Karstners Vortrag bald nicht mehr mit der Vorstellung, die ich mir von der Sache gemacht hatte, übereinstimmte.

18. §.

Die Klarheit des Tisches kann nicht überall einerley, seine Erleuchtung kann nicht gleichförmig seyn, deswegen ist bey H. Gerlach der Ausdruck, Stärke des auf dem Tisch ausgebreiteten Lichts,

Lichts, freylich der Sache nicht angemessen, und H. Karstner thut ihm nicht unrecht, wenn er ihm Schuld giebt, er habe sich von der Erleuchtung dunkel ausgedrückt. Wenn man indessen die kurz vorhin angeführte Regel, womit H. Gerlach seinen Brief schließt, mit seinem übrigen Vortrag vergleicht, so siehet man wohl, daß er die Stärke des auf den äußersten Rand des kreisförmigen Tisches fallenden Lichts eigentlich verstanden habe. Und so fällt auch gleich in die Augen, warum er eben einen runden Tisch nennt: daran hatte ich mich also nicht, wie H. Karstner, gestossen, denn die Ursache war offenbar, weil H. Gerlach stillschweigend voraussetzte, daß gleich stark erleuchtete Elemente des Tisches im Umfang eines Kreises liegen müssen. Wäre von der mittlern Klarheit des Tisches die Rede, und man wollte wissen, wie hoch das Licht stehen müßte, wenn selbige die möglichst größte wäre; so verstünde sich ohne alle Rechnung von selbst, daß das Licht gar nicht über dem Tisch erhoben seyn müsse. Je niedriger die Flamme steht, desto mehr Strahlen wirft sie auf den Tisch, und wenn ihre Höhe über dem Tisch verschwinden könnte, so würde sie die Hälfte aller Strahlen, die sie um sich her ausbreitet, auf den Tisch werfen, sovielen als auf die Fläche einer um sie als einen Mittelpunkt beschriebenen Halbkugel fallen würden. Mehr Licht kann die Flamme nie auf den Tisch werfen, wie denn auch der

Ausdruck für die Strahlenmenge $M = 2\pi S \left(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2 + z^2}}\right)$ (14. S.)

wächst, wenn c abnimmt, und am größten, nämlich $= 2\pi S$ wird, wenn $c = 0$ ist, da dann 2π die Fläche der Halbkugel ist, für den Halbmesser $= 1$. Weil die Fläche des Tisches von einerley Größe bleibt, so wächst ihre mittlere Klarheit mit der auffallenden Strahlenmenge, und ist am größten, wenn diese am größten, mithin, wenn $c = 0$ ist: da dann der allgemeine Ausdruck für die mittlere Klarheit $= \frac{2S}{z^2} \left(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2 + z^2}}\right)$ sich in folgenden $\frac{2S}{z^2}$ verwandelt, wie der Natur der Sache gemäß ist.

19. §.

Bei dieser möglichsten Erniedrigung der Lichtflamme würde man aber alles auf den Tisch fallende Licht in den nächsten Stellen um den Mittelpunkt vereinigen: nur das mittelfte Element würde allein erleuchtet werden, wenn die Flamme wirklich ein Punkt und ihre Höhe über dem Tisch unendlich klein wäre. Das alles ist aus der Natur der Sache begreiflich, und die Formel für die Erleuchtung eines zum unbestimmten Halbmesser x gehörigen Ringes, welche im

14. §.
$$S. c = \frac{S. c}{(c^2 + x^2) \sqrt{c^2 + x^2}}$$
 gefunden ist, ergibt dasselbe, weil sie allemal $= 0$ ist, wenn $c = 0$ genommen wird, was auch x bedeutet: der Grund ist offenbar der, weil für alle übrige Elemente der Einfallswinkel $= 0$ wäre. Mit der Höhe c wächst der Einfallswinkel, aber dagegen nimmt das Quadrat der Entfernung zu: bei einer unendlich grossen Höhe wäre zwar der Einfallswinkel ein rechter Winkel, und für alle Elemente einerley, aber die Erleuchtung verschwände wieder wegen der unendlich grossen Entfernung der Flamme, wie denn

auch die Formel
$$\frac{S. c}{(c^2 + x^2) \sqrt{c^2 + x^2}}$$
 abermal verschwindet, wenn $c = \infty$ genommen wird. Wenn also der Halbmesser x eines gewissen Ringes als beständig, die Höhe c dagegen als veränderlich angenommen wird, so muß es eine gewisse Höhe c , oder einen davon abhängenden Einfallswinkel geben, wobey die Erleuchtung des Ringes die möglichst größte wird. Nimmt man für diesen Ring den äußersten Rand des Tisches an, so sind alle übrige Ringe noch mehr erleuchtet, als der äußerste: stellt man also die Lichtflamme in der Höhe, welche diese Bedingungen erfordern, so hat man am äußersten Umfang des Tisches mehr Erleuchtung, als das Licht in jeder andern Höhe dahin werfen kann: und wenn diese Erleuchtung so stark ist, als man sie nöthig hat, um ohne Beschwerde dabey seine Augen

zu gebrauchen, so wird es noch um so mehr über dem ganzen Tisch
helle genug seyn.

20. §.

Diese, urtheilte ich beim ersten Lesen des Gerlach'schen Briefes, müßten etwa des Verfassers Gedanken gewesen seyn, und daß ich es getroffen habe, beweiset nunmehr seine nachher erfolgte Erläuterung; nur schade daß H. Gerlach nicht auch seinen Rechnungsfehler bemerkt, und in eben dieser Erläuterung verbessert hat, wodurch er in dem ersten Briefe auf ein falsches Resultat ist geleitet worden. Nachdem die Erläuterung hinzu gekommen ist, nenne ich dies Versehen nur einen Rechnungsfehler; vorher nach den Ausdrücken, die H. Gerlach im ersten Briefe gebraucht, hätte ich es für einen theoretischen Irrthum gehalten. Dem in vorigen §. festgesetzten Sinn der Aufgabe gemäß, wollte H. Gerlach einen Ausdruck für die Stärke des auf den äußersten Rand des Tisches fallenden Lichts suchen, für die Erleuchtung oder Klarheit dieses äußersten Randes. Setzt man also den beständigen Halbmesser des kreisförmigen Tisches $= a$ die veränderliche Höhe $= x$, so muß man in der Formel

S. c
$$\frac{c}{(c^2 + x^2) \sqrt{(c^2 + x^2)}} \quad (14. \text{ §.}) \text{ nunmehr } a \text{ statt } c \text{ und } x \text{ statt } c$$

schreiben, so ist die Erleuchtung $= \frac{S. x}{(a^2 + x^2) \sqrt{(a^2 + x^2)}}$, oder sie

ist dem Ausdruck $\frac{x}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$ proportional. Aber H. Gerlach sagt im ersten Briefe:

es wächst die Helle auf dem Tisch, wie des Lichts Höhe,
und umgekehrt das Quadrat seiner Weite von dem erleuchteten
Punkt,

und das giebt ihm den Ausdruck $\frac{x}{a^2 + x^2}$, dem die Erleuchtung proportional seyn soll. Die Helle, davon hier die Rede ist, wächst nicht, wie des Lichts Höhe, sondern wie der Sinus des Einfallswinkels, und das letztere sagt nun H. Gerlach selbst in der Erklärung S. 4. Er nimmt aber x für den Sinus des Einfallswinkels an, und wie $a^2 + x^2$ das Quadrat der Entfernung ist, so kommt er wieder auf den Ausdruck $\frac{x}{a^2 + x^2}$, und hält deswegen seine im ersten Briefe darauf gegründete Rechnung noch für richtig. Nicht x sondern $\frac{x}{\sqrt{(a^2 + x^2)}}$ ist der Sinus der Schiefe; wie ihn H. Gerlach nennt: der sonst richtige Satz, daß bey gleicher Entfernung die Erleuchtung, oder wie H. G. redet, die Menge der Strahlen an gleich grossen Orten, sich wie der Sinus der Schiefe verhalte, setzt voraus, daß dieser Sinus für den Halbmesser = 1 gehöre. Nimmt man ihn für einen andern Halbmesser, so ist die Erleuchtung diesem Sinus ordentlich und dem dazu gehörigen Halbmesser umgekehrt proportional. Im 9. S. (1. Fig.) verhielte sich die Menge des auf Pp unter dem Winkel LPC fallenden Lichts, wie $\frac{Pp}{Lp^2}$, und es ist $Pp = \frac{Pp \cdot \sin L.PC}{r}$, wenn der ganze Sinus = r ist: mithin verhält sich die Menge Lichts über Pp wie $\frac{Pp \cdot \sin L.PC}{Lp^2 \cdot r}$, und wenn Pp eineley bleibt, wie $\frac{\sin L.PC}{Lp^2 \cdot r}$. Will also H. G. bey Auflösung seiner Aufgabe x für den Sinus der Schiefe nehmen, so ist $\sqrt{(a^2 + x^2)}$ der ihm zugehörige Halbmesser, und die Erleuchtung verhält sich wie $\frac{x}{(a^2 + x^2) \sqrt{(a^2 + x^2)}}$, welches also nach der vom H. G. selbst

nun

nunmehr für richtig erkannten Regel die Formel ist, welche er hätte zum Grunde legen müssen.

21. §.

Um den größten Werth dieser Formel zu finden, setzt man $d. x$ $(a^2 + x^2)^{-\frac{3}{2}} = 0$, da dann $(a^2 + x^2)^{-\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} x (a^2 + x^2)^{-\frac{5}{2}}$ $2 x = 0$ gefunden wird, und daraus folgt $a^2 + x^2 - 3 x^2 = 0$, mithin $x = a \sqrt{\frac{1}{2}}$. Es ist aber $\sqrt{\frac{1}{2}} = 0,7071068 \dots$ mithin muß die Höhe der Lichtflamme über dem erleuchteten Kreise noch nicht völlig $\frac{1}{2}$, nur etwas weniger mehr als $\frac{7}{10}$, des Halbmessers betragen. Uebrigens ist $\frac{x}{a}$ die Tangente des Einfallswinkels AMC , und $\sqrt{\frac{1}{2}} = \sin 45^\circ$. Es wird aber erfordert, daß $\frac{x}{a} = \sqrt{\frac{1}{2}}$ sey, also muß die Tangente des Einfallswinkels dem Sinus von 45° gleich seyn, wenn der äußerste Ring des Kreises am besten erleuchtet seyn soll. Zu dieser Tangente gehört ein Winkel von $35^\circ 16'$ und das ist der gesuchte Einfallswinkel.

Weil H. G. für die Erleuchtung des äußern Ringes den Ausdruck $\frac{x}{a^2 + x^2}$ annimmt, und den Umstand außer acht läßt, daß der Sinus x durch den ganzen Sinus $\sqrt{(a^2 + x^2)}$ dividirt werden muß, so leitet ihn dies auf die unrichtige Folge: es müsse $x = a$ seyn, wenn der äußerste Ring am meisten erleuchtet seyn soll: denn $\frac{x}{a^2 + x^2}$ wird am größten, wenn $x = a$ ist. Wie es nun zugehe, daß H. H. Karstner, so wenig er sonst mit H. G. überein zu kommen scheint, am Ende auf eben das Resultat verfällt, und Herrn Gerlach in einem Irrthum bestärkt, davon er so leicht wäre zurück zu führen gewesen, verdient eine nähere Prüfung.

22. §.

22. §.

Was H. H. Karstner in den ersten 18 S. S. seines Aufsatzes im 33ten Stück des H. M. vom 24. April 1772 vorträgt, ist der Satz nach mit demjenigen einerley, was ich hier in den ersten 10 S. S. von den ersten Gründen der Photometrie vorgetragen habe, in wie weit es verstatet ist, das Licht so zu betrachten, als wenn es von einem leuchtenden Punkt ausgienge. Im 16. S. der Karstnerschen Abhandlung heist es, die Menge Lichts, welche ein Element, wie Pp unter dem schiefen Winkel $LP C$ auffängt, verhalte sich zu derjenigen, die es senkrecht in der Stellung wie $P\pi$ auffangen würde, wie $P\pi : Pp = 1 : \sin L P C = 1 : \cos C L P$. Eben dies ist nun schon dasselbe, was man haben will, wenn man, wie H. K. nun allererst wieder im 19 S. sagt, annimmt; Licht, das auf eine Ebene (einerley unendlich kleine Ebene in einerley Entfernung vom leuchtenden Punkt) schief fällt, erleuchte sie schwächer, als wenn es senkrecht auffiele, in der Verhältniß des ganzen Sinus zum Sinus der Neigung des Lichts. Die Ebene fängt in der schiefen Lage gegen die Lichtstrahlen in dem erwähnten Verhältniß weniger Licht auf, als sie in der senkrechten Lage auffängt, und darinn ist die Dichtigkeit des über der Ebene in der schiefen Lage verbreiteten Lichts, die Erleuchtung der Ebene, in dem erwähnten Verhältniß schwächer, als die Dichtigkeit des über der Ebene in der senkrechten Lage verbreiteten Lichts. Diefemnach ist es unerwartet, wenn eben der Satz nun im 19. S. der K. Abhandlung nochmal stehet, und zwar als etwas, das von der im 16 S. schon richtig betrachteten Eigenschaft des schief auffallenden Lichts noch verschieden ist. Eben so unerwartet ist es, wenn die im 21 S. gegebene Formel aus dem 16. 17. und 18 S. geschlossen, und doch als eine solche angesehen wird, welche die senkrechte Erleuchtung ausdrücken würde, da der 16. 17. 18. S. offenbar schon das schief auffallende Licht betrachten. Eben die im 21. S. der K. Abh. herausgebrachte Formel

mel ist schon die gesuchte, und wenn H. Karstner sie im 22. S. nochmal mit dem Sinus des Einfallswinkels multiplicirt, so weicht er dadurch von allen denjenigen mir sonst bekannten optischen Schriftstellern ab, die sich auf photometrische Untersuchungen einlassen, wiewohl deren freylich nur sehr wenige sind. Ich weis wohl, daß man sich die Wirkung des Lichts, wenn es schief auffällt, auch wohl wie die Wirkung eines schiefen Stoßes vorgestellt, und daraus geschlossen hat, die Erleuchtung könnte wohl einmal wegen der auffallenden geringern Lichtmenge, und zweyten auch wegen der Schiefe des Stoßes im Verhältniß des ganzen Sinus des Einfallswinkels abnehmen, weswegen also dieses Verhältniß verdoppelt, und die senkrechte Erleuchtung mit dem Quadrat vom Sinus des Einfallswinkels multiplicirt werden mußte, um die schiefe Erleuchtung zu finden. Allein zu geschweigen, daß diese Vorstellung wohl schwerlich der Sache dürfte angemessen befunden werden, so hat nunmehr H. Lambert es außer allen Zweifel gesetzt, daß die Erleuchtung wie der Sinus des Einfallswinkels, und nicht wie das Quadrat dieses Sinus abnimmt. (Photometria sive de mensura & gradibus luminis colorum & umbrae S. 58 — 63. S. 243 — 253.)

23. §.

Diese Anmerkungen vorausgesetzt ist es leicht zu übersehen, woher es komme, daß H. R. zuletzt mit H. G. einerley Auflösung für die Gerlachische Aufgabe findet. H. R. bezeichnet (3. Fig.) den Winkel ACM mit w , also ist der Einfallswinkel $90^\circ - w$. Im 21 S. seiner Abhandlung findet er die Formel $\frac{bb}{xx} E \cos w^3$, wovon ich gesagt habe, daß es schon die gesuchte Formel für die Erleuchtung des äußersten Ringes sey. Bey ihm ist E . die senkrechte Erleuchtung der Flamme in der Entfernung b , und die Entfernung der Elemente des Ringes von der Lichtflamme $= x \sec w$:
L mit

mithin ist die Erleuchtung desselben $= \frac{E. b b}{x^2 \sec w^2} \cos w = \frac{E. bb. \cos w^2}{x x}$

Nach meiner Bezeichnung ließe sich diese Formel mit der oben im 14. und 20. S. mitgetheilten so vergleichen. Wäre um die Lichtflamme als um einen Mittelpunkt mit dem Halbmesser b eine Kugelfläche beschreiben, so wäre die Menge Lichts, die ein Stück dieser Kugelfläche, das $= 1^2$ angenommen worden, auffinge $= E$, mithin $b b. E$. diejenige Menge Lichts, so auf ein Stück von eben dieser Kugelfläche fiele, das dem Quadrat ihres Halbmessers gleich ist. Nach meiner Bezeichnung wäre also $b b. E = S.$ (5 S.) Weiter ist hier

$\cos w = \sin A M C = \frac{x}{\sqrt{(a^2 + x^2)}}$, also wäre $\frac{E. bb. \cos w^2}{x x} =$

$\frac{S. x}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$, welches die Formel des 20. S. ist. Bey Auflösung der

Gerlachischen Aufgabe kommt es nur auf den veränderlichen Factor

$\frac{x}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$ an. Derselbe ist beym H. Gerlach, $\frac{x}{a^2 + x^2}$ weil er

vergibt, mit dem Halbmesser $\sqrt{(a^2 + x^2)}$, welcher hier zum Sinus

x gehört, zu dividiren. H. H. K. aber multiplicirt die Formel $\frac{x}{(a^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}}$

nochmal mit $\cos w$ oder $\frac{x}{\sqrt{(a^2 + x^2)}}$, daher wird seine Formel dem

Ausdruck $\frac{x^2}{(a^2 + x^2)^2}$ proportional, und auf diese Art siehet man

deutlich, woher es komme, daß die Karstnerische Formel gerade das Quadrat der Gerlachischen wird. Weil nun allemal das Quadrat am größten wird, wenn die Wurzel den größten Werth hat, so ist es natürlich, daß H. K. zufälliger Weise mit H. G. auf einerley Resultat kommt.

24. S.

Folgende Anmerkung über den eigentlichen Sinn der Gerlachischen

zu gebrauchen, so wird es noch um so mehr über dem ganzen Tisch helle genug seyn.

20. §.

Diese, urtheilte ich beym ersten Lesen des Gerlach'schen Briefes, möchten etwa des Verfassers Gedanken gewesen seyn, und daß ich es getroffen habe, beweiset nunmehr seine nachher erfolgte Erläuterung; nur schade daß H. Gerlach nicht auch seinen Rechnungsfehler bemerkt, und in eben dieser Erläuterung verbessert hat, wodurch er in dem ersten Briefe auf ein falsches Resultat ist geleitet worden. Nachdem die Erläuterung hinzu gekommen ist, nenne ich dies Versehen nur einen Rechnungsfehler; vorher nach den Ausdrücken, die H. Gerlach im ersten Briefe gebraucht, hätte ich es für einen theoretischen Irrthum gehalten. Dem in vorigen §. festgesetzten Sinn der Aufgabe gemäß, wollte H. Gerlach einen Ausdruck für die Stärke des auf den äußersten Rand des Tisches fallenden Lichts suchen, für die Erleuchtung oder Klarheit dieses äußersten Randes. Setzt man also den beständigen Halbmesser des kreisförmigen Tisches $= a$ die veränderliche Höhe $= x$, so muß man in der Formel

$$\frac{S. c}{(c^2 + x^2) \sqrt{(c^2 + x^2)}} \quad (14. \text{ §.}) \text{ nunmehr } a \text{ statt } c \text{ und } x \text{ statt } c$$

$$\text{schreiben, so ist die Erleuchtung} = \frac{S. x}{(a^2 + x^2) \sqrt{(a^2 + x^2)}}, \text{ oder sie}$$

ist dem Ausdruck $\frac{x}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$ proportional. Aber H. Gerlach sagt im ersten Briefe:

es wächst die Helle auf dem Tisch, wie des Lichts Höhe, und umgekehrt das Quadrat seiner Weite von dem erleuchteten Punkt,

sich Stärke des über der Fläche verbreiteten Lichts heißen. Wenn aber nicht in allen gleichen Elementen des Raums, den ein Körper ausfüllt, gleichviel Masse ist, so kann man nicht nach der Dichtigkeit des ganzen Körpers fragen, sondern nur nach der Dichtigkeit eines Elements desselben in einer gegebenen Stelle. Läuft das Wasser durch die Oeffnung in der vertical stehenden Wand eines Gefäßes so, daß nur diejenigen Elemente gleich schnell hindurch laufen, die in gleicher Tiefe unter der höchsten Fläche des Wassers im Gefäß durchfließen; so kann man nicht nach der Geschwindigkeit der ganzen durchfließenden Masse fragen. Von einer mittlern Dichtigkeit im ersten Fall, von einer mittlern Geschwindigkeit im zweyten Fall, kann wohl die Frage seyn. Wenn also nicht auf gleiche Elemente einer Fläche gleichviel Licht verbreitet ist, so denke ich, es sey dem Niedegebrauch gemäß zu sagen, sie sey nicht allenthalben gleich stark erleuchtet, und alsdenn kann man nicht nach der Erleuchtung der ganzen Fläche fragen, es müßte denn von einer mittlern Erleuchtung die Rede seyn. (13. S.). So wird es also wohl am bequemsten seyn, die Ausdrücke: Dichtigkeit des über einer Fläche gleichförmig verbreiteten Lichts, und Erleuchtung der Fläche, als gleichgültige anzusehen; den Ausdruck: Dichte der Erleuchtung, aber lieber gar nicht zu gebrauchen, weil es fast so klingt, als wenn man Dichtigkeit der Dichtigkeit sagte. Ich sehe wenigstens nicht, warum das, was Dichtigkeit des Lichts heißt, wenn es senkrecht auffällt, Dichtigkeit der Erleuchtung heißen soll, wenn das Licht schief auffällt.

26. §.

Ich gestehe übrigens gern, daß die ganze Ausführung über die Erleuchtung einer Kreisscheibe, so wie sie H. K. vorträgt, mir ganz ungewöhnlich scheine: ich will indessen versuchen, wie weit ich folgen kann. Demnach sey (3. Fig.) $ACM = w$, und mit dem Halbmesser CB

$CB = b$ sey um C eine Kugelfläche beschrieben; so fällt auf den Ring $LMON\lambda\mu\omega$ so viel Licht, als auf die Zone $FGgf$ fallen würde, und die Zone ist $= 2\pi b^2 \sin w. dw$. Mit $H. K.$ setze ich die Dichtigkeit des Lichts in der Kugelfläche $BDE = D$, und die auf die Zone $FGgf$ fallende Strahlenmenge $= 2\pi b^2. D. \sin w. dw$: alsdenn muß D die Strahlenmenge bedeuten, die auf ein Stück der Kugelfläche $= r^2$ fällt. Der Halbmesser AM sey $= u$, und $AC = r$, so ist der Ring $LMON\lambda\mu\omega = 2\pi u du$. Somit kann ich bis zum 45. S. $H. K.$ folgen. Um nun im 46. S. die Erleuchtung des Ringes zu finden, würde ich die Strahlenmenge durch die Fläche dividiren, über die sie verbreitet ist, mithin $\frac{b^2. D. \sin w. dw}{u du}$ erhalten. Weil aber $\frac{u}{r} = \text{Tang } w$ ist, so wird $du = \frac{r dw}{\cos w^2}$, $u du = \frac{r^2 dw \text{tang } w}{\cos w^2} = \frac{r^2 dw \sin w}{\cos w^3}$, und $\frac{b^2 D. dw \sin w}{u du} = \frac{b^2 D \cos w^3}{r^2}$, da dann $b^2. D$ diejenige Strahlenmenge ist, die auf ein Stück der Kugelfläche BDE fallen würde, das dem Quadrat ihres Halbmessers gleich ist. Weil nun diese Strahlenmenge bey mir S heißt, und $\cos w = \frac{r}{\sqrt{(r^2 + u^2)}}$ ist, so würde ich für die Erleuchtung des Ringes den Ausdruck $\frac{S, r}{(r^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}}$ eben so wie oben finden.

So aber rechnet $H. K.$ nicht: ihm ist die Erleuchtung des Ringes, so viel, als die auf den Ring fallende Strahlenmenge in den Sinus des Einfallswinkels multiplicirt. Das ist ein mir ganz ungewohnter Sprachgebrauch, und er scheint von einer mir ganz fremden Anwendung des im 19. S. der $K. A.$ enthaltenen Satzes zu zeugen. Nach $H. K.$ wäre also die Erleuchtung des Ringes $= 2\pi b^2 D. \sin w. \cos w. dw$, mithin wäre sie unendlich klein, und ich denke, die Erleuchtung eines jeden Ringes ist endlich, den äußersten ausgenommen,

der einen unendlich großen Halbmesser hätte. Weiter ist beym **H. K.** die Summe der Erleuchtungen aller zur Kreisfläche gehörigen Ringe so viel, als die Erleuchtung der ganzen Kreisfläche: aber das kommt mir so vor, als wenn jemand sich vorsetzte, die Dichtigkeit der Atmosphäre zu suchen, und sie in solcher Absicht von der Meeresfläche bis an ihre äußern Gränze durch concentrische Kreise in Elemente theilte, die Dichtigkeit eines jeden Elements als unendlich klein in Rechnung brächte, und am Ende die durch Integration gefundene Summe der Dichtigkeiten aller Elemente für die Dichtigkeit der Atmosphäre annähme. Die Masse aller dieser concentrischen Elemente der Atmosphäre ließe sich als unendlich klein in Rechnung bringen, und so könnte man durch Integration die ganze Masse der Atmosphäre finden. Eben so ist auch die auf jeden Ring des Kreises fallende Strahlenmenge unendlich klein, (obgleich die Helligkeit des Ringes endlich ist, die durch Division dieser unendlich kleinen Strahlenmenge mit der unendlich kleinen Fläche des Ringes gefunden wird) und die mittelst der Integration zu findende Summe der auf alle zur Kreisfläche gehörige Ringe fallenden Strahlenmengen giebt die Strahlenmenge, welche der ganze Kreis auffängt.

27. §.

H. Karstners Vortrag würde mit dem meinigen völlig übereinstimmig geworden seyn, wenn wir in den Begriffen überein kämen, welche die Ausdrücke: Menge des Lichts, und Dichtigkeit des Lichts bezeichnen sollen. Nicht die Erleuchtung, sondern das Licht selbst, das über einer Fläche verbreitet ist, es mag übrigens senkrecht, oder schief auffallen, sehe ich als eine Masse an, die durch den Raum der Fläche ausgebreitet ist. Das Licht selbst erleuchtet, die Fläche wird erleuchtet, und zwar letztere überall gleich stark, oder gleichförmig, wenn durch gleiche Elemente derselben
gleich

gleich viel Licht vertheilt ist: im Gegentheil wird sie ungleichförmig erleuchtet, und zwar dasjenige Element mehr, als ein anderes eben so großes Element, wenn über das erstere mehr Licht verbreitet ist, als über das letztere. Darum ist bey mir die Erleuchtung einer Fläche der Menge Lichts proportional, die über einen Flächenraum von bestimmter Größe gleichförmig verbreitet ist. Eben dieser Menge Lichts ist doch wohl nach dem sonst gewohnten Sprachgebrauch die Dichtigkeit des Lichts proportional, weil es desto dichter seyn muß, je mehr davon in einerley Raum enthalten ist. Deswegen verhält sich nach eben dem Sprachgebrauch die Erleuchtung eines Flächenraums, seine Zelligkeit oder Klarheit, wie die Dichtigkeit des über demselben gleichförmig verbreiteten Lichts.

Demnach läßt sich nicht fragen: ob ein Flächenraum heller als der andere sey, wofern nicht über dem einen sowohl, als über dem andern, das Licht gleichförmig ausgebreitet ist; alsdenn aber ist derjenige Flächenraum heller als der andere, wovon jeder Theil, wie groß man ihn auch annehmen will, mehr Licht enthält, als ein eben so großer Theil des andern. Gesezt also, es hätte auch mit dem *Satz* im 19. §. der *K. Abh.* und der Anwendung, welche *H. K.* davon macht, im übrigen seine gute Richtigkeit, gesezt daß auch die unter einem schiefen Winkel auffallende Lichtmenge im Verhältniß des Sinus dieses Winkels schwächer erleuchte; so hieße dies doch nur eben so viel, als wenn die auf diese Fläche schief fallende Lichtmenge in eben dem Verhältniß kleiner wäre. Die so gefundene Lichtmenge gäbe also noch keinen Begriff von der Zelligkeit, Klarheit, Erleuchtung der Fläche, sondern nur dann allererst, wenn man wüßte, wie viel von dem so geschwächten Licht auf ein Stück der Fläche von einerley bestimmter Größe fiele. Man könnte es als ein Licht ansehen, das in eben dem Verhältniß dünner wäre, als das senkrecht auffallende: mithin würde die Erleuchtung des Ringes immer noch

noch das seyn, was H. K. im 65. S. Dichte der Erleuchtung nennt, ich hätte es Dichte des schief auffallenden Lichts, Größe der Erleuchtung genannt. Ja eben das, was H. K. im 65. S. Dichte der Erleuchtung nennt, heißt bey ihm im 22. S. schlechthin Erleuchtung: dort ist es Erleuchtung des Ringes, hier ist es Erleuchtung eines Elements vom Ringe. Jeder Ring für sich ist gleichförmig erleuchtet: also ist Erleuchtung des ganzen Ringes, und Erleuchtung eines Theils desselben so wenig unterschieden, als Dichtigkeit eines Elements von der Dichtigkeit der ganzen gleichartigen Masse. Was im 6. 7. 21. 22. S. E ist, wird daselbst Erleuchtung, Maasß der Erleuchtung, genannt. Dieselbige Sache wird im 44. 47. 48. 50. 65. S. mit D bezeichnet, und Dichte des Lichts in der mit dem Halbmesser b beschriebenen Kugelfläche genannt. Was die Formel $\frac{b b}{x x} E. \cos w^4$ im 22. S. oder $\frac{b^2 D}{r^2} \cos w^4$ (im 65. S. der K. N. wo r mit x einerley ist, so wie E mit D) bezeichnen soll, muß mit D oder E von einerley Art seyn. Jede dieser Formeln muß noch eben die Sache, nur in anderer Größe bezeichnen, wenn $w = 0$, r oder $x = b$ genommen wird, und alsdenn wird E oder D daraus; das ist nun nach dem 65. S. Dichte der Erleuchtung für das mittlste Element des Fisches, wenn die Höhe der Flamme darüber $= b$ ist: eben dasselbe ist nach dem 41. S. Dichte des auffallenden Lichts, und nach dem 6. S. Maasß der Erleuchtung. Ich denke also, man sage lieber nie Dichte der Erleuchtung; die Sache, welche gemeint wird, ist immer Dichte des Lichts, und eben das, was der letzte Ausdruck sagen will, versteht man durch die Ausdrücke: Erleuchtung, Größe der Erleuchtung.

28. S.

Ueberdenkt man schließlich noch H. Karstners Vortrag im 57. bis 62. S. so könnte man leicht auf die Gedanken gerathen, es ließe mit

mit allen photometrischen Grundsätzen auf was willkürliches hinaus, das mit demjenigen, was die gemeinste Erfahrung einen jeden lehrt, gar nicht übereinstimme. H. K. sucht, welcher Ring von allen denjenigen, worinn man die Fläche des Tisches getheilt annimmt, am stärksten erleuchtet, oder am hellsten sey: wäre aber H. K. bey dem sonst nicht allein im gemeinen Leben, sondern auch in der optischen Wissenschaften gewohnten Sprachgebrauch geblieben, und hätte er nicht die Ausdrücke: Erleuchtung, Helligkeit gebraucht, eine Sache zu bezeichnen, die sonst niemand so nennt; so hätte nicht allein jene Aufgabe gar nicht zur Frage kommen können, sondern es wären auch eine Auflösung davon gegeben, wovon H. K. selbst sagen mußte, daß sie ganz willkürlich seyn, (m. s. den 61. S. der K. A.) Es ist von selbst klar, daß der im Mittelpunkt des Kreises Lothrecht unter der Lichtflamme in einen unendlich kleinen Kreis zusammengehende Ring der Helleste wäre, wenn die Kerze selbst, und der Leuchter, worauf sie steht, keinen Schatten dahin würfe; daß aber übrigens die Helligkeit der Ringe abnehme, je größer ihre Halbmesser werden. Im 32. S. sagt H. K. das alles selbst: „ein Element Pp , daß dem Mittelpunkt A näher liegt, ist stärker erleuchtet, als ein anderes, Mm , das von Mittelpunkt A weiter entfernt ist.“ Was von Pp gilt, das gilt von allen Elementen, die um denselben Abstand AP von A entfernt sind, und was von Mm gilt, das gilt von allen, wozu die Entfernung AM gehört: mithin wird auch H. K. selbst nicht in Abrede seyn, daß jeder Ring, dessen Halbmesser kleiner ist, heller sey, als ein anderer, wozu ein größerer Halbmesser gehört: wie kann also noch gefragt werden, welcher Ring am stärksten erleuchtet, oder welcher Ring am hellsten sey? wie kann noch irgend ein anderer, als der, dessen Halbmesser unendlich klein wäre, angenommen werden? wofern die Rechnung auf so etwas leitet, so muß gewiß dabey etwas zum Grunde genommen seyn, das von dem allgemein bekannten Begriffen des gemeinen Lebens abstimmt ist.

29. §.

In der That hat es auch mit den Gründen, worauf H. S. seine Rechnung bauet, diese und keine andere Bewandniß, und was dagegen zu erinnern ist, hat nunmehr H. Gerlach in seiner Erläuterung im 12^{ten} S. ganz richtig bemerkt. So wie die Ausdrücke: Menge einer Masse, und Dichtigkeit einer Masse, ganz verschiedene Begriffe bezeichnen, so ist es auch nicht einerley, ob man die auf eine Fläche fallende Lichtmenge, oder die Dichtigkeit des über der Fläche verbreiteten Lichts sucht: und wenn man die Helligkeit, Klarheit, Erleuchtung der Fläche suchen will, so muß man nicht die auf die Fläche fallende Lichtmenge, sondern die Dichtigkeit des auffallenden Lichts suchen. Wenn sich aber H. Gerlach im 18. S. der Erläuterung 2^{ten}. Durch die Uebereinstimmung seiner gefundenen Regel mit der Rasterischen, in wie weit beyde einerley Aufgabe haben auflösen wollen, vertheilen läßt, seine Regel nun um so mehr für ausgemacht richtig zu halten, so wird das bisherige dazu dienen können, ihn von dem Gegentheil zu überzeugen. Gesezt aber, es wäre auch darum zu thun gewesen, die auf jeden Ring, und daraus die auf den ganzen Kreis fallende Strahlenmenge zu finden; so hätte doch für die auf den Ring fallende Strahlenmenge aus dem 44. S. die Formel $2\pi b^2 D \sin w \cdot dw$ behalten werden müssen. (Diese Strahlenmenge verhielte sich wie $2\pi b^2 D \sin w \cdot \cos w \cdot dw$, wenn in C eine unendlich kleine mit dem Kreise $L M O N$ parallele leuchtende Ebene, keine Lichtflamme angenommen wäre, worüber noch unten einige Anmerkungen folgen werden. (m. s. den 45. 47. S.)) Die Integration dieser Formel giebt für den ganzen Kreis die Strahlenmenge $= 2\pi b^2 D (1 - \cos w) = 2\pi b^2 D \sin w$, wie oben im 15. S. Dasselbst ist schon bemerkt, wie es auch ohne alle Rechnung von selbst einleuchtend sey, daß die auf den Kreis fallende Strahlenmenge einerley seyn müsse mit denjenigen, die auf das Stück der Kugelfläche $F B G$ fällt, welches mit der errechneten Formel überein stimmt.

30. §.

Weil $\text{Tang } w = \frac{z}{c}$ ist, so hat man $\frac{dz}{c} = \frac{dw}{\cos w}$, $\cos w = \frac{c}{\sqrt{c^2 + z^2}}$, $\sin w = \frac{z}{\sqrt{c^2 + z^2}}$, mithin $dw = \frac{dz}{c \cos w} = \frac{c dz}{c^2 + z^2}$, $\sin w \cdot dw = \frac{z}{\sqrt{c^2 + z^2}} \cdot \frac{c dz}{c^2 + z^2} = \frac{c z dz}{(c^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, und die Formel $2\pi b^2 D \sin w \cdot dw$ verwandelt sich in folgende $\frac{2\pi b^2 D c z dz}{(c^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, so wie sie auch oben im 14. §. gefunden ist, wo S das war, was hier $b^2 D$ ist. Nimmt man dz als unveränderlich, oder alle Ringe gleich breit an; so kann man fragen, auf welchen Ring die größte Strahlenmenge falle? weil der Ausdruck $\frac{z}{(c^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ nicht allein wenn $z = 0$, sondern auch wenn $z = \infty$ gesetzt wird, verschwindet. Das Differential hiervon $= 0$ gesetzt giebt $(c^2 + z^2) - \frac{3}{2} - 3z^2 (c^2 + z^2) - \frac{3}{2} = 0$, also $1 - \frac{3z^2}{c^2 + z^2} = 0$, und $z = c\sqrt{\frac{1}{2}}$. Weil nun $\frac{z}{c}$ die Cotangente des Einfallswinkels ist, so muß selbige dem $\sin 45^\circ$ gleich seyn, und der Einfallswinkel selbst $= 54^\circ 44'$. Die Verlaichische Aufgabe erforderte, daß die Tangenten des Einfallswinkels $= \sin 45^\circ$ sey, (21. §.) und der Einfallswinkel selbst $= 35^\circ 16'$. demnach erfordert die eine dieser beyden Aufgaben einen Einfallswinkel, welchen derjenige, den die andere erfordert, zu 90° ergänzt.

Ob nun gleich die Voraussetzung, daß die Ringe gleich breit seyn sollen, hier wohl die natürlichste ist, so kann man doch auch mit H. K. den Winkel w in der Rechnung behalten, und fragen: auf welchen Ring die größte Strahlenmenge falle, bey der Voraussetzung, daß dw unveränderlich sey, welches die scheinbare Breite der Ringe wäre aus dem leuchtenden Punkt gesehen. Nun wird derjenige Ring die größte Strahlenmenge $2\pi b^2 D \sin w \cdot dw$ auffangen, für den $\sin w$ am größten ist, mithin allemahl der äußerste, weil z den Halbmesser des Tisches nicht übertreffen kann, das alles ließ sich auch ohne Rechnung

nung voraus sehen, weil dz als die Differenz der Tangente des Winkels w für den Halbmesser c schnell wächst, wenn w um gleiche Differenzen anwächst. Wenn also gleich bey Ringen von größern Halbmessern die Menge der auffallenden Strahlen auf einen gleichen Flächenraum wegen des kleinern Einfallswinkels abnimmt, so nimmt doch die Menge der auf den ganzen Ring fallenden Strahlen um deswillen stärker zu, weil der Flächenraum des Ringes schnell zunimmt.

31. §.

Wenn es in der Ausübung von Nutzen wäre, so würde es keine Schwierigkeit haben, die Aufgabe des 14. S. allgemeiner aufzulösen, die erleuchtete Ebene Fläche möchte eine Gestalt haben, wie man wollte. Allemal würden die auffallenden Strahlen in dem Raum einer Pyramide, oder eines Regelartigen Körpers enthalten seyn, wozu die erleuchtete Ebene als einer Grundfläche gehörte, und zwischen den Seitenflächen der auffallenden Strahlen-Pyramide, oder Fläche des Auffallenden Strahlenkegels wird ein Stück der Kugelfläche $DBEG$ (3. Fig.) enthalten seyn, worauf eben so viele Strahlen fallen würden, als die erleuchtete Ebene auffängt. Wenn auch gleich die erleuchtete Fläche nicht eben, sondern wie man will gestaltet wäre, so würden doch die Strahlen, welche den äußern Umfang der Fläche treffen, so weit sie von dem leuchtenden Punkt beschienen werden kann, ebenfalls in einem kegelartigen Raum enthalten seyn, und zwischen der diesen kegelförmigen Raum umgränzenden Fläche, würde ein Stück der Kugelfläche $DBEG$ liegen, das mit der erleuchteten Fläche einerley Strahlenmenge auffänge. Es sey der Quadrat-Inhalt dieses Theils der Kugelfläche $= k^2$, den Halbmesser $= 1$ gesetzt, und die auf die erleuchtete Fläche fallende Strahlenmenge $= M$, so hat man $1 : k^2 = S : M$, und $M = k^2 S$.

32. §.

32. §.

Wenn AGB (4. Fig.) dasjenige Stück der Oberfläche eines Körpers ist, wohin der leuchtende Punkt M Strahlen werfen kann, und man nimmt etwan in der Mitte der erleuchteten Fläche AGB , oder wo es sonst am bequemsten ist, einen bekannten Punkt G an, so kann die grade Linie MG als eine Axe des auffallenden Strahlenkegels betrachtet werden. Eine Ebene durch diese Axe gelegt, schneidet die Kugeloberfläche, so wie die erleuchtete Fläche, und giebt an M einen Winkel AMB , der als der scheinbare Durchmesser der erleuchteten Fläche in der schneidenden Ebene anzusehen wären, wenn das Auge in M stünde. Auf ähnliche Art, wie dieser Winkel einen Begriff giebt von der scheinbaren Länge oder Breite des erleuchteten Körpers nach einer gewissen Richtung genommen, kann der ganze innere Raum der Ecke oder conischen Spitze an M dienen, einen Begriff von der ganzen scheinbaren Ausdehnung des erleuchteten Körpers nach allen Seiten zu geben, wenn man sich vorstellt, er würde aus M gesehen. Dasjenige Stück DFE einer um den Mittelpunkt M mit dem Halbmesser $= 1$ beschriebenen Kugeloberfläche, was innerhalb der Gränzen dieses Kegel- oder pyramidenförmigen Raums liegt ist das Maas der Ecke oder conischen Spitze an M , (3 S) mithin kann eben dieses Stück DFE der Kugeloberfläche um M das Maas der scheinbaren Größe oder Ausdehnung des erleuchteten Körpers nach allen Seiten abgeben, wenn die Stelle des Auges in M angenommen wird. Diesemnach verhält sich allemal die Menge aller Strahlen, welche von dem leuchtenden Punkt M nach allen Seiten ausgehen, zu der auf die erleuchtete Fläche AB fallenden Strahlenmenge, wie die ganze Kugeloberfläche zur scheinbaren Größe der erleuchteten Fläche aus M gesehen. Wenn S die oben angenommene Bedeutung behält, so ist $1 : 4\pi = S$ zur Menge alles Lichts, so ein leuchtender Punkt nach allen Seiten ausbreitet, und es wird diese

Lichtmenge $= 4\pi S$. Sie ist die möglichst größte, welche ein leuchtender Punkt auf eine erleuchtete Fläche werfen kann. Eine Ebene, und wenn sie gleich nach allen Seiten ins unendliche ausgebreitet wäre, könnte nur eine halb so große Lichtmenge $= 4\pi S$ auffangen.

Theorie

Der Erleuchtung, wenn das Licht von einer leuchtenden Fläche ausgehet.

33. §.

Alle Strahlen, (1. Fig.) die von dem leuchtenden Punkt L nach allen Seiten ausgehen, sind bisher als einfache Strahlen betrachtet worden, und zugleich als solche, wovon ein jeder LE den dazu gehörigen Punkt E der Kugelfläche, die um L als einen Mittelpunkt angenommen wird, so stark als jeder andere LF den dazu gehörigen Punkt F erleuchtet. Wenn dagegen (5. Fig.) L eine unendlich kleine leuchtende Ebene ist, so muß man sich von der Art, wie selbige den um sie her befindlichen Raum erleuchtet, eine andere Vorstellung machen. Und L als einen Mittelpunkt sey eine Kugelfläche beschrieben, und die unendlich kleine Ebene Ll sey nach allen Seiten erweitert, so wird sie die um L beschriebene Kugelfläche in zwei Halbkugeln theilen, wovon BAC eine vorstellt, nimmt man nun die unendlich kleine Ebene Ll nur auf der nach A gekehrten Seite leuchtend an, wie geschehen muß, wenn Ll ein Element der Oberfläche eines leuchtenden Körpers vorstellt; so wird alles Licht, was von Ll kommt, in dem Raum der Halbkugel CAD ausgebreitet seyn. Ob nun gleich diese Ebene Ll nur eine unendlich kleine Ausdehnung hat, so kann man sich doch die Sache so vorstellen, als wenn sich in derselben mehrere Punkte unterscheiden ließen, und von jedem

jedem dieser Punkte Licht nach allen Richtungen ausginge. Von jedem Punkt in Ll wird also ein einfacher Strahl auf jeden Punkt M der Kugelfläche fallen, und alle diese in M zusammengehenden Strahlen sind in dem Pyramiden- oder Kegelförmigen Raum LMl enthalten. Weil übrigens Ll in Vergleichung mit LM unendlich klein angenommen wird, so sind alle auf M fallende Strahlen als parallel zu betrachten, die unter einerley Winkel CLM von Ll ausgehen, und diesen Winkel werde ich mit ϕ . Lambert den **Ausflußwinkel** nennen.

34. §.

Es sey also LAl ein Strahlenkegel, der von Ll senkrecht ausgehet, so wie LMl unter dem schiefen Winkel CLM . Wären nun alle Punkte in Ll vollkommen durchsichtig, so fielen auf M so viel Licht, als auf A : wenn aber Ll nicht durchsichtig ist, wie man voraussetzen muß, wenn Ll ein Element der Oberfläche eines leuchtenden Körpers ist, so fällt auf M weniger Licht, als auf A weil die seitwärts nach l zuliiegenden Punkte von demjenigen Licht etwas aufhalten, was die nach L zuliiegenden Punkte nach M schicken würden. So ist klar, daß nach C gar kein Licht mehr hinkommen kann, weil jeder Punkt, wie w , durch alle diejenigen, die zwischen w und l liegen, durchscheinen müsse, wenn nach C Licht hinkommen sollte. Eben so müßte jeder Punkt w zum Theil durch die seitwärts nach l zuliiegenden Punkte durchscheinen, wenn nach M eben so viel Licht, als nach A kommen sollte. Nach A zu, kann jeder einfache Strahl frey ausgehen, ohne daß die seitwärts liegenden Punkte das nach dieser Richtung ausgehende Licht wegen ihrer Undurchsichtigkeit vermindern.

Auch hier kann man, wie im 9. §. das Element Ll als ein unendlich kleines Rechteck betrachten, dessen eine Seitenlinie Ll ist, und
wo

wovon die andere Seitenlinie Ll ist, und wovon die andere Seitenlinie durch l auf der Ebene CLA senkrecht ist. Wenn nun durch letztere eine Ebene auf LM senkrecht gesetzt wird, wovon das Stück $l\lambda$ zwischen den Gränzen der Strahlen-Pyramide LMl liegt, so kann auf M nicht mehr Licht fallen, als $l\lambda$ nach M schicken würde, wenn $l\lambda$ mit Ll einerley Glanz hätte. Alsdenn aber verhielte sich die Menge Lichts, welche Ll nach A schickt, zu derjenigen, welche $l\lambda$ nach M schickt, wie $Ll : l\lambda$; mithin verhält sich auch die Menge Lichts, welche Ll nach A schickt, zu derjenigen, welche M von Ll empfängt, wie $Ll : l\lambda = 1 : \sin CLM$.

Diesemnach ist die Menge des nach jeden Punkt M der Kugelfläche von Ll ausgehenden Lichts dem Sinus des Ausflußwinkels proportional.

35. §.

Nunmehr betrachte man auch ein Element Mm der Kugelfläche, das zwar unendlich klein angenommen werden muß, worin man sich gleichwohl mehrere Punkte vorstellen kann, wovon jeder die Spitze einer auffallenden Pyramide zusammengehender Strahlen ist wie LMl , jedoch so, daß für alle diese Pyramiden der Ausflußwinkel einerley bleibt. Nun würde auch jeder Punkt des leuchtenden Elements Ll auf Mm einen Kegel oder eine Pyramide, aus einander gehender Strahlen, wie MLm werfen, wenn das Licht von jedem Punkt in Ll nach Mm ungehindert kommen könnte, ohne daß es wegen der Undurchsichtigkeit der nach l zu liegenden Punkte geschwächt würde. Die Menge des von jedem dieser Punkte auf Mm

fallenden Lichts wäre $= \frac{S \cdot Mm}{LM^2}$, wenn S den Glanz eines jeden dieser Punkte bedeutet, und alle gleich stark glänzend angenommen werden. Wenn demnach Aa dasjenige Element der Kugelfläche ist,

ohn das Licht von Ll unter einem rechten Winkel ausgehet; so
 ist von jedem Punkt dieses leuchtenden Elements Ll auf Aa die
 Strahlenmenge $\frac{S, Aa}{AL^2}$, weil das dahin ausgehende Licht wegen der
 Durchsichtigkeit der leuchtenden Fläche keinen Abgang leidet, und
 die gesammte Strahlenmenge, welche Ll nach Aa schickt, ist =
 $\frac{4\pi}{L^2} Ll$; denn die Menge der auf Aa fallenden Regel auseinander-
 gehender Strahlen, wovon ALa , Ala , die beyden äußersten
 vorstellen, muß dem Element Ll proportional seyn. Auf Mm wür-
 de also die Strahlenmenge $\frac{S, Mm}{LM^2} \cdot Ll$ fallen, wenn Ll vollkom-
 men durchsichtig wäre: wegen des Abgangs aber, den das von Ll
 hier ausgehende Licht leidet, weil Ll undurchsichtig angenommen
 wird, ist die Strahlenmenge, welche auf Mm fällt, = $\frac{S, Mm}{LM^2} Ll$.
 In CLM . Diese auf Mm fallende Strahlenmenge durch die Flä-
 che des Elements Mm dividirt, giebt die Dichtigkeit des über Mm
 verbreiteten Lichts, die Klarheit oder Erleuchtung des Elements Mm :
 dahin ist diese Erleuchtung des Elements $Mm = \frac{S, Ll \sin CLM}{LM^2}$.

36. §.

Aus diesen Schlüssen ergibt sich, daß die Halbkugelfläche
 AC nicht gleichförmig erleuchtet sey, wie in dem Fall, wenn man
 in ihrem Mittelpunkt einen einzigen leuchtenden Punkt vorstellt.
 Die Erleuchtung ist hier für jede Stelle der Kugelfläche dem Sinus
 des Ausflußwinkels proportional, weil sich LM für einerley Kugel-
 fläche nicht ändert. Wenn aber gleich die Strahlenkegel LMl unter
 nem veränderlichen Winkel CLM von Ll ausgehen, so fallen sie
 doch auf die Kugelfläche senkrecht. Wosern dagegen die unendlich

N

kleine

Keine Ebene Ll ihr Licht auf die Ebene Fläche DE wirft; so ist auch der Einfallswinkel LPD veränderlich. Fällt der unendlich kleine Strahlenkegel LMl senkrecht auf DE , so ist das Element Mm zugleich ein Element der Kugelfläche, wozu der Halbmesser LM gehört, mithin ist die Erleuchtung dieses Elements $= \frac{S. Ll. \sin CLM}{LM^2}$, und die Menge des auf Mm fallenden Lichts $= \frac{S. Ll. \sin CLM}{LM^2} Mm$.

Wenn ferner Pp ein anderes Element der Ebene DE ist, auf welches die Lichtkegel PLp , Pp , unter dem schiefen Winkel LPD fallen, so ist die Menge Lichts, welche jeder Punkt des leuchtenden Elements Ll nach Pp schickt $= \frac{S. Pp. \sin LPD}{LP^2}$, in der Voraussetzung, daß sich alles von jedem Punkt in Ll ausgehende Licht frei ausbreiten kann. In eben dieser Voraussetzung wäre die Menge Lichts, welche Ll nach Pp schickte, $= \frac{S. Pp. \sin LPD}{LP^2}$, Ll : wegen der Undurchsichtigkeit des Elements Ll aber ist diese Lichtmenge in dem Verhältniß $1 : \sin CLP$ kleiner, mithin ist sie $= \frac{S. Pp. \sin LPD}{LP^2} Ll \sin CLP$, und die Dichtigkeit des über Pp verbreiteten Lichts, die Klarheit oder Erleuchtung des Elements Pp ist $= \frac{S. Ll. \sin CLP. \sin LPD}{LP^2}$.

• 37. §.

Von zweien unendlich kleinen Ebenen (s. Fig.) Ll , Pp , schickt jede der andern einerley Menge Lichts zu, es mag die eine, oder die andere als leuchtend angenommen werden.

Bei

Beweis. Wenn Ll leuchtend ist, so ist die Lichtmenge, e auf Pp fällt, $= \frac{S. Pp. \sin LPD.}{L P^2} \cdot Ll. \sin CLP.$ (36. §.)
) dagegen Pp als leuchtend angenommen, so ist die Lichtmenge, e auf Ll fällt, nach eben der Regel $= \frac{S. Ll. \sin CLP}{L P^2} \cdot Pp. LPD,$ weil sich nur die Einfallswinkel verwechseln.
 in ist die Menge Lichts, welche eine Ebene der anderen zuschickt
 in den Fällen einerley.

Wenn also beyde unendlich kleine Ebenen gleich groß sind, so ist die Erleuchtung in beyden Fällen einerley: widrigenfalls verhält sich die Erleuchtung, wie die erleuchtende Fläche. Wenn Ll leuchtend ist, so ist die Erleuchtung über $Pp = \frac{S. Ll. \sin CLP. \sin LPD.}{L P^2};$
) aber Pp leuchtend ist, so ist die Erleuchtung über $Ll = \frac{P. \sin CLP. \sin LPD.}{L P^2},$ und die erste verhält sich zur zweyten, $Ll; p p.$

38. §.

Wenn das Element Mm das von Ll ausgehende Licht senkrecht auffängt; so verhält sich die Erleuchtung, die Mm von Ll empfängt, wie das Produkt der scheinbaren Größe des leuchtenden Elements Ll das Auge in M genommen, in den Glanz des Elements.

Beweis. Die unendlich kleine auf LM senkrechte Ebene zwischen den Gränzen des auf M fallenden Strahlenkegels LMl ist als ein Element einer mit dem Halbmesser ML beschriebenen Kugeloberfläche zu betrachten, und so ist $\frac{1 \lambda}{L M^2} = \frac{Ll. \sin CLM}{L M^2}$
 Nach des conischen oder pyramidenförmigen Raums LMl (4. §.)

Ma

und

und der scheinbaren Größe des Elements Ll aus M gesehen. (32. S.)

Es war aber die Erleuchtung dieses Elements $Mm = \frac{S. Ll. \sin CLM}{L M^2}$

und $S.$ bezeichnet den Glanz eines jeden der Punkte, die man sich zu dem Element Ll gehörig vorstellen kann, mithin den Glanz des Elements

selbst. Demnach verhält sich die Erleuchtung, wie $\frac{S. Ll. \sin CLM}{L M^2}$,

oder wie das Produkt der scheinbaren Größe des Elements Ll aus M gesehen, in den Glanz des Elements.

39. §.

Wenn das Element Pp das von Ll ausgehende Licht schief auffängt, so ist die Erleuchtung dem Produkt der scheinbaren Größe des leuchtenden Elements P gesehen in den Glanz des Element und den Sinus des Einfallswinkels proportional.

Beweis. Die scheinbare Größe des Elements Ll aus Pp sehen ist $= \frac{Ll. \sin CLP}{L P^2}$ (4. 32, 38. S.) und LPD ist der Einfallswinkels; mithin ist das Produkt der scheinbaren Größe des Elements Ll aus P gesehen, in den Glanz des Elements und den Sinus des Einfallswinkels $= \frac{S. Ll. \sin CLD. \sin LPD}{L P^2}$, und diesem Ausdruck ist die Erleuchtung, welche Pp von Ll empfängt, proportional (36. S.)

Bei einerley Glanz einerley scheinbaren Größe des leuchtenden Elements und einerley Einfallswinkel ist also die Erleuchtung einerley.

40. §.

Die Strahlenmenge, welche das leuchtende Element
 Ll

Ll der unendlich kleinen Ebene Pp zu schickt, verhält sich wie das Produkt der scheinbaren Größe des erleuchteten Elements Pp aus L gesehen in den Sinus des Ausflußwinkels, den Flächen-Innhalt und Glanz des leuchtenden Elements.

Beweis. Die erwähnte scheinbare Größe ist $= \frac{Pp \cdot \sin LPD}{L P^2}$.
 (32. S.) Diese in den Sinus des Ausflußwinkels den Flächen-Innhalt und Glanz des Elements Ll multipliziert giebt $\frac{S. Ll \cdot \sin CLP \cdot Pp \cdot \sin LPD}{L P^2}$,
 und diesem Produkt ist die auf Pp fallenden Strahlenmenge proportional. (36. S.)

Wenn also der Glanz nebst dem Flächen-Innhalt des leuchtenden Elements einerley ist, so verhält sich die Strahlenmenge, wie das Produkt der scheinbaren Größe des erleuchteten Elements aus L gesehen in den Sinus des Ausflußwinkels : und wenn auch die scheinbare Größe des erleuchteten Elements nebst dem Ausflußwinkel einerley ist, so ist die Strahlenmenge einerley.

41. §.

Wenn eine in allen ihren Elementen gleich stark glänzende Fläche (4. Fig.) AGB von endlicher Größe, die übrigens eben, oder wie man will gekrümmt seyn mag, die unendlich kleine Ebene Mm erleuchtet ; so ist die Erleuchtung, welche Mm empfängt, eben so groß, als sie seyn würde, wenn zwischen den Gränzen des auffallenden Strahlenkegels AMB eine andere eben so stark glänzende Fläche $HO K$ befindlich wäre, die ihr Licht nach Mm schickte.

Beweis. Es sey Ll ein Element der leuchtenden Fläche AGB , so ist zwischen den Gränzen der auf Mm fallenden Strahlen-Pyramide

mitte LMl ein Element Qq der Fläche HOK enthalten, und beide Elemente Ll , Qq , haben einerley scheinbare Größe aus M gesehen, auch würde das Licht von Qq unter eben dem Einfallswinkel auf Mm fallen, unter welchem es von Ll auffällt. Mithin würde Mm von Qq so stark erleuchtet seyn, als von Ll , (39. §.) Wäre aber die ganze Fläche AGB in unendlich kleine Elemente wie Ll getheilt, so würden die von allen diesen Elementen auf Mm fallenden Strahlen-Pyramiden die Fläche HOK in eben so viele Elemente theilen, und jedes Element in AGB würde mit dem dazu gehörigen Element in HOK einerley scheinbare Größe haben, das Auge in M angenommen, auch würde der Einfallswinkel für jede zwey dergleichen zusammen gehörige Elemente einerley seyn. Mithin würde jedes Element in HOK eben so stark als das dazu gehörige Element in AGB erleuchten: folglich muß auch die Summe der Erleuchtungen, welche alle Elemente zusammen in HOK auf Mm werfen, so groß seyn, als die Summe der Erleuchtungen, welche Mm von allen Elementen in AGB zusammen empfängt, oder die ganze Fläche HOK muß Mm eben so stark, als AGB erleuchten.

42. §.

Wenn die unendlich kleine Ebene Mm leuchtend ist, und ihr Licht auf eine Fläche AGB von willkürlicher Gestalt und Größe wirft; so fängt AGB eine eben so große Strahlenmenge auf, als jede andere Fläche HOK zwischen den Gränzen des von Mm auf AGB fallenden Strahlentegels auffangen würde.

Beweis. Es sey wiederum Ll ein Element der Fläche AGB , und zwischen den Gränzen der auffallenden Strahlen-Pyramide LMl sey das Element Qq der Fläche HOK enthalten, so haben die Elemente Ll , Qq , einerley scheinbare Größe aus M gesehen, und für beide

beide ist der Ausflußwinkel einerley, mithin auch die auffallende Strahlenmenge. (40. S.) Man kann aber die ganze Fläche AGB in Elemente wie Ll eintheilen, so wird dadurch die auffallenden Strahlen-Pyramiden $HO K$ in eben so viele Elemente getheilt, für paar zusammen gehöriger Elemente ist die scheinbare Größe und der Ausflußwinkel einerley, mithin auch die auffallenden Strahlenmenge: also muß die ganze Fläche $HO K$ eine eben so große Strahlenmenge als AGB auffangen.

43. §.

Jede leuchtende Fläche (4. Fig.) AGB oder $HO K$ wirft so viel Licht auf eine unendlich kleine Ebene Mm , als die letztere, wenn sie leuchtend wäre, auf erstere werfen würde.

Beweis. Um den Mittelpunkt M sey eine Kugelfläche mit dem Halbmesser $= 1$ beschrieben, wovon das Stück DFE zwischen den Gränzen des auf Mm fallenden Strahlenkegels liegt, so wirft DFE so viel Licht, auf Mm , als AGB oder $HO K$ dahin werfen würden. (41. S.) Umgekehrt, wenn Mm leuchtend ist, so wirft Mm so viel Licht auf AGB , oder $HO K$, als Mm auf DFE werfen würde, (42. S.) Nun sey Nn ein Element von DFE , so empfängt Mm von Nn die Erleuchtung $S. Nn. \sin NMm$, und dieser Ausdruck für alle Elemente in DFE summirt, giebt die Erleuchtung, welche Mm empfängt $= S. \int Nn. \sin NMm$, mithin die auf Mm fallende Strahlenmenge $= S. Mm. \int Nn. \sin NMm$. Umgekehrt würde Mm auf Nn die Strahlenmenge $S. Nn. Mm. \sin NMm$ werfen, mithin auf alle Elemente in DFE zusammen die Strahlenmenge $S. Mm. \int Nn. \sin NMm$, welche der vorigen gleich ist.

Aus dem 37. §. läßt sich eben der Satz auch ganz kurz so herleiten

leiten. Jedes Element Ll wirft auf Mm so viel Licht, als Mm bey einerley Glanz auf Ll werfen würde. Dithin müssen alle Elemente Ll zusammen auf Mm so viel Licht werfen, als Mm alle Elemente Ll zusammen verbreiten würde: das heißt Mm empfängt von der ganzen Fläche AGB so viel Licht, als umgekehrt Mm der ganzen Fläche AGB zuschicken würde.

44. §.

Jede leuchtende Fläche (6. Fig.) AB wirft auf jede andere Fläche CD so viel Licht, als umgekehrt letztere, wenn sie leuchtend und eben so stark glänzend als AB wäre, auf AB werfen würde.

Beweis. Auf jedes Element Mm von CD wirft AB so viel Licht, als umgekehrt Mm auf AB werfen würde. (43. S.) Dithin wirft AB auf alle Elemente Mm zusammen so viel Licht, als letztere zusammen umgekehrt auf AB werfen würden: d. i. AB wirft auf CD so viel Licht, als umgekehrt CD auf AB werfen würde.

In den dreyen letzten Sätzen des 42. 43. 44. S. ist nur von der Menge Lichts die Rede, welche eine Fläche der andern zuschicken würde, keinesweges von der Erleuchtung.

45. §.

Die Halbkugelfläche BAC ist leuchtend, und wirft ihr Licht auf das Element Ll , welches mit Mittelpunkt der Halbkugel auf ihrer Axe $L. A.$ senkrecht ist: man sucht die Erleuchtung des Elements Ll , welche es von jedem gegebenen Segment MAN der Kugelfläche, das zur Axe AL gehört, empfängt.

Auflösung. Wenn MN und mn ein Paar zur Axe AL gehö-

Parallellkreise vorstellen, deren Entfernung von einander unendlich klein ist; so liegt zwischen beyden eine Zone $Mm n N$ der Kugelfläche, und von allen Punkten dieser Zone fällt das Licht auf Ll unter einerley Einfallswinkel CLM , so wie überall der Ausfallswinkel $= 90^\circ$ ist. Der Flächen-Inhalt des Segments MAN ist $= 2\pi r^2 \sin \alpha$, wenn $ALM = \alpha$ gesetzt wird, also die Fläche der Zone $MNnm = 2\pi r^2 d\alpha \sin \alpha$; und weil der Einfallswinkel $CLM = 90^\circ - \alpha$ ist, so hat man die Erleuchtung, welche die Zone MN nach $B1$ schickt, $= 2\pi S d\alpha \sin \alpha \cos \alpha$. (36. S.) das Integral hiervon so genommen, daß es mit α zugleich verschwindet, ist $= \pi S \sin \alpha^2$, und dasselbe drückt die Erleuchtung aus, welche das Segment MAN nach Ll schickt: wird $ALM = \alpha = 90^\circ$ angenommen, so findet man für die völlige Halbkugel die Erleuchtung $= \pi S$.

Weil die Fläche des Kreises $MN = \pi r^2 \sin \alpha^2$ ist, und die Erleuchtung, welche das Segment MAN nach Ll schickt, $= \pi S \sin \alpha^2$, so ist selbige der Grundfläche dieses Segments proportional nicht der Kugelfläche des Segments.

Abnutzen die Strahlen allen senkrecht auf Ll fallen, so wäre die Erleuchtung, welche jede Zone $Mm n N$ dahin schickte, $= 2\pi S d\alpha \sin \alpha$, und die gesammte vom Segment MAN dahin fallende Erleuchtung wäre $= 2\pi S \sin \alpha$, mithin wäre sie der Kugelfläche des Segments proportional. Sie ist aber wegen der Schiefe der Einfallswinkel $= \pi S \sin \alpha^2$; und weil man $\sin \alpha^2 = 1 - \cos \alpha^2 = 1 - (1 - \sin \alpha)^2 = 2 \sin \alpha - \sin \alpha^2$ erhält, so ist eben diese Erleuchtung, welche Ll von dem Segment MAN empfängt, $= 2\pi S \sin \alpha - \pi S \sin \alpha^2$. Der positive Theil wäre die Erleuchtung, wenn die Schiefe der Einfallswinkel die Erleuchtung nicht schwächte, und eben die von dieser Ursache herrührende Verminderung ist $= \pi S \sin \alpha^2$. Dieser negative Theil verschwindet in Vergleichung des positiven, wenn α unendlich klein angenommen wird; so lange demnach

D

nach

nach das erleuchtende Segment, wie $a A a$ als unendlich klein betrachtet werden kann, so lange ist die Erleuchtung der Fläche desselben proportional.

46. §.

Wird der Flächen-Innhalt des Elements $L l = a^2$ gesetzt, so ist die Strahlenmenge, welche das Segment MAN auf $L l$ wirft, $= w^2 \cdot \pi S \sin \alpha^2$. Eben so viel Licht würde das Element $L l$, wenn es leuchtend, und eben so stark glänzend wäre, über die Fläche des Segments MAN verbreiten. (43. S. Diese Strahlenmenge ist also ebenfalls nicht der Fläche des Kugelsegments MAN , sondern der Grundfläche desselben MON proportional, und diejenige Lichtmenge, welche das Element $L l$ über die völlige Halbkugel verbreitet, ist $= w^2 \cdot \pi \cdot S$.

Wenn alles Licht, das von jedem Punkt des Elements $L l$ kommt, sich ungehindert nach allen Seiten ausbreiten könnte, ohne daß wegen der Undurchsichtigkeit des Elements das schief ausgehende Licht Abgang litte, so wäre die Strahlenmenge, welche die Zone $M m n N$ auffänge $= \frac{w^2 \cdot S \cdot M m n N}{r^2} = 2 w^2 \pi S d \alpha \sin \alpha$, und die gesammte Strahlenmenge, welche das Segment MAN auffänge, wäre $= 2 w^2 \pi S \sin \nu \alpha$: mithin eben so groß, als die Strahlenmenge, die MAN nach $L l$ schicken würde, wenn die Schiefe der Einfallswinkel des Licht nicht schwächte, so wie es hier die Schiefe der Ausflußwinkel schwächt: die von $L l$ ausgehende auf MAN fallende Strahlenmenge wäre der Fläche des Segments MAN proportional, wie auch für sich klar ist. Wie nun die auf MAN wirklich fallende Strahlenmenge $= w^2 \cdot \pi S \sin \alpha^2 = w^2 \pi S (2 \sin \nu \alpha - \sin \nu \alpha^2)$ ist, so zeigt hier der negative Theil die von der Schiefe der Ausflußwinkel herrührende Verminderung der Strahlenmenge an. Wenn dieß

Ll der unendlich kleinen Ebene *Pp* zu schickt, verhält sich wie das Produkt der scheinbaren Größe des erleuchteten Elements *Pp* aus *L* gesehen in den Sinus des Ausflußwinkels, den Flächen-Innhalt und Glanz des leuchtenden Elements,

Beweis. Die erwähnte scheinbare Größe ist $\frac{Pp \cdot \sin LPD}{L P^2}$.
(32. S.) Diese in den Sinus des Ausflußwinkels den Flächen-Innhalt und Glanz des Elements *Ll* multiplicirt giebt $\frac{S, Ll \cdot \sin CLP \cdot Pp \cdot \sin LPD}{L P^2}$, und diesem Produkt ist die auf *Pp* fallenden Strahlenmenge proportional. (36. S.)

Wenn also der Glanz nebst dem Flächen-Innhalt des leuchtenden Elements einerley ist, so verhält sich die Strahlenmenge, wie das Produkt der scheinbaren Größe des erleuchteten Elements aus *L* gesehen in den Sinus des Ausflußwinkels : und wenn auch die scheinbare Größe des erleuchteten Elements nebst dem Ausflußwinkel einerley ist, so ist die Strahlenmenge einerley.

41. §.

Wenn eine in allen ihren Elementen gleich stark glänzende Fläche (4. Fig.) *AGB* von endlicher Größe, die übrigens eben, oder wie man will gekrümmt seyn mag, die unendlich kleine Ebene *Mm* erleuchtet ; so ist die Erleuchtung, welche *Mm* empfängt, eben so groß, als sie seyn würde, wenn zwischen den Gränzen des auffallenden Strahlenkegels *AMB* eine andere eben so stark glänzende Fläche *HOK* befindlich wäre, die ihr Licht nach *Mm* schickte.

Beweis. Es sey *Ll* ein Element der leuchtenden Fläche *AGB*, so ist zwischen den Gränzen der auf *Mm* fallenden Strahlen-Pyramide

jenige Lichtmenge, welche Mm von einem Element Ll der Fläche AB empfängt, ein unendlich kleiner Theil von derjenigen Lichtmenge, welche die ganze Fläche AB auf das Element Mm wirft. Wenn M die gesammte Lichtmenge ist, welche AB auf CD wirft, so ist dM diejenige Menge, welche Mm empfängt, und $\frac{dM}{Mm}$ die Erleuchtung des Elements Mm , welche von AB herrührt. Damit die endlich sey, müssen dM und Mm unendlich kleine Größen seyn, die zu einerley Ordnung gehören. Man setze also $\frac{dM}{Mm} = \mathcal{F}$, so ist \mathcal{F} die Erleuchtung des Elements Mm , und $dM = \mathcal{F} \cdot Mm$. Ob nun gleich diese Lichtmenge in Vergleichung mit derjenigen, welche AB auf CD wirft, unendlich klein ist, so ist doch in Vergleichung mit jener wiederum diejenige unendlich klein, welche ein Element Ll der Fläche AB auf Mm wirft. Wird also L statt $\mathcal{F} \cdot Mm$, oder dM geschrieben, so wirft Ll auf Mm die Lichtmenge $dL = d\mathcal{F} \cdot Mm$, und die Erleuchtung, welche Mm von Ll empfängt, ist $\frac{dL}{Mm} = d\mathcal{F}$. So begreift man, wie die Erleuchtung welche Lm von AB empfängt, als die Summe der Erleuchtungen betrachtet werden könne, welche alle Elemente der Fläche AB nach Mm schicken, wie also \mathcal{F} durch die Integralrechnung gefunden werden könne, wenn $d\mathcal{F}$ bekannt ist. Aus \mathcal{F} wird alsdenn ferner die Strahlenmenge $M = \int \mathcal{F} \cdot Mm$ gefunden.

48. §.

Ob nun gleich dieser Vorstellung gemäß, die Lichtmenge, welche ein Element einer leuchtenden Fläche um sich her verbreitet, als unendlich klein in der Rechnung zu betrachten ist; so ist doch das, was bisher der Glanz des Elements genannt, und in den Formeln mit S bezeichnet ist, als eine endliche Größe in der Rechnung zu betrachten. Eigentlich hat es damit folgende Bewandniß. Man stellt sich

vor, daß von jedem Punkt (5. Fig.) L des Elements Ll nach n Seiten Strahlen ausgehen, und zwar so, daß für jeden Punkt l nach allen Seiten ausgehende Strahlenmenge einerley ist, weil wenigstens für einerley Element alle dazu gehörige Punkte als gleich l glänzend angenommen werden; gesetzt, daß auch verschiedene Elemente der ganzen leuchtenden Fläche nicht einerley Glanz hätten.

Diese von jedem Punkt ausgehende Strahlenmenge doppelt so h , so ist das Element doppelt so stark glänzend, und überhaupt verhält sich der Glanz des Elements wie die von jedem Punkt des Elements ausgehende Strahlenmenge. Ob nun gleich wegen der

Größe der Ausflußwinkel, das Element nur halb so viel Licht in dem Raum einer Halbkugel verbreiten kann, als geschehen würde, wenn das Element vollkommen durchsichtig wäre, und jeder Punkt sein Licht h allen Seiten frey und gleichförmig verbreiten könnte; so ist doch m doppelten Glanz diese durch den Raum einer Halbkugel verbreit-

Lichtmenge, der Schiefe der Ausflußwinkel ungeachtet, doppelt groß, und beym n fachen Glanz n mal so groß, als beym einfachen m . Sind zwey gleich große Elemente ungleich stark glänzend; verhält sich der Glanz des ersten zum Glanz des zweyten, wie n , so ist der Glanz des ersten $= \frac{m}{n}$, wenn der Glanz des letzten

angenommen wird. Setzt man alsdenn $\frac{m}{n} = S$, so ist S eine k , keine Linie oder Fläche. Es ist nemlich S der Exponent des Verhältnüßes der Strahlenmenge, welche das erste Element in dem Raum einer Halbkugel ausbreiten würde, zur Strahlenmenge, welche das zweyte Element in einen gleichen Raum ausbreitet. Wenn gleich die Strahlenmenge, welche ein solches Element durch den Raum einer Halbkugel ausbreitet, hier als unendlich klein in der Rechnung vorkommt; so kann doch das Verhältnüß der Strahlenmengen, bey zwey gleich große Elemente auf diese Art ausbreiten, jedes h seyn, und dasselbe ist mit dem Verhältnüß des Glanzes bey-

der Elemente einerley. Diefemnach behält der Buchftab S in den Formeln, woraus die Rechnung geführt werden muß, wenn das Licht von einer leuchtenden Fläche ausgehet, eine völlig übereinstimmige Bedeutung mit derjenigen, die er oben im 10 S. hatte, woselbst das Licht nur betrachtet war, in wofern es von einem leuchtenden Punkt ausgehet.

49. S.

Es fey nun (4. Fig.) AB eine leuchtende Fläche, die Licht auf die Fläche RS wirft, ferner fey Mm ein Element der erleuchteten Fläche RS , dessen Stelle in der Fläche als bekannt angenommen wird. Zuerst kann man fragen:

Wie groß die Erleuchtung fey, welche jedes Element wie Mm von der leuchtenden Fläche AB empfängt?

Hiernächst aber auch:

Wie groß die gefammte Menge Licht fey, welche die leuchtende Fläche AB der Fläche RS zufchickt?

Um die erste Aufgabe aufzulösen, betrachte man ein Element Ll der leuchtenden Fläche AB , und feze die Erleuchtung, welche Mm von Ll empfängt, $= DI$, den Ausfluszwinkel $lLM = \gamma$, den Einfallswinkel $LMm = d$, fo ist $dI = S. \frac{Ll \sin \gamma \sin d}{ML^2}$ M
 dem Halbmesser $MD = r$ fey eine Kugelfläche um M befchrieben, und DFE fey das Stück von ihr, welches zwischen den Grängen der Strahlen Pyramide AMB enthalten ist, welche die Fläche AB auf M wirft, Nn aber das Stück eben der Kugelfläche, was zwischen den Grängen der Strahlenpyramide enthalten ist, die aus L auf

gehörige Parallelkreise vorstellen, deren Entfernung von einander unendlich klein ist; so liegt zwischen beyden eine Zone $Mm n N$ der Kugelfläche, und von allen Punkten dieser Zone fällt das Licht auf Ll unter einerley Einfallswinkel CLM , so wie überall der Ausflußwinkel $= 90^\circ$ ist. Der Flächen-Innhalt des Segments MAN ist $= 2\pi r^2 \sin \alpha$. \times , wenn $ALM = \alpha$ gesetzt wird, also die Fläche der Zone $MNnm = 2\pi r^2 d\alpha \sin \alpha$; und weil der Einfallswinkel $CLM = 90^\circ - \alpha$ ist, so hat man die Erleuchtung, welche die Zone $MNnm$ nach $B1$ schickt, $= 2\pi S d\alpha \sin \alpha \cos \alpha$. (36. S.) das Integral hiervon so genommen, daß es mit α zugleich verschwindet, ist $= \pi S \sin \alpha^2$, und dasselbe drückt die Erleuchtung aus, welche das Segment MAN nach Ll schickt: wird $ALM = \alpha = 90^\circ$ angenommen, so findet man für die völlige Halbkugel die Erleuchtung $= \pi S$.

Weil die Fläche des Kreises $MN = \pi r^2 \sin \alpha^2$ ist, und die Erleuchtung, welche das Segment MAN nach Ll schickt, $= \pi S \sin \alpha^2$, so ist selbige der Grundfläche dieses Segments proportional nicht der Kugelfläche des Segments.

Könnten die Strahlen allen senkrecht auf Ll fallen, so wäre die Erleuchtung, welche jede Zone $Mm n N$ dahin schickte, $= 2\pi S d\alpha \sin \alpha$, und die gesammte vom Segment MAN dahin fallende Erleuchtung wäre $= 2\pi S \sin \alpha$, mithin wäre sie der Kugelfläche des Segments proportional. Sie ist aber wegen der Schiefe der Einfallswinkel $= \pi S \sin \alpha^2$; und weil man $\sin \alpha^2 = 1 - \cos \alpha^2 = 1 - (1 - \sin \alpha)^2 = 2 \sin \alpha - \sin \alpha^2$ erhält, so ist eben diese Erleuchtung, welche Ll von dem Segment MAN empfängt, $= 2\pi S \sin \alpha - \pi S \sin \alpha^2$. Der positive Theil wäre die Erleuchtung, wenn die Schiefe der Einfallswinkel die Erleuchtung nicht schwächte, und eben die von dieser Ursache herrührende Verminderung ist $= \pi S \sin \alpha^2$. Dieser negative Theil verschwindet in Vergleichung des positiven, wenn α unendlich klein angenommen wird: so lange demnach

Q

nach

ben, und ich begnüge mich nur einige allgemeine hieher gehörige Anmerkungen beizufügen.

56. §.

Ein leuchtender Körper, der sein Licht auf ein solches Element, wie Mm , wirft, mag eine Gestalt haben, welche er wolle, so kann man doch allemal M als die Spitze eines Pyramiden, oder kegelförmigen Körpers betrachten, dessen Seitenflächen, oder in M zusammen laufende Seitenlinien den leuchtenden Körper um und an berühren: in dem innern Raum dieses nach M zugespitzten Körpers wird alles Licht enthalten seyn, was der leuchtende Körper nach M schickt; so wie zwischen den ihn umgebenden in M zusammen laufenden Grenzen das Stück der Oberfläche des leuchtenden Körpers enthalten ist, welches allein, mit Ausschließung des übrigen von M abgewandten Theils, Licht nach M schicken kann. Statt dieser da Element Mm erleuchtenden Fläche läßt sich allemal eine andere zwischen den Grenzen desselben zugespitzten Raums enthaltene Fläche annehmen, die bey einerley Glanz mit $A B$ das Element Mm eben so erleuchten wurde: (41. S.) und da würde man wohl am natürlichsten eine solche Fläche zu wählen suchen, worauf sich die Rechnung am leichtesten anwenden ließ, wenn nicht die Gleichung $dI = S \frac{dA}{r^2}$ schon von selbst darauf leitete, eine Kugelfläche DFE das zu nehmen, deren Mittelpunkt in M liegt, und deren Halbmesser MI ist. Wenn nun gleich nicht alle Elemente der Fläche ASB einen gleich glanz hätten; so wird doch zwischen den Grenzen der von jedem Element LI auf Mm fallenden Strahlenpyramide ein Element Nn der Kugelfläche DFE enthalten seyn, welches Mm eben so stark, als LI erleuchtet, wenn man voraussetzt, daß Nn und LI einerley Glanz haben. (39. S.) Mithin wird auch die gesammte Erleuchtung, welche Mm von AGB fängt, eben so groß seyn, als diejenige, welche Mm von DFE empfangen würde.

Die

Strahlen gegen das Element bestimmt, wenn die Lage der Aze des auffallenden Strahlenkegels gegen das Element bestimmt ist.

Steht diese Aze auf dem erleuchteten Element senkrecht, so hat man den Vortheil, daß alle Strahlen, welche von Punkten des Segments kommen, die im einerley zu Aze MF gehörigen Parallelkreise liegen, unter einerley Winkel Mm fallen. Uebrigens kann man sich das Segment durch dergleichen Parallelkreise, deren Abstand von einander unendlich klein ist, in Zonen eingetheilt vorstellen, so fallen alle Strahlen, die von einerley Zone ausgehen, unter einerley Winkel auf Mm , und man wendet die Fundamentalgleichung $dI = S d\mu \sin \alpha$ leicht an, weil durch $d\mu$ die Fläche einer solchen unendlich kleinen Zone verstanden werden kann, da dann S den Abstand dieser Zone von ihrem nächsten Pol zu 90° ergänzt. Im 45. S. ist dieser besondere Fall schon vorgekommen, und $I = \pi S \sin \alpha^2$ gefunden worden, wenn α den scheinbaren Halbmesser des Segments aus M gesehen bezeichnet, und S für alle Elemente der leuchtenden Fläche einerley ist. Man kan dieß die senkrechte Erleuchtung kreisförmig scheinender leuchtender Flächen nennen.

Wird die Lage der unendlich kleinen Ebene Mm gegen die Aze des auffallenden Strahlenkegels schief angenommen, welches der Fall der schiefen Erleuchtung kreisförmig scheinender leuchtender Flächen ist; so ist nicht für jede zwischen zweyen zu dieser Aze gehörigen Parallelkreisen liegende unendlich kleine Zone der Einfallswinkel durchgängig einerley: alsdenn muß die von jeder einzelnen Zone herrührende Erleuchtung, zuvörderst besonders gesucht werden, indem man sich diese Zone abermal in unendlich kleine Elemente eingetheilt vorstellt, da dann für jedes einzelne Element die Erleuchtung vermittelst der Gleichung $dI = S d\mu \sin \alpha$ gefunden wird. Die Summe dieser Erleuchtungen giebt die von der Zone herrührende Erleuchtung

tung, und wenn man hiernächst aufs neue die Erleuchtungen aller Zonen summirt, so giebt sich die ganze gesuchte Erleuchtung.

52. §.

Meine Absicht ist jetzt nicht, die Fälle genauer zu erörtern, wenn die auffallende Strahlenkegel kein grader Kegel, oder auch der Umfang der leuchtenden Fläche, die ihre Strahlen nach M wirft, nicht kreisförmig ist. nur habe noch folgende allgemeine Maxime beizufügen, welche mich auf einige hieher gehörige vielleicht nicht überflüssige Anmerkungen leiten wird. Allemal kann man sich eine gerade Linie, wie MG durch die Mitte, oder sonst einen bekannten Punct innerhalb der leuchtenden Fläche vorstellen, und sie als die Axe der auffallenden Strahlenpyramide betrachten. Eine Ebene durch diese Axe gelegt schneidet die Pyramiden- oder Kegelfläche, und giebt an M einen Winkel, der als der scheinbare Durchmesser der leuchtenden Fläche in der schneidenden Ebene genommen anzusehen wäre, wenn das Auge in M stünde, und dasjenige Stück einer mit dem Halbmesser $= 1$ aus dem Mittelpunct M beschriebenen Kugelfläche, was innerhalb des Pyramiden- oder kegelförmigen Raums liegt, den die von den äußern scheinbaren Gränzen der leuchtenden Fläche auf M fallenden Strahlen umschließen, ist das Maasß der scheinbaren Größe, oder Ausdehnung des leuchtenden Körpers aus M gesehen. Eben diese Kugelfläche, welche das Maasß der scheinbaren Größe der leuchtenden Fläche abgiebt, betrachtet man in allen Fällen statt der leuchtenden Fläche selbst: man nimmt ihre Elemente so stark glänzend an, als die Elemente der leuchtenden Fläche selbst, deren scheinbare Größe jene Elemente der Kugelfläche vorstellen. Auf letztere wendet man die Formel $dI = S \sin \theta \sin \theta$ an, und alsdenn hängt alles übrige von einer geschickten Integration dieser Formel ab.

53. §.

Gewöhnlich ist nun dieß Maaß der scheinbaren Größe des leuchtenden Körpers keine völlige Halbkugel: indessen kann man sich drey Fälle vorstellen, in welchen es eine völlige Halbkugel werden müßte. Der erste ist der, wenn die leuchtende Fläche die unendlich kleine Ebene Mm wirklich von allen Seiten umgiebt, so wie das scheinbare Himmelsgewölbe nach allen Seiten über dem Horizont ausgebreitet ist; der zweyte Fall wäre der, wenn die leuchtende Fläche eben mit Mm parallel, und nach allen Seiten unendlich weit ausgebreitet, die Ebene Mm aber nur um einen endlichen Abstand davon entfernt wäre: der dritte Fall aber, wenn die erleuchtete Ebene Mm von der leuchtenden Fläche um einen unendlich kleinen Abstand entfernt wäre, und sie unmittelbar berührte. In allen dreyen Fällen empfing Mm die möglichst größte Erleuchtung, die ihr einerley leuchtende Fläche bey einerley Glanz mittheilen kann: und diese nennt Dr. Lambert die absolute Erleuchtung. Ohne schon das Gesetz zu kennen, nach welchen die Erleuchtung von der scheinbaren Größe der leuchtenden Fläche abhängt, ist so viel aus dem bishdrigen klar, daß selbige mit der scheinbaren Größe wachsen müsse, und so wird es keinen Zweifel leiden, daß nicht in den beyden zuerst erwähnten Fällen die Erleuchtung bey einerley Glanz der leuchtenden Fläche die möglichst größte sey. Was aber insbesondere den dritten Fall betrifft, so könnte es zweifelhaft scheinen, weil eine unendlich kleine Ebene, wenn sie die leuchtende Fläche berührt, nur von demjenigen Element, welches sie berührte, Strahlen auffangen würde, von den übrigen aber gar keine, und so schien es, als wenn die Erleuchtung nur unendlich klein seyn könnte. Allein dieß würde nur seine Richtigkeit haben, wenn das erleuchtete Element in endlicher Entfernung die Strahlen von einem einzigen leuchtenden Elemente anfieng. Eigentlich ist die Erleuchtung, welche Ll nach Mm schickt,
$$= \frac{S. Ll \sin y. \sin z}{ML^2}$$
 und

bey

bei der unmittelbaren Berechnung wären φ und $\alpha = 90^\circ$, weil bei den Elementen, wenn sie einander berühren sollen, parallel seyn müssen. Zugleich würde ML unendlich klein, und weil auch Ll eine unendlich

kleine Fläche ist, so würde $\frac{S \cdot Ll}{ML^2}$ eine endliche Größe seyn. Bei

diesen Schlüssen muß man übrigens noch voraussetzen, daß alle Elemente der leuchtenden Fläche einerley Glanz haben, weil sonst nicht für jedes Element Ll , wenn man auch alle gleich groß annähme, diese absolute Erleuchtung einerley wäre.

54. §.

Die Erleuchtung, welche eine unendlich kleine Ebene empfängt, wenn die leuchtende Fläche in allen Elementen einerley Glanz hat, und ihre scheinbare Größe eine völlige Halbkugel ist, ward im 45. §. $= \pi S$ gefunden: demnach giebt dieser Ausdruck allemal die absolute Erleuchtung, mithin auch diejenige, welche das erleuchtete Element empfangen würde, wenn es den leuchtenden Körper unmittelbar berührte. Mit dieser absoluten Erleuchtung läßt sich jede andere von demselben leuchtenden Körper herrührende Erleuchtung vergleichen, die derselbe der erleuchteten unendlich kleinen Ebene in jeder angenommenen Lage und Entfernung zuschicken würde. Wird die Rechnung auf eine leuchtende Fläche angewandt, deren Glanz man $= 1$ gesetzt hat, so ist ihre absolute Erleuchtung $= \pi$, und mit dieser absoluten Erleuchtung einer Fläche, deren Glanz $= 1$ ist, läßt sich auch jede andere Erleuchtung vergleichen, die von einer Fläche kommt, deren Glanz $= S$ ist. Die allgemeine Formel für die Erleuchtung war $I = f \cdot S \sin \varphi \sin \alpha$; (49. §.) wenn also die absolute Erleuchtung einer Fläche, deren Glanz $= 1$ angenommen ist, $= y$ gesetzt wird, so ist $y : I = \pi : f \cdot S \sin \varphi \sin \alpha$; und wenn man auch $y = 1$ annehmen will, so hat man $I = \frac{1}{\pi} f \cdot S \sin \varphi \sin \alpha$.

55. §.

Man hat es häufig als eine Hauptschwierigkeit angesehen, weßwegen keine vollständige Theorie von Ausmessung der Stärke des Lichts zu hoffen sey, daß es hier an einem Maas fehle, womit sich die Stärke des Lichts ausmessen lasse; allein Hr. Bouguer erinnert gleich anfangs in seinem *Traité d'Optique sur la gradation de la Lumiere*, ganz richtig, daß es mit dieser anscheinenden Schwierigkeit nicht mehr zu sagen habe, als bey allen anderen Ausmessungen, selbst in der Geometrie, wo allemal das Maas als gegeben betrachtet wird, und die Größe einer Linie, einer Fläche, eines körperlichen Raums, nur dadurch bestimmt werden kann, daß man das Verhältniß einer solchen Größe gegen das als bekannt angenommene Maas zu bestimmen sucht. Wir sind eben so wenig im Stande zu sagen, wie groß eigentlich eine Ruthe, ein Fuß sey? als wir im Stande sind schlechthin zu sagen, wie groß diese oder jene Erleuchtung sey, ohne sie mit einer andern zu vergleichen, die wir als bekannt annehmen, so wie die Länge einer Ruthe, eines Fußes als bekannt angenommen wird. Jede mathematische Wissenschaft sucht nur die Gesetze auf, nach welchen sich Größen unter einander vergleichen lassen; und wie es allemal willkürlich ist, welche Größe man $= 1$ setzen, oder als das Maas annehmen will, um alle übrige von eben der Art damit zu vergleichen, so ist es auch in der Photometrie willkürlich, welche Erleuchtung, und welche Strahlenmenge man $= 1$ annehmen will. Soll die absolute Erleuchtung einer leuchtenden Fläche, deren Glanz als bekannt anzusehen ist, und eben deßwegen $= 1$ gesetzt werden kann, für das Maas oder diejenige Einheit angenommen werden, womit man alle übrige Erleuchtungen vergleichen will, so ist die absolute Erleuchtung jeder andern leuchtenden Fläche $= S$, wie denn auch für sich schon klar ist, daß die absolute Erleuchtung zweyer Flächen von verschiedenen Glanz eben diesem Glanz derselben pro-

por

portional seyn muß. Bey eben der Voraussetzung wäre nun auch diejenige Strahlenmenge $= 1$, die eine Fläche, deren Quadrat-Inhalt $= 1^2$ gesetzt ist, auffangen würde, wenn ihre Erleuchtung in allen Elementen eben so groß wäre, als die absolute Erleuchtung derjenigen Fläche, deren Glanz $= 1$ gesetzt ist.

56. §.


Will man aber mit *H. Lambert* für die absolute Erleuchtung den Ausdruck $\pi \cdot S$ behalten, damit die absolute Erleuchtung einer Fläche, deren Glanz $= 1$ gesetzt ist, $= \pi$ bleibe, so läßt sich am bequemsten auf folgende Art diejenige Erleuchtung, welche eine unendlich kleine Ebene von einer leuchtenden Kugel, oder jeder andern kreisförmig scheinenden leuchtenden Fläche empfängt, ist im 51. §. der Ausdruck $I = \pi S \sin \alpha^2$ gefunden worden, wenn α den scheinbaren Halbmesser der Kugel aus dem erleuchteten Element gesehen, bezeichnet. Wenn also der Glanz dieser Kugel $= 1$ ist, so hat man $I = \pi \sin \alpha^2$, und es wird auch $I = 1$, wenn $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ ist. Es ist

aber $\frac{1}{\sqrt{\pi}} = 0,31830988618379$, also $\frac{1}{\sqrt{\pi}} = 0,5641895$, und zu diesem Sinus gehört ein Winkel von $34^\circ 20\frac{3}{4}'$. Diesemnach wäre diejenige Erleuchtung $= 1$, welche eine leuchtende Kugel einer unendlich kleinen Ebene senkrecht zuschickt, wenn der Kugel scheinbare Durchmesser aus der Ebene gesehen $34^\circ 20\frac{3}{4}'$ beträgt. Ist a die Entfernung des erleuchteten Elements von der Kugel Mittelpunkt, und der letztern Halbmesser $= 1$, so ist $\sin \alpha = \frac{1}{a}$, und die Erleuchtung $= 1$, wenn $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{\pi}$ ist: d. 2'. wenn das erleuchtete Element vom Mittelpunkt der Kugel so weit entfernt ist, daß das Quadrat dieser Entfernung zum Quadrat des Halbmessers der leuchtenden Kugel sich verhält, wie

wie die Pheripherie eines Kreises zum Durchmesser, oder wie Fläche eines Kreises zum Quadrat des Halbmessers. Fiele also auf alle Elemente einer Fläche, deren Quadrat-Innhalt $= 1^2$ gesetzt ist, eine eben so große Erleuchtung, so wäre die auffallende Strahlenmenge $= 1$.

57. §.

Die vom 33. S. bis hieher von mir vorgetragene Theorie der Erleuchtung, wenn das Licht von einer leuchtenden Fläche ausgeht, ist zwar in der Sache selbst mit der Lambertischen Theorie einerley: indessen hoffe ich doch, daß es der Mühe nicht unwerth gewesen sey, diese an sich schöne Theorie auf so einfache Gründe zurück zu führen, als ich hier versucht habe. So lange man noch nicht Ursache findet, in den optischen Wissenschaften von der ganz einfachen Hypothese abzugehen, daß sich das Licht von jedem leuchtenden Punkt nach allen Seiten in graden Linien ausbreite; so lange wird man auch alles, was ich oben in den ersten 10. SS. daraus geschlossen habe, gelten lassen müssen, zumal da es sich durch Versuche, die auf mehr als eine Art angestellt werden können, bestätigen läßt, wie im 12. S. kurz ist bemerkt worden. Hat es aber damit seine gute Richtigkeit, so folgen auch die übrigen im 33. und f. SS. vorgetragenen Gründe der Photometrie so leicht und natürlich, daß ich nicht sehe, wie dagegen etwas mit Grunde eingewandt werden kann, es möchte dann der einzige im 24. S. vorkommende Satz noch zweifelhaft scheinen, der soviel ich bisher habe finden können, dem Hrn. Lambert eigen ist. Hr. Lambert hat indessen die Richtigkeit desselben ebenfalls zur Genüge bestätigt, und meine Absicht erfordert es jetzt nicht nothwendig, daß ich mich auf eine nähere Erörterung dieses Cases einlasse, weil ich nur einen Versuch machen wollte, wie sich die Gründe der Photometrie aus den einfachsten, und sonst in der Optik ganz bekannten Voraussetzungen herleiten lassen.



to
ch
e
et

e
h
h
h
h
e
a
t
e
e
e

.....

Kurze
B e t r a c h t u n g e n
über einige Ursachen des allgemein werdenden
Holzmangels in Deutschland,
und
über die Mittel demselben abzuhelpen.
Von
Karl August Scheidt.



portional seyn muß. Bey eben der Voraussetzung wäre nun auch diejenige Strahlenmenge $= 1$, die eine Fläche, deren Quadrat-Inhalt $= 1^2$ gesetzt ist, auffangen würde, wenn ihre Erleuchtung in allen Elementen eben so groß wäre, als die absolute Erleuchtung derjenigen Fläche, deren Glanz $= 1$ gesetzt ist.

56. §.

Will man aber mit J. Lambert für die absolute Erleuchtung den Ausdruck $\pi \cdot S$ behalten, damit die absolute Erleuchtung einer Fläche, deren Glanz $= 1$ gesetzt ist, $= \pi$ bleibe, so läßt sich am bequemsten auf folgende Art diejenige Erleuchtung, welche eine unendlich kleine Ebene von einer leuchtenden Kugel, oder jeder andern kreisförmig scheinenden leuchtenden Fläche empfängt, ist im 51. S. der Ausdruck $I = \pi S \sin \alpha^2$ gefunden worden, wenn α den scheinbaren Halbmesser der Kugel aus dem erleuchteten Element gesehen, bezeichnet. Wenn also der Glanz dieser Kugel $= 1$ ist, so hat man $I = \pi \sin \alpha^2$, und es wird auch $I = 1$, wenn $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ ist. Es ist

aber $\frac{1}{\sqrt{\pi}} = 0,31830988618379$, also $\frac{1}{\sqrt{\pi}} = 0,5641895$, und zu diesem Sinus gehört ein Winkel von $34^\circ 20\frac{1}{4}'$. Diesemnach wäre diejenige Erleuchtung $= 1$, welche eine leuchtende Kugel einer unendlich kleinen Ebene senkrecht zuschickt, wenn der Kugel scheinbare Durchmesser aus der Ebene gesehen $34^\circ 20\frac{1}{4}'$ beträgt. Ist a die Entfernung des erleuchteten Elements von der Kugel Mittelpunkt, und der letztern Halbmesser $= 1$, so ist $\sin \alpha = \frac{1}{a}$, und die Erleuchtung $= 1$, wenn $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{\pi}$ ist: d. 2. wenn das erleuchtete Element vom Mittelpunkt der Kugel so weit entfernt ist, daß das Quadrat dieser Entfernung zum Quadrat des Halbmessers der leuchtenden Kugel sich verhält, wie

Derjenigen Gegenden, wo noch einiger Vorrath von Holz anzutreffen, sind wenig, und sie haben insgemein solche Lagen, welche entweder keine Gelegenheit zum Flößen haben, oder wo wegen zu großer Entfernung, und unwegsamen Gebürge und Thäler die Fortschaffung des Holzes zu kostbar ist; es ist daher höchst nöthig, auf Mittel zu denken, dem Holzmangel abzuhelpen, deren bey fleißigen Nachdenken sich eben so viel finden werden, als Ursachen vorhanden sind, aus welchen er entstanden und täglich noch entsteht. Wenn aber Mittel wider denselben angegeben werden sollen, so sind dessen Ursachen aufzusuchen und Mittel gegen Ursachen zu setzen, alsdenn wird dem Holzmangel abgeholfen, wenn ordentlich damit zu Werke gegangen wird, und es nicht blos bey dem gesagten bleibt.

Es fehlet nicht an Schriften von dieser Materie, viele davon unter unterrichten uns gründlich, wie wir Holz zuwege bringen sollen. Sie rathen an, neue Wälder anzulegen, und geben die besten Regeln dazu; allein dieses gehet nicht überall an: wie kann man Wälder und Gehölze anlegen, wo das Land zu Feldfrüchten vor die Menschen so nöthig ist, wo noch dazu auf die Bevölkerung des Landes gedacht wird, wozu man Platz haben muß, oder wo wegen schlechten Grund und Bodens kein Holz wachsen kann.

Soll man die Gewerbe so Holz verbrauchen, eingehen lassen? das hiesse das Kind mit dem Bade ausschütten, und was sollten die Menschen thun, die sich mit solchen Gewerben nähren müssen?

Es müssen andere Mittel aufgesucht und wieder die Ursachen des Holzmangels angewendet werden, ohne weder den Fruchtbau vor die Menschen, noch die Bevölkerung und Gewerbe bey Seite zu setzen. Ich will einige derer bekanntesten Ursachen des eingerissenen Holzmangels anführen und betrachten, die Mittel demsel-

demselben abzuhelpen bey jeder Ursache beybringen, und zeigen, wie der Frucht - Bau, Bevölkerung der Länder und der Gewerbe, so Holz zu allerley Gebrauche nöthig haben, beybehalten werden können.

Ursachen des einreissenden Holzmangels.

I.

Der allzuvielle Verbrauch des Holzes überhaupt.

Der allzuvielle tägliche Verbrauch des Holzes bey so vielen Geschäften der Menschen, ist die Haupt- und erste Ursache, warum der Holzmangel sich eingestellt hat, und warum er in zukünftigen noch viel größer werden muß. Man macht hiebey insgemein gar keinen Ueberschlag, ob der jährliche Zuwachs an Holze in einem Lande, dem Verbrauche in selbigen angemessen sey, oder nicht, oder ob so viel zumachsen könne, als der Verbrauch der Unterthanen haben will.

Das beste Mittel hierwieder ist denselben, so viel möglich seyn, und sich nur immer thun lassen will, durch gute Erspahrungs-Anstalten einzuschränken, und statt, sonderlich des Brennholzes, bey vielen Feuerungen etwas anders zu gebrauchen, wovon in folgenden Artickeln mehr vorkommen wird.

II.

Die Bevölkerung.

Deutschland ist in gegenwärtigen Zeiten stärker angebauet, als vormahls: wie viel neue Städte und Dörfer mögen wohl seit Taciti Zeiten in diesem Lande aufgebauet worden seyn, wo sonst

Wälder gestanden, deren Spuhren noch in der Erde hie und da in Menge, als, ganze Bäume, Aeste, Laub, Stöcke, Wurzeln, Holz = Erde, so jetzt braune oder Holz Steinkohlen genennet werden, liegen. Ich kenne ein ganzes Dorf in hiesiger Gegend das auf einem dergleichen unterirdischen Reste von einem Walde gebauet ist, der unter meiner Aufsicht untersucht worden.

Die großen Kriegsheere der Deutschen, und das allemal noch viele Stadt- und Landvolk, wie auch die sich nach und nach vergrößernden Städte und Dörfer beweisen diese Bevölkerung und stärkern Anbau des Landes.

Wie das Volk zugenommen, so hat es sich auch, sonderlich nach der Römer Zeiten mit denen es immer in Krieg verwickelt war, Bequemlichkeit zur Wohnung verschaffen; dieses geschah oft durch Ausrottung ganzer Wälder und Gebüsch, von deren Holze, Hölzern, Häuser, Ställe gebauet wurden, das übrige ward verbrannt oder sonst verächtlich liegen gelassen, dergleichen sich da zuzutragen pfleget, wo Kolonisten eingeföhret werden; Colonia Rauracorum, Colonia Agrippina, Colonia Allobrogum, u. sind die deutlichsten Beispiele der alten Zeiten, Bevölkerung und Anbau eines Landes mit Städten und Dörfern ist denen Wäldern und Holz Anwachse allemal gefährlich; denn je mehr Volk, je mehr Platz ist nöthig, je mehr Holz wird verbauet und verbrannt.


Es ist also die Bevölkerung und der Anbau eines Landes mit Städten und Dörfern eine derer größesten und gewissten Ursachen, daß in selbigen Holzmangel einreissen muß.

Beides Bevölkerung und Holzianbau kann in einem Lande nur nach einer gewissen Verhältniß gegen einander statt haben; dem wollte man die Bevölkerung zu hoch treiben, so müßte endlich Mangel

an Holze entstehen, und wollte man viel Platz zum Anbau neuer Wälder einnehmen, so würde dieses der Bevölkerung des Landes und dem nöthigen Feldbaue nachtheilig seyn: Die Bevölkerung aber ist für einen Staat unstreitig wichtiger, als der Holzanbau; ich darf also das Mittel wider die Bevölkerung, als eine Ursache des sich daher ergebenden Holzmangels angeben, sondern ich muß suchen da, wo das Holz nicht hinlänglich ist, etwas anders bezubringen, was dieselbe Stelle bey verschiedenen Bedürfnissen vertreten kann, oder dieselbe aus andern Ländern herbeyschaffen. Wie aber, wenn der Holzmangel allgemein wird, und andere Länder nichts mehr abgeben können, noch wollen? Alsdenn wird man Dr. Bachovs Land zu Inquiranten zu Rathe ziehen, statt der hölzernen Schiffe blecherne brauchen und Häuser von Stein, Leim und Erde bauen müssen; Kaff, Steinkohlen, Heyde, Rohr, Stroh, Bimsen, Dornen &c. können immer von Brennholze leeren Gegenden viel Hülfe schaffen; beschneidet man die Wege, Strassen, Reine und tief gelegenen Derter, so kein Getreide noch gutes Gras wachsen kann, mit Ellern und Buchen von allerley Art, so wird man zu brennen genug haben. Das wenige Stamm- und Waldholz, so noch hie und da vorhanden ist, muß vor Wagner, Böttger, Schreiner, Drechsler und andere dergleichen Handwerksleute aufgehoben und gespahret werden.

Man macht an vielen Orten eine Art von Backsteinen oder Rauerziegeln aus Leim, Sand und Schäben von Flachs, die an der Luft getrocknet werden, sie thun sonderlich auf dem Lande, wo keine Steinbrüche und Ziegelhütten in der Nähe sind, zu Häusern, Schülthen, Ställen &c. gute und große Dienste, dauern lange, und sind feuerfeste, womit ich selbst nützliche Versuche gemacht.





Deutschland hatte in uralten Zeiten keinen Mangel an Holze, überall waren dicke Wälder. Der große hercynische Wald erstreckte sich durch viele deutsche Landschaften, und nahm einen großen Theil davon ein, dessen Ueberbleibsel wir noch am Harz, und Thüringer Walde sehen. Die alten deutschen Völker wohnten in Wäldern und nähreten sich von der Jagd und Viehzucht; sie waren mit Wald und Holze umgeben.

Würden diese Völker sich nicht wundern, wenn sie ihr sonst so holzreiches Vaterland jetzt sehen sollten? eine Fläche Land von vielen Meilen umher würde ihnen kaum hie oder da unter einen einzelnen Baume, oder etlichen Weiden, auf ihren Reisen den nöthigen Schatten bey warmen Tagen geben, da sie sonst von ganzen Wäldern gegen die Strahlen der Sonne gedeckt wurden.

Jetzt siehet es anders in Deutschland aus, in allen Gegenden des deutschen Reichs fängt man an über Holzmangel zu klagen, und die Theuerung des Holzes wird allgemein.

Wenn die Ursachen dieses einreißenden Holzmangels nicht aus dem Wege geräumt werden, so muß der Bergbau, dessen Schmelz- und Hütten Wesen, Salz, Bitriol, Alaun, Salpeter, Siedereyen, Glas-Ofen, Färbereyen, Ziegel, Kalk, Gyps, Brandtwein, Brennereyen, große Bräudereyen, Handwerke, so Holz verarbeiten, und dergleichen alles zum Theil aufhören und liegen bleiben, also der Nahrungsstand darunter leiden.

gejaget, da man beides mit Wind-Ofen noch erhalten könnte, wenn man mehrere Achtung vor sie hätte; der Zug der Luft ist gleicher, als der Wind der Gebläse, welcher bey dem Aufgehen des Balges absehet.

Daß es angehet, mit Wind-Ofen und Steinkohlen Erz zu schmelzen, zeigen die sogenannten Coupelows in Engelland, worinne alle Arten von Erzen zu gute gemacht werden, so ich schon mit angesehen.

Die Glashütten mit ihren Ofen gehören noch unter diesen Artikel, sie verwüsten durch ihr großes Feuer und die ihnen nöthige Asche und Potasche eine erstaunende Menge Holz; anstatt daß man in Holland und Engelland Glas bey Steinkohlen schmelzet.

Es ist bisher in verschiedenen Gegenden Deutschlands noch Glas gemacht worden, als zur Bedürfniß der Einwohner nöthig gewesen, so gar, daß es auch ausser Deutschland verführet werden müssen, welches ist besser? die Deutschen an Holze Mangel leiden lassen, oder einigen einzelnen Glashütten, Pächtern den Nutzen alleine zu gönnen.

Seitdem Deutschland mit gläsernen Gefäßen überschüttet worden, haben die irdernen und hölzernen ihren Abschied bekommen, kein Bauer will mehr aus einem irdenen Krüge, oder hölzernen Kanne trinken; diese aber halten doch länger, als die Gläser, und kosten weder Potasche noch so viel Holz zu brennen und zu machen.

Was wäre wohl natürlicher, als überflüssige Glashütten eingehen zu lassen, und mit dem dadurch erspahrten Holze nöthigere Bedürfnisse der Menschen zu versorgen; dieses wird ein wahres und zuverlässiges Mittel seyn, dem Holzmangel abzuheffen.

Es giebt durch Glas-Ofen verödete Wälder in Deutschland ~~ge~~
~~u~~, wo man genöthiget worden, die Hütten und Ofen fort zu
~~ren~~, oder sie schon eingehen zu lassen, da vielleicht durch andere
~~te~~ Anstalt das Holz, ohne die Waldung zu verwüsten, hätte
~~fer~~ genüget werden können.

Glashütten haben allensfalls nur in unwegsamen Gebürgen
~~in~~ Wäldern statt, wo weder ordentliche Straßen sind, noch Ka-
~~le~~ zum Führen gemacht werden können.

Vieleich könnten noch andere ähnliche Fabriken, wobey der
~~Verbrauch~~ ins Große gehet, eher, als das Holz entbehret und
~~der~~ andere Handlungs- und Nahrungsgeschäfte eingeführet wer-
~~en~~, welche entweder gar kein Holz, oder dessen doch sehr wenig
~~brauchen~~; was nützt es dem mittlern und gemeinen Manne, wenn
~~aus~~ Gläsern trinken und auf Porcelain essen kann, dabey aber
~~in~~ Ende im Winter frieren muß?

VI.

Ziegel- Kalk- und Gyps- Brennereyen.

Die Ziegel- Kalk und Gyps- Brennereyen verbrauchen viel
~~es~~, es kann sie aber die menschliche Bedürfnis nicht leicht ent-
~~ten~~, daher wird es bey diesen Gewerben auf geschickte Er-
~~ung~~ und Einrichtung der dazu nöthigen Ofen ankommen, die
~~nur~~ Holz zur Feuerung brauchen, und eben das leisten, was
~~schickte~~ mit viel Holze nicht thun können, wobey auf die rechte
~~gute~~ Regierung des Feuers währenden Brennens viel ankommt,
~~nicht~~ Holz dabey vergeblich verbrannt werde; auch ist hiezu eben
~~es~~ allezeit pures Holz nöthig, sondern es lassen sich auch aller-
~~Arten~~ Arten, Steinkohlen, Garrenkraut aus denen Wäldern

Wälder gestanden, deren Spuhren noch in der Erde hie und da in Menge, als, ganze Räume, Nester, Laub, Stöcke, Wurzeln, Holz-Erde, so jetzt braune oder Holz Steinkohlen genennet werden, liegen. Ich kenne ein ganzes Dorf in hiesiger Gegend, das auf einem dergleichen unterirdischen Neste von einem Wälder bauet ist, der unter meiner Aufsicht untersucht worden.

Die großen Kriegsheere der Deutschen, und das allemal noch viele Stadt- und Landvolk, wie auch die sich nach und nach vergrößernden Städte und Dörfer beweisen diese Bevölkerung und stärkern Anbau des Landes.

Wie das Volk zugenommen, so hat es sich auch, sonderlich nach der Römer Zeiten mit denen es immer in Krieg verwickelt war, Bequemlichkeit zur Wohnung verschaffen; dieses geschah oft durch Ausrottung ganzer Wälder und Gebüsch, von deren Holze, Hütten, Häuser, Ställe gebauet wurden, das übrige ward verbrannt, oder sonst verächtlich liegen gelassen, dergleichen sich da zuzutragen, pfleget, wo Kolonisten eingeführet worden; Colonia Rauracorum, Colonia Agrippina, Colonia Allobrogum, u. sind die deutlichsten Beispiele der alten Zeiten, Bevölkerung und Anbau eines Landes mit Städten und Dörfern ist denen Wäldern und Holz Anwachse allemal gefährlich; denn je mehr Volk, je mehr Platz ist nöthig, je mehr Holz wird verbauet und verbrannt.

Es ist also die Bevölkerung und der Anbau eines Landes mit Städten und Dörfern eine derer größesten und gewissten Ursachen, daß in selbigen Holzmangel einreissen muß.

Beides Bevölkerung und Holzianbau kann in einem Lande nur nach einer gewissen Verhältniß gegen einander statt haben; dem wollte man die Bevölkerung zu hoch treiben, so müßte endlich Man-

Die Schwierigkeiten, so sonderlich von denenjenigen Gemein-
den wieder diesen Anschlag gemacht zu werden pflegen, die nahe an
Wäldern wohnen, und mit dem Holzlesen berechtigt sind, welches
er vor die Forst- und Wald- Wirthschaft nicht viel taugt, sind
bekannt; ich sollte aber meynen, sie wären an vielen Orten durch
unpflückliche Vorstellungen eines in die Augen leuchtenden bessern
Verfahrens vor die Wald- und Forst- Berechtigten sowohl, als vor
den Leuten, und eben diese Gemeinden durch eine genugsame Ab-
gabe dergleichen Les- Holzes, so von gewissen dazu bestimmten ar-
beitenden Leuten unter Aufsicht eines Forst- Knechtes um einen geringen
Lohn zusammen getragen würde, zu besänftigen, wo vor sie weiter
gehen, als diese geringen Kosten zu bezahlen hätten, so sie mit an-
derer nützlicher Arbeit in ihrem Hauswesen, oder im Felde verdie-
nen könnten. Sollten dieses nicht Mittel seyn, einen sehr beträch-
tlichen unnöthigen Holzaufwand entgegen zu gehen? sollte es nicht
möglich seyn, eine so gewisse Menge unnöthiger Back- Oefen und
schädliche Holzlesen, wie es bisher in Wäldern üblich gewesen,
abzuschaffen.

VIII

Die alten großen Stuben- Oefen.

Die alten großen Stuben- Oefen, so noch in deutschen
Städten und Dörfern vorhanden sind, kosten viel Holz, und müs-
sen unter die Ursachen des einreißenden Holzmangels gerechnet
werden. Es ist zwar hie und da darauf gedacht worden, derglei-
che alte große Oefen abzuschaffen, und kleinere davor einzuführen/
weniger Holz kosten; allein seitdem diese in Gebrauch gekom-
men ist die Verwüstung des Holzes erst recht angegangen, denn
ist man angefangen in jede Schlaf- oder andere Kammer ein

Oefen zu setzen, da sich vorher die Hausgenossen zusammen Wintertszeit mit einem einzigen großen Ofen in der Wohnstube des Hauses beholfen. Man hat nicht bedacht, daß viel Oefen mehr Holz nöthig haben, als ein einziger, obgleich großer Ofen.

Die holzfressende Bequemlichkeit also, da bey einer mäßigigen Familie fast jede einzelne Person im Winter eine geheime Stube oder Kammer vor sich haben will, verwüstet wiederum das Holz, was durch Abschaffung der großen Oefen erspartet wird, und noch überdieß eine greuliche Menge dazu, die vorher nicht einmal nöthig war.

Hier könnte mir eingewendet werden, es wäre der menschlichen Gesundheit zuträglich, wenn nicht so viel Leute in einer einzigen Stube besammen, sondern in mehreren vertheilet wären, da die Ausdünstungen so vieler Leute verderbten die Luft in der Stube. Diesem Einwurfe kann ich nicht gänzlich widersprechen, so lange keine Mittel dagegen angewendet werden, es finden sich aber auch gar leicht: man sehe in die Stuben, wo viel Leute Wintertszeit besammen seyn sollen, kleinere Oefen, durch welche in ihren Eisen-, Kupferne, blecherne, oder gegossene eiserne wohl auf einander gestützte Röhren, von unten nach oben zu durch die Ofendecke ausgehen, so wird die am Fußboden der Stube allezeit dicke und kühle Luft in die erwärmten Röhren ziehen, und oben erwärmt und verdammt wieder heraus kommen, welches einen beständig sanften Umlauf der Stubenluft verschaffen wird; ein brennendes Licht, so man erst an die unterste, hernach an die oberste Oeffnung dieser Röhren hält, wird diese Wahrheit bestätigen.

Ferner heiße man dergleichen Stuben nicht zu stark, welches mit einem kleinen Ofen eher, als mit einem großen geschehen kann, und bringe oben an der Stuben-Decke, oder über denen Fenstern, Luft.

Lustbächer an, die auf und zugemacht werden können, so wird sich niemand vor schädlicher Stubenluft zu fürchten haben.

Ehe ich zu einem andern Artikel fortschreite, kann ich mich nicht entbehren, in Ansehung der vielen neuen künstlichen Stuben-Ofen etwas zu erwehnen: was helfen doch alle solche Künsteleyen, so mit diesen Ofen vorgenommen werden, wenn das Hauptwerk nicht besorget wird, worauf es ankommt, daß man eine warme Stube erhält, ohne viel Holz zu verbrennen. Die meisten Leute denken, sonderlich der gemeine Mann sein Ofen sey daran schuld, daß er keine warme Stube bekommen, er läßt sich einen künstlichen setzen, der hernach eben so wenig Dienste, wie der erste thut. Der Erfinder des neuen Ofens so wohl als er, wissen immer nicht, wo der Fehler steckt; ich will es ihnen kurz sagen: der Fehler liegt darinne, daß gemeiniglich eher an die Verbesserung der Ofen, als an die Verwahrung der Stuben gegen die zu stark eindringende Luft gedacht wird. Hierüber kann ich nichts nützlicheres sagen, als: verwahrt eure Thüren und Fenster der einzuheizenden Stuben vor der allzustark eindringenden Luft im Winter, und setzet einen Ofen, in welchem das Feuer gut brennet, ob er gleich nicht groß ist, so werdet ihr ohne vieles Holz und Mühe eine gute warme Stube haben, welches ebenfalls ein großes zur Ersparung des Holzes beytragen wird.

Wenn aber das Feuer in einem Ofen gut brennen, und derselbe die Stube recht erwärmen soll, so braucht es weiter nichts, als einer aus dem Ofen durch die Stubenwand in den Schorstein gehenden Röhre a. Fig. 1. 2. 3. welche von Zeit zu Zeit rein gehalten und gefeget werden muß; den Feuerbock aber setze man ungefähr 6. oder 8. Zoll von der Ofenlochs-Thür quer in den Ofen, wie bey b. Fig. 1. 2. 3. lege das Holz auf selbigen dergestalt, daß

es hinten im Ofen mit $\frac{2}{3}$ seiner Länge aufliege, stecke ein paar Spähne, oder eine Hand voll Kohlen unter den Feuerbock, wo das Holz hohl lieget, zünde sie an, mache das Ofenloch mit der vorhängenden eisernen Thür zu, und das kleine Quer-Thürgen, so in jener ganz unten an der Grundfläche des Ofenlochs angebracht seyn muß, auf, so wird der Zweck auch ohne einen von andern gerühmten Koft erhalten werden, nur ist zu merken, daß der innere Theil des Ofens so eingerichtet seyn muß, daß Rauch und Flamme auch weder hinten an der Stirne des Ofens über sich durch ein Loch in einen Auffaz nach der Rauchröhre ziehen kann, wie bey c. Figur 3. oder ein horizontaler Scheid d. Fig. 1. 2. in den Ofen gemacht werde, durch dessen Loch e. Rauch und Flamme über den Scheid in die Höhe nach der Rauchröhre a ziehen möge, wie die punktirten Linien anzeigen.

Daß das Feuer insgemein hinten im Ofen angebracht wird, ist ein Fehler, den man in denen herausgekommenen Schriften von dieser Materie noch nicht verbessert, sondern noch immer bey denen Ofen-Zeichnungen beybehalten hat; denn der Ofen wird dadurch nur hinten an der Stirne erwärmet, und gegen das Ofenloch zu wird er kaum laulich, ja das Feuer, weil es vom Zuge der Luft die durch das Ofenloch eindringet, zu weit entfernt ist, brennet nicht gut, und wärmet den Ofen nicht überall gleich, bringet man es aber dem Zuge der eindringenden Luft näher, so wird es stärker angeblasen, und würket besser in den ganzen Ofen; wenn die Rauchröhre rein gehalten wird, darf man gar nicht fürchten, daß Hitze und Feuer zum Ofenloche heraus schlagen werde, sondern der Luftzug treibet beides nebst dem Rauche durch den ganzen Ofen nach der Rauchröhre.

IX.

Die Wald-Dörfer und Wald-Häuser.

Die in denen Wäldern wohnenden Leute haben viele Schuld dem einreißenden Holzmangel: sie werfen ganze Scheiter und Löße auf einmal in ihre Riesen von Rachel-Ofen, und hören die ganze Jahr hindurch damit nicht auf; das Feuer muß darinne, und in dem größten Bräu-Ofen brennen, und die Leute braten in solcher Stubenwärme, auch wohl gar am Ofen bey lebendigen Leibe, welches ihrer Gesundheit höchst schädlich seyn muß.

Wider diese Verwüstung des Holzes ist kein besseres Mittel, als diese Leute anzuhalten, daß sie kleinere Ofen und Ofenbächer anstellen lassen, in welche sie weder so großes noch so vieles Holz auf einmal bringen können, und ihnen begreiflich zu machen, daß ihre Stuben, Fenster und Thüren verwahren müssen, wenn sie eine warme Stube haben wollen.

X.

Die Viehzucht und Viehmästung.

Man sollte nicht glauben, was vor eine greuliche Menge Holz, so wohl bey großen, als kleinen Wirthschaften wegen der armen Fütterung vor das Vieh, sonderlich im Herbst, Winter und Frühjahr vergeblich, und also die meiste Zeit im Jahre verbrannt wird, und was dieser Holzverbrauch in einem ganzen Lande jährlich betragen müsse; fast alles Futter wird mit heißen Wasser brüheth, auch wohl gar zum Theil gekocht, und das Vieh mit warmem Wasser, das wieder laulich werden muß, getränkt; die Wirthschaftsleute denken dabey, sie thäten ihrem Viehe damit noch

so viel zu gute, da doch die in dem Futter befindlichen kräftigen Salze durch das Kochen und Brühen theils verzauchen, was ab von selbigen ja noch im Futter hangen bleibt, und vom Viehe genossen wird, demselben durch das warme Sauffen aufgelöst wird, und derum mit dem häufigen Urin aus dem Leibe gehet, ehe es so, und ehe es dem Fleische seine erhaltende Kraft mitgetheilet.

Man frage nur einen verständigen Metzger, wie das Fleisch und Fette von kalt gefütterten und getränkten Viehe beschaffen, so wird er sagen: das Fleisch, Fette, Speck vom erstern sey viel fester und derber, als vom letztern, und halte sich auch länger in der Haushaltung. Wer giebt dem Wildpreth warmes Futter und Getränk? lebt es bey seiner kalten Kost und Trank nicht länger unter freyem Himmel, als unser in warmen Ställen durch warme Kost und Trank verzärteltes Vieh? ich habe die Erfahrung von dem, wo hier sage, mehr als einmal richtig befunden, und kann zuversichtlich allen Wirthschastern zurufen: gewöhnet euer Vieh von Jugend auf zu kalter Kost und Trank, und reisset die großen Wirthschast-Defen nieder, so werdet ihr munteres, gesundes und gedeyliches Vieh haben, und eine große Menge Holz ersparen, die ihr jetzt vergeblich verbrennet.

XI.

Die allzuhohen Zimmer und Stuben.

Wir Deutschen haben es denen Völkern nachgemacht, die entweder unter einer wärmern und gemäßigtern, oder einer sehr feuchten Himmelsgegend wohnen, wo hohe Zimmer und Kammern in solchen aber auch Kamine Statt finden; bey uns Deutschen ist es anders, unsere Himmelsgegend ist im Winter kälter, wir müssen warme Stuben haben, wenn wir nicht mißig gehen und erfrieren wollen.

Hok

Die Schwierigkeiten, so sonderlich von denenjenigen Gemein-
den wieder diesen Anschlag gemacht zu werden pflegen, die nahe an
Wäldern wohnen, und mit dem Holzfleſen berechtigt ſind, welches
aber vor die Forſt- und Wald- Wirthſchaft nicht viel taugt, ſind
mir bekannt; ich ſollte aber meynen, ſie wären an vielen Orten durch
ſimpliche Vorſtellungen eines in die Augen leuchtenden beſſern
Zuſtands vor die Wald- und Forſt- Berechtigten ſowohl, als vor
die zu haben, und eben dieſe Gemeinden durch eine genugsame Ab-
gabe dergleichen Fleſe- Holzes, ſo von gewiſſen dazu beſtimmten ar-
men Leuten unter Aufſicht eines Forſt- Knechtes um einen geringen
Lohn zuſammen getragen würde, zu beſänftigen, wo vor ſie weiter
nichts, als dieſe geringen Koſten zu bezahlen hätten, ſo ſie mit an-
derer nützlichen Arbeit in ihrem Hausweſen, oder im Felde verdie-
nen könnten. Sollten dieſes nicht Mittel ſeyn, einen ſehr beträcht-
lichen unnöthigen Holzaufwand entgegen zu gehen? ſollte es nicht
ſchädlich ſeyn, eine ſo gewiſſe Menge unnöthiger Back- Oefen und
das ſchädliche Holzfleſen, wie es bisher in Wäldern üblich geweſen,
abzuſchaffen.

VIII

Die alten großen Stuben- Oefen.

Die alten großen Stuben- Oefen, ſo noch in deutſchen
Städten und Dörfern vorhanden ſind, koſten viel Holz, und müſ-
ſen mit unter die Urſachen des einreißenden Holzmangels gerechnet
werden. Es iſt zwar hie und da darauf gedacht worden, derglei-
chen alte große Oefen abzuſchaffen, und kleinere davor einzuführen;
dieſe koſten weniger Holz; allein ſeitdem dieſe in Gebrauch gekom-
men, iſt die Verwüſtung des Holzes erſt recht angegangen, denn
da hat man angefangen in jede Schlaf- oder andere Kammer ein

stehen müssen? würde man diese Anstalt nicht als ein wahres Mittel dem einreißenden Holzmangel entgegen stellen können.

Ich habe selbst in meiner Wohnung den Versuch gemacht, bey einem auf dem Koch-Herde umschloßenen Feuer Kochen zu lassen, und gefunden, daß alles eher bey viel weniger Holze ins Kochen gekommen, als vorher bey viel mehrern Holze und offener Feuer.

Die Köche und Köchinnen, so bey offenen Feuer gewohnt sind, viel Holz anzulegen, werden bey umschloßenen gezwungen, dessen wenig zu gebrauchen, wenn ihnen nicht alle Töpfe und Gefäße, so sie auf dem Herde am Feuer stehen haben, überlaufen sollen, welches auch die Ursache ist, warum sie gern bey ihrem einmal gewohnten offenen Herdfeuer bleiben; man muß sie nur langsam anhalten, weniger Holz auf einmal anzulegen, bis sie der Sache gewohnt sind, und gelernt haben, wie viel auf einmal anzulegen ist.

Es ist nicht zu fürchten, daß die Speisen räuchrig schmecken, so in einem solchen Herde an umschloßenen Feuer stehen; denn aller Dampf und Rauch ziehet, weil das Feuer in einem solchen Herde gut brennet, in die Höhe durch die Löcher in der Decke des Herdes heraus.

Endlich ist man bey dergleichen umschloßenen Küchen-Herd-Feuer weniger Feuersgefahr, als sonst bey offenen zu terworfen, weil nicht so viel Funken umher und in den Schornsteinen fliegen, und sich daselbst anhängen können; inwendig in dem Herde setzt sich kein Ruß an, und wenn die Decke mit denen Kochlöchern von Eisen gegossen wird, hat man bey trocknen Holze, wovon man brennen keine Kohlen abspringen, nicht einmal nöthig die Kochgefäße mit Strizen zu bedecken.

Weil

Weil auch Kohlen und Asche in solchen Herden nicht frey liegen, so sind die Küchen am Fußboden reinlicher: damit aber der Bau eines solchen umschloßenen Herdes desto deutlicher werde, so hoffe ich denen Liebhabern der Holzerspahrung und häuslichen Wirthschaft keinen unnützen Dienst zu thun, wenn ich ihnen eine Anlage zu einem umschloßenen Küchen-Herde mittheile, und solche nebst einer Beschreibung und Riße im Anhange dieses Aufsatzes beysüge.

Wenn das Kochen bey Privatpersonen des Mittags und Abends geschehen ist, kann in einem solchen umschloßenen Herde zu Herbstzeit Obst getreuget, und sonst allerley gebacken werden, nachdem Asche und Kohlen heraus genommen, und der Herd gefeget worden: man darf die Löcher mit ihren Vorseß-Bleichen nur zumachen, so bleibt nach meiner Erfahrung, der Herd inwendig zu diesen Behülfe lange Zeit heiß und warm genug, ja er wird von einer Mahlzeit zur andern nicht kalt.

Wollte man in großen Herrschaftlichen, Kloster, Waisenhäusern und andern dergleichen Küchen die Anstalt einer Probe würdigen, so wird die Wahrheit dessen, was ich gesagt, sich deutlicher zeigen; nur dieses bitte ich, sich durch nichts bedeutende und ungegründete Einwendungen, derer Köche und Köchinnen nicht abwendig machen zu lassen, sondern ihr Vorgeben wohl zu untersuchen, und zu überlegen, da sich denn bald zeigen wird, wie weit sie Recht oder Unrecht haben.

XIII.

Das Thee- und Caffee-Trinken.

Seitdem das Thee- und Caffee-Trinken so gar in manchen Gegenden Deutschlands unter die gemeinen Leute gekommen,

und zum allgemeinen Getränke geworden, so gehet das Feuer zwischen denen Mahlzeiten in denen Küchen gar nicht mehr aus, und die Holzversplinterung, so damit geschiehet, ist offenbar, was aber dem gemeinen Manne einmal schmeckt, davon ist er nicht leicht abzubringen, das Handlungswesen würde auch darunter leiden, wenn es ihm untersagt würde, und wird es ihm nicht untersagt, so leidet der Brau- und Ubrar darunter; es ist also schwer wider diesen Mißbrauch des Holzes ein Mittel zu finden, so lange die Menschen nicht begreifen wollen, daß vieles warmes Getränke der Gesundheit nachtheilig sey, die Natur des menschlichen Körpers nur weichlich macht und dieselbe verzärtelt.

XIV.

Die bösen Wege und Straßen.

Es ist zwar in verschiedenen Gegenden Deutschlands rühmlich auf die Verbesserung der Straßen mit Kieß und Steinen gedacht worden; es ist zu wünschen, daß diese Verbesserung weiter ausgebreitet werde; gleichwohl aber ist nicht zu leugnen, daß bisher zu Ausbesserung der Straßen in vielen Gegenden, wo etwas Holz stehet, dasselbe noch die Stunde hauffenweise in die Wege und Straßen niedriger Gefilde geworfen, und nur etwas Erde drauf geschüttet werde; obgleich Steine und Kiesel genug in der Nähe vorhanden sind, dergleichen Verbesserung mehr eine Verschlimmerung genennet zu werden verdienet, wenn man betrachtet, daß, wenn das Holz mit denen Wagenrädern durchfahren, Pferde und Wagen auf solchen Wegen vielmal verunglücken.

Wo keine Steine und Kiesel gleich am Tage in der Nähe liegen, da darf nur etliche Fuß tief eingeschlagen und unter der Dammerde hie und da an denen Straßen selbst nachgesucht werden, so finden

en sich öfters Steine, Kiesel und Sand genug zum Straßen-, wovon bey denen in Deutschland und Frankreich erhöhten Straßen Beyspiele genug vorhanden sind. Niemand wird zweifeln, die Verbesserung der Wege und Straßen mit Steinen, Kiesel und Sand vor ein Mittel angesehen werden könne, das Holz gegen den einreißenden Mangel zu ersparen.

XV.

Die reißenden Flüsse.

Weil es bey reißenden Flüssen hauptsächlich darauf ankommt, man deren Strohstreich, so das eine, oder das andere Ufer selbst anfüllet, und auswaschet, durch recht und geschickt angelegte Packwerke ablenke, so hat man freylich seit uralten Zeiten dazu gebraucht, es könnte auch denen Einwohnern solcher Flüsse dergleichen Vornehmen leicht verziehen werden, wenn sie ihre Ufer mit genugsamen Weiden- und Ellern-Hölze bepflanzen, das sie zu solchen Wasserbau brauchen und zwischen die Verwägungen Stein-Schutt, der vielmal in der Nähe ist, einstürzen lassen, so aber werden oft viele hundert ja tausend Schock Eichen, Buchen, Baum und Knüttel-Holz aus denen Wäldern zu dergleichen Wasserbaue angewendet, und alle Zwischenräume der Verwägungen damit ausgefüllet, welche Bau-Art eine erschreckliche Holzverwüstung in dergleichen Gegenden anrichtet. Hierwider ist das beste Mittel, daß man denen Feindseligkeiten des Stroh-Streiches beyzulegen vorkomme, und nicht erst den Schaden und Einbruch des Wassers zu groß werden lasse, auch sich dabey des Stein-Schuttes und Kiefels mehr, als bisher bediene, worüber Herr Silberschlag's Schrift vom Wasserbau an Strömen, so zu Leipzig bey Wendisch 1756. in 8. gedruckt worden, mit vielen Nutzen nachzulesen wird.

XVI.

Die Feuersbrünste.

Die vielen und grossen Feuersbrünste, wodurch ganze Städte und Dörfer in die Asche gelegt werden gehören unter die Ursachen des einreisenden Holzmangels, weil die verunglückten Dörfer meistens theils wieder mit Holz aufgebauet werden, oder wozu doch, wenn ja die Mauern von Stein oder Leimen gemacht werden, Balken, Sparren, Pfaden, Latten, Bretterwerk und dergleichen von neuem nöthig ist; oft müssen ganze Wälder hiezu auf einmal erhalten und umgehauen werden. Gegen diese Holzverwüstung ist kein sicherer und zuverlässiger Mittel, als man richte an solchen abgebrannten Dörfern feuerfeste Gebäude von Steinen oder Leimen wieder auf, und dabei das Holz von allerley Art, so gut man kan, und es sich lassen will.

Ich kenne ein Land, wo vor vielen Jahren wegen der häufigsten darinne entstandenen Feuersbrünste alle alte Trücker, das Holzwerk noch stark genug war, eben sowohl mit Lath-Ziegeln, als der neuen Gebäude ihre belegt werden mußten, man war der Feuers-Gefahr hernach weniger unterworfen, und hatte nicht mehr so viel Schindel und Bauholz nöthig.

Daß es möglich sey, Gebäude von puren Steinen zu bauen, hat der Graf d'Espie in einem kleinen Aufsatze gezeigt, welcher ins Deutsche übersezt, unter den Titel: Abhandlung von unverbrennlichen Gebäuden, von Michael Macklot verlegt worden, und zu Frankfurt am Mayn, und in Leipzig 3. Bogen stark in 8vo mit zwey Kupfertafeln zu haben gewesen.

XVII.

Die Stürme.

Starke Stürme und Winde legen bisweilen das Stamm-
n den Wäldern Strichweise in großer Menge darnieder, wo-
erfahrene Forstbediente Beispiele genug anzuführen wissen; und
hmals selbst ein Augenzeuge gewesen.

Wieder dieses Uebel, woraus in einer Gegend, die es betrifft,
der Zeit großer Holzmangel entstehen kann, ist kein anderes Mit-
als den Wald nach derjenigen Seite wohl geschlossen, zu halten,
die stärksten Stürme herzuwehen pflegen, und sonderlich die
arzen Hölzer daselbst, wo es anders der Erdboden zu löst, mit
Pflanzung genugsamen Buch-Holzes, als Eichen, Buchen, Bir-
c. gleichsam zu verpfählen, woran sich die Stürme und starken
nde brechen, welches und noch mehrers ich verständigen und Flu-
forstgerechten Leuten billig überlasse.

XVIII.

Der Aufkauf des Holzes von Ausländern.

Hätten die Deutschen Ueberfluß an Holze, so wäre ihnen der
theil zu gönnen, dasselbe an die Ausländer mit guten Nutzen zu
kaufen; da aber jetzt an allen Orten über Holzmangel geklagt wird,
an der bisherige Holzverkauf an die Fremden viel Schuld hat;
ist kein beßer Mittel dagegen, als diesen Holz-Handel zu unter-
n, sonst dürften diejenigen, denen dieser Handel am meisten ein-
ngen, am Ende frieren müssen, weil sie mit dem davor erhaltenen
de sich nicht allezeit eine warme Stube zu schaffen im Stande
werden; denn das Holz fängt in manchen Gegenden an, so rar zu
en, daß auch selbes vor vieles Geld kaum mehr zu haben ist. Man

muß bey dergleichen Dingen nicht bloß auf den gegenwärtigen Nutzen sehen, die Nachkommen haben auch Holz nöthig, und wollen wir bey ihnen vor gute Haushalter gehalten werden, so müssen wir auch auf sie bedacht seyn, und die Ausländer ihre Häuser und Schiffe von Holze aus solchen Ländern bauen lassen, die einen Ueberfluß davon haben.

XIX.

Die noch mangelnden achten Grundsätze einer pflichtmäßigen Forst-Wirthschaft.

Bey diesen Artikel thut sich ein zu Weitesfeld auf, als daß ich es mit kurzen Betrachtungen übersehen könnte, welche ich mir in dieser Schrift zum Gesetze gemacht; er verdienet eine eigene Abhandlung, in welcher die dahin einschlagenden Dinge nach achten Grundsätzen untersucht, und hierauf Regeln fest gesetzt werden müssen, nach welchen alle Arten von Holz in denen Wäldern wohl und pfleglich gehalten werden könnten, daß sie ihren Eigenthümern, den gehörigen Nutzen geben, und nicht verwüestet werden. Ich will hier nur zwei Hauptfehler berühren, wodurch eine Waldung verwüestet werden kann; entweder wenn zu verschwenderisch mit denen Schlägen umgegangen, und zu viel Holz auf einmal abgetrieben wird, oder wenn man das schlagbare Holz zu lange stehen und überständig werden läßt; beyde Fehler können aus Geiz nach Gelde entstehen; der erste auf einmal viel Einnahme zu machen, der andere, auf Theuerung zu warten, wozu noch die Unwissenheit der Waldwirthschaft beizutragen kann.

Daß ein Wald zu stark und auf verschiedene unrechte Weise angegriffen werden könne, daran wird niemand zweifeln; denn das neue Holz wächst nicht so geschwind wieder auf, als das alte umgeschlagen

Weil auch Kohlen und Asche in solchen Herden nicht frey liegen, so sind die Küchen am Fußboden reinlicher: damit aber der Bau eines solchen umschlossenen Herdes desto deutlicher werde, so hoffe ich denen Liebhabern der Holzerspahrung und häuslichen Wirthschaft keinen unnützen Dienst zu thun, wenn ich ihnen eine Anlage zu einem umschlossenen Küchen-Herde mittheile, und solche nebst einer Beschreibung und Risse im Anhang dieses Aufsatzes beynüge.

Wenn das Kochen bey Privatpersonen des Mittags und Abends geschehen ist, kann in einem solchen umschlossenen Herde zu Herbstzeit Obst getreuget, und sonst allerley gebacken werden, nachdem Asche und Kohlen heraus genommen, und der Herd gefeget worden: man darf die Löcher mit ihren Vorseh-Bleichen nur zumachen, so bleibt nach meiner Erfahrung, der Herd inwendig zu diesen Behülfe lange Zeit heiß und warm genug, ja er wird von einer **Wahrheit** zur andern nicht kalt.

Wollte man in großen Herrschaftlichen, Kloster, Waisenhäusern und andern dergleichen Küchen die Anstalt einer Probe würdigen, so wird die Wahrheit dessen, was ich gesagt, sich deutlicher zeigen; nur dieses bitte ich, sich durch nichts bedeutende und ungegründete Einwendungen, derer Köche und Köchinnen nicht abwendig machen zu lassen, sondern ihr Vorgeben wohl zu untersuchen, und zu überlegen, da sich denn bald zeigen wird, wie weit sie Recht oder Unrecht haben.

XIII.

Das Thee- und Caffee-Trinken.

Seitdem das Thee- und Caffee-Trinken so gar in manchen Gegenden Deutschlands unter die gemeinen Leute gekommen,

Anhang.

Ich habe im XII. Artikel dieser Betrachtungen die Beschreibung eines Kochherdes versprochen, auf welchen ein umschloßenes Gefäß brennen, und bessere Wirkung gegen die Kochgefäße thun kann, als ein ganz frey brennendes. Hier halte ich mein Versprechen, und werde hauptsächlich zweyerley dergleichen Herde beschreiben, und ihre Zeichnung mittheilen: der erste soll ein bloßer Kochherd, und der andere ein Koch- und Bratherd zugleich seyn. Warum ich statt der gewöhnlichen länglich viereckigten, die runde Gestalt erwählet, dazu habe ich folgende Ursachen:

- 1.) Weil das Feuer, als ein flüssiges Wesen, sich leichter gegenweife und in die Runde, als nach einer geraden Linie beweget, und daher in einem runden Behältniße auch besser, als in einem eckigten wirket, wie ich an demwärts deutlich erwiesen habe.
- 2.) Weil viel Kochgefäße auf einen nicht allzugroßen runden Herde um das Feuer stehen können.
- 3.) Weil man bequemer um einen runden, als um einen eckigten Herd gehen, und nach denen kochenden Dingen sehen kann.

Beschreibung, des bloßen Kochherdes.

Fig. 4. 5. 6. A. Ein runder ganz frey stehender Feuerherd $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch, 7. Fuß 8. Zoll im Durchmesser.

B. Eine gewölbte Höhe, das Holz hinein zu legen.

Fig. 4. 5. C. Ein runder Ofen aus dem Mittelpunkte des Feuerherdes mit einem halben Durchmesser von $2\frac{1}{2}$ Fuß Länge beschrieben.

schrieben, wovon $\frac{1}{2}$ Fuß vor die Dicke der Ofen-Mauer zu nehmen ist, so, daß der halbe Durchmesser des Ofens 2-Fuß, und der ganze Durchmesser 4-Fuß im lichten bleibe.

4 5. 6. D. Die Ofen-Mauer ungefähr 18. bis 20. Zoll hoch.

4 E. Die Löcher vor die Kochgefäße in der Ofen-Mauer; es kann sie jeder nach der Größe seiner nöthigen und gewöhnlichen Kochgefäße groß und klein machen lassen, weßwegen hiezu auch kein eigentliches Maaß angebe. Durch diese Löcher werden die Kochgefäße in den Ofen an das Feuer gesetzt.

4 5. 6. F. Eine gegossene eiserne Deck-Platte mit Löchern, die Koch-Gefäße auf umgekehrt eingehangene eiserne Dreyfüße hinein zu setzen; sie kann aus einen oder zwey Stücken bestehen; die in ihren Falzen zusammen gefüget werden, und muß $4\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser haben, damit sie überall an ihrem Umkreise 3. Zoll breit in einem Falze der Ofen-Mauer aufliegen könne, sie wird wenigstens $\frac{1}{2}$ Zoll dicke seyn müssen; die Löcher in dieser Deck-Platte können nach eines jeden Gebrauch von verschiedener Größe seyn. Es wird in der Mitten der Deck-Platte ein großes Loch von 16. 18. bis 20. Zoll im Durchmesser gemacht, einen großen Topff oder Kessel mit Wasser darüber zu setzen, oder an eine Kette zu hängen.

4 G. Das Schürloch zum Holz anlegen.

Leichen Koch-Herd kann nach eines jeden Haushaltung groß, oder klein, von Mauerziegeln seyn, und wenn in den Ofen zwey Feuer-Öfene gesetzt werden, das Holz darauf zu legen, so brennet es sehr gut. Will man den Ofen-Herd mit einer eisernen Platte von 4. Füßen im Durchmesser belegen, so werden viele Ausbesserungs-Kosten des Feuer-Herdes erspart, und die Koch-Gefäße besser und bequemer hin und her gerückt werden können.

Die Feuersbrünste.

Die vielen und grossen Feuersbrünste, wodurch ganze Städte und Dörfer in die Asche gelegt werden gehören unter die Ursachen des einreisenden Holzmangels, weil die verunglückten Dörter meistens wieder mit Holz aufgebauet werden, oder wozu doch, wenn ja die Mauern von Stein oder Leimen gemacht werden, Balken, Sparren, Pfaden, Latten, Bretterwerk und dergleichen von neuem nöthig ist; oft müssen ganze Wälder hiezu auf einmal erhalten und umgehauen werden. Gegen diese Holzverwüstung ist kein sicherer und zuverlässiger Mittel, als man richte an solchen abgebrannten Orten feuerfeste Gebäude von Steinen oder Leimen wieder auf, und lasse dabey das Holz von allerley Art, so gut man kan, und es sich thun lassen will.

Ich kenne ein Land, wo vor vielen Jahren wegen der häufigsten darinne entstandenen Feuersbrünste alle alte Trücher, das Holzwerk noch stark genug war, eben sowohl mit Lath-Ziegeln, als der neuen Gebäude ihre belegt werden mußten, man war der Feuers-Gefahr hernach weniger unterworfen, und hatte nicht mehr so viel Schindel und Bauholz nöthig.

Daß es möglich sey, Gebäude von puren Steinen zu bauen, hat der Graf d'Espie in einem kleinen Aufsatze gezeigt, welcher in Deutsche übersezt, unter den Titel: Abhandlung von unverbrennlichen Gebäuden, von Michael Macklot verlegt worden, und zu Frankfurt am Mayn, und in Leipzig 3. Bogen stark in 8vo mit zwey Kupfertafeln zu haben gewesen.

5. 6. M. Der blechene Schieber vor das längliche Loch aus dem Ofen-Herde, wenn man das Brat- und Back-Ofen nicht nöthig hat.

Man fürchte sich nur nicht vor denen auf dergleichen Herde wachenden Kosten, die Ersparung des Holzes, so sie verschaffen, ist nicht allein in kurzer Zeit, sondern bringet in der Hausung der Städte und auf dem Lande in der Folge der Zeit großen Nutzen, den ich durch gemachten Versuch selbst erfahren. Wollte man die in der Schweiz übliche Holz-Menage mit eisernen Kochpfannen, welche sich wie 1. zu 3. gegen die töpfern Gefäße verhält, hinzufügen, so würde der Nutzen desto beträchtlicher werden. In alles Kocht, wie man sagt, in einem eisernen Topfe viel gewinder, und wird leichter in Sud gebracht, und darinne erhalten, als in einem irdenen. Die eisernen Töpfe sind dauerhafter, als von Eisen, und brauchen nicht verzinkt zu werden; damit aber die Speisen in denen eisernen Töpfen nicht schwarz werden, glüheth man diese durch und durch, beschmieret solche noch glühend aus, und indig mit Speck, läset solche erkalten, und reibet sie mit einem rauhen Kieselsteine wohl ab, siedet solche alsdenn mit einer scharfen Lauge aus, und kochet endlich ein oder zweymal Sauerkraut darin: so wird auf solche Weise alle Schwärze benommen, nur daß die übrigen reinlich gehalten werden müssen, wie in dem Leipziger Eigen-Blatte No. 7. 1766. gedacht worden.





schlagen wird; der andere Fehler aber ist, außer ächten und erfahrenen Forstverständigen, vielen Waldberechtigten nicht allemal begreiflich genug, und dennoch ist er ein wahrer Fehler; denn wenn das Holz über den Zeit-Punkt seiner Reife stehen bleibt, nimmt es wieder ab, wird dünne, fängt an zu faulen und morsch zu werden, wird endlich gar unbrauchbar, dieses ereignet sich sowohl an Stamm-, als Busch-Holze; der Eigenthümer verlieret sowohl an der Zeit, als am Holze selbst; die Holzleser nutzen alsdenn den Wald am besten, und tragen vielleicht das meiste, sonderlich von dem Busch-Stangen-oder Mittel-Holze mit dem dünnen Lese-Reißig, so der Wind und sie selbst abreißen nach Haufe; die Stöcke des Busch-Holzes werden zu alt, und schlagen hernach nicht recht wieder aus, verfaulen, und der Wald mit dessen Benutzung hat auf einmal ein Ende. Das überflüssige Stamm-Holz nutzt weder zum bauen, noch zum brennen, und ist im Werthe und Preise allemal geringer, als das bey rechter Reife geschlagene.

Das beste Mittel wieder diese und andere Forstfehler, welche nebst denen noch mangelnden ächten Grundsätzen einer pfleglichen Forstwirtschaft ebenfalls vor Ursachen des einreißenden Holzmangels anzusehen sind, ist, dergleichen ächte Grundsätze aus der Natur der Sache selbst aufzusuchen, und dadurch denen bisherigen Fehlern und Holzmangel nach aller Möglichkeit abzuheben, wozu geschickte, redliche und verständige Forst-Beamte und Bediente aus richtigen Erfahrungen und täglichen Anmerkungen das beste und meiste werden benutzen wissen, wenn sie solche alsdenn einem geschickten naturforschenden und richtig denkenden Gelehrten anvertrauen, und sich dem gemeinen teutschen Besten verdienstlich machen wollen.

Anhang.

Ich habe im XII. Artikel dieser Betrachtungen die Beschreibung eines Kochherdes versprochen, auf welchen ein umschlossenes Feuer brennen, und bessere Wirkung gegen die Kochgefäße thun kann, als ein ganz frey brennendes. Hier halte ich mein Versprechen, und werde hauptsächlich zweyerley dergleichen Herde beschreiben, und ihre Zeichnung mittheilen: der erste soll ein bloßer Kochherd, und der andere ein Koch- und Bratherd zugleich seyn. Warum ich statt der gewöhnlichen länglich viereckigten, die runde Gestalt erwählet, dazu habe ich folgende Ursachen:

- 1.) Weil das Feuer, als ein flüssiges Wesen, sich leichter entgegenweise und in die Runde, als nach einer geraden Linie bewege, und daher in einem runden Behältnisse auch besser, als in einem eckigten wirket, wie ich anderwärts deutlich erwiesen habe.
- 2.) Weil viel Kochgefäße auf einen nicht allzugroßen runden Herde um das Feuer stehen können.
- 3.) Weil man bequemer um einen runden, als um einen eckigten Herd gehen, und nach denen kochenden Dingen sehen kann.

Beschreibung, des bloßen Kochherdes.

Fig. 4. 5. 6. A. Ein runder ganz freystehender Feuerherd $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch, 7. Fuß 8. Zoll im Durchmesser.


B. Eine gewölbte Höhe, das Holz hinein zu legen.

Fig. 4. 5. C. Ein runder Ofen aus dem Mittelpunkte des Feuerherdes mit einem halben Durchmesser von $2\frac{1}{2}$ Fuß Länge beschrie-

Lithologische
Beobachtungen.

von

Matthias Brunnwiser,
Philosophie, und Arzneygelehrtheit Doctor,
dann Stadtphysicus in Kehlheim.



ithologische Beobachtungen.

Regend in welcher ich wohne, giebt einem Naturforscher Beobachtungen anzustellen, vielfältige Gelegenheit.

Die Verwitterung der Steinen, deren einige in die Erde, aus-
 bestehen, und in kein andere verwitteren, es mögen die
 eyn, wie sie wollen, und hingegen andere nach denen äuße-
 ren entweder in ihr eigene Erden, oder in ein ganz an-
 dem Steine verschiedene übergehen, ist eine Sache, so sehr
 , aber auch sehr dunkel ist.

Die Steile, sehr hohe Kalkfelsen, welche sowohl an der Donau
 Altmühlflüsse gleich Mauern, und Thürmen auf beyden
 en, lassen ein Nachdenken hinter sich, wie es möglich ge-



Ph. abh. VIII T. pag. 152

AMSTERDAM LIBRARY

auf dem sogenannten Goldberge, ragen auf den Feldern, und anhangenden Walde große Hornsteinartige Felsen hervor. Wie dann auch dergleichen Steine von verschiedener Größe in der ganzen Gegend zerstreuet liegen. All diese Steine, die von der Verwitterung nicht angegriffen, fallen in der Farbe in das Aschengraue; sie haben auch an Größe verschiedene weißlichte Flecken, welches versteinerte Muschelnarten sind. Diese Steine schlagen alle mit Stahl häufige Feuerfunken, lassen sich auch poliren, und erhalten durch solches einen schönen Glanz.

Diese Steine, wenn sie in höherem Grade der Verwitterung stehen, sehen mehr einem Sand- als Hornsteine gleich: dann neben dem, daß sie rauh anzufühlen, sieht man auch in selben mit freiem Auge sowohl, als mit dem Vergrößerungs-Gläse braune, rothe, und schwarze Körner, auch unter diesen weisse Quarzkörner liegen. Die Körner sind in der Höhe der aus der Erde hervorragenden großen Steinen viel und groß, und werden gegen der Mitte, wenn man den Stein sprengt, weniger und kleiner, nachdem nämlich die Verwitterung tief eingetrungen, und verlieren sich endlich unter der Erde ganz, und der Stein hat allda seine natürliche Gestalt.

Da ich sehr viele dieser aus der Erde ragenden Steine zer schlagen, und auch einige mit Pulver sprengen lassen, nochmehr aber einzelne auf dem Felde, und im Walde liegende, mit aller Aufmerksamkeit betrachtet; so habe ich in selben die Grade der Verwitterung zu bestimmen gesucht. Da aber die Wirkungen der Natur unendlich einzusehen sind, so bin ich gar wohl zu friden, wenn man noch viele 100. zwischen grade mit unterlaufen läßt.

Der 1te Grad ist jener, wenn der Stein auf der Oberfläche den Glanze verliert, die Farbe verändert, und weißlich wird. In diesem Grade ist der Stein noch glatt anzufühlen, und schlägt mit Stahl noch häufige Feuerfunken.

In

In dem 2ten Grade ist der Stein rauh, und man sieht hin und wieder besonders mit dem Vergrößerungs-Gläse kleine braune, oder auch schwarze Körner, und eben diesen weißglänzende Quarzkörner. In diesem Stande schlägt der Stahl kein Feuer mehr, außer er berührt noch ein unverwittertes weißes Quarzkorn. Hingegen wenn man den Stein ausglühet, so zieht der Magnet vieles an sich.

Im 3ten Grade wird dieser Stein mit großen, theils schwarzlichten, theils gelben Flecken gänzlich gefärbt. Die weiße Quarzkörner werden nicht mehr gesehen, er schlägt auch mit Stahl keine Feuerfunken, und wenn man ihn ausglühen laßt, so ziehet der Magnet fast alles an sich.

Merkwürdig scheint mir zu seyn, daß in diesen, und auch 2ten Grade die in unverwitterten Steine sich gezeigte weißlichte Flecken sich abzusondern scheinen, und jetzt in dem Steine, wie ein Ast in einem dürren Baume stecken. Aus einigen Steinen kann man diese heraus schlagen, welche nichts anderes sind, als Muschelartige in Hornsteine veränderte Sachen. Ich habe einen dergleichen in 2ten Grade verwitterten Steine, wo ein versteinerte Muschel in ihren Muschelglanze vollkommen kennbar ist.

In diesem Grade der Verwitterung ist der Stein noch sehr schwer, doch kann ich nicht bestimmen, ob die Schwere mit einem unverwitterten von eben der Größe unterschieden seye.

Wenn dieser Stein den 4ten Grad erreicht hat, so bekommt er neben deme, daß er von der Schwere sehr vieles verlohren, ganz ein anderes Aussehen. Die Außenfläche ist zwar, wie bey den andern in der Verwitterung nicht so weit gekommen, schwarzlicht, und ist Moose bewachsen, aber er ist ganz mürbe, und man kann ihn mit einer Säge zerschneiden, auch mit dem Messer, wie einen trocknen Ebon schaben. Die von einander geschnittene Theile sind lichtgelb,

gelb, und mit weißlichten Flecken, und zwar also versehen, daß dieselben mit dem ganzen wieder vereinigt, und nicht so abgesondert, wie im 1ten und 2ten Grade in Vorschein kommen.

In diesem Grade zieht der Magnet nach dem Ausgüsse keinen Eisenstaub mehr aus, doch läßt sich auch die Masse, wenn mit Wasser angefeuchtet wird, zu keinem Teige machen.

Der 5te und letzte Grad endlich ist, wenn der in 4ten Grade beschriebene Stein in einen gelben mit weißlichten Flecken begabten Thon übergeht. Dieser Thon ist Zäh, und läßt sich wie ein anderer Thon behandeln.

IV. Beobachtung.

Wenn man von Postsaal nacher Abensberg fährt, so sieht man in dem sogenannten Brückenthale, ehe man auf die Reiskampfelder hinaus kommt, neben der Landstraße eine Grube an, aus welcher man zum Straßenmachen Kieselsteine herausgräbt. In der Höhe dieser Gegend, wo dieser Kiesel liegt, ist 1stens Leim, 2stens Zieglerthon, sodann kommt 3stens mit Leim vermischter Sand, 4stens dunkelgelber Ocherhafter Sand; nach dieser Lage findet man 5stens verschiedene große und kleine Kieselsteine, deren einige (a) wie einen Eisenrost überzogen ausgehen, und noch feste sind, auch im Innern, wenn man es zerschlägt, ebenfalls rostig, und gelb ausgehen. Andere (b) kann man mit den Fingern zu Sande reiben. Andere (c) lassen sich in Blatten zertheilen, und die auseinander gehenden Stücke bleiben auf einer Seite breit, auf der andern aber sind sehr schneidend, und gleichen an Gestalt abgerichteten Flintensteinen. Wiederum andere (d) ungeacht sie ihre Gestalt noch haben, lassen man gleich einer Leimerde mit Wasser zum Teige machen, worin aber sehr vieler feiner Sand ist. Alle diese aber, wenn sie aus-

jet werden, werden dunkelroth, und der Magnet ziehet sodann eine unge Eisen aus selbst; nach diesen ziemlich verwitterten Steinen finden andere, so mehr oder weniger von der Verwitterung angefaßen sind; sie sind licht und dunkelgelb, auch einige braun, und roth; sie sind nicht so mürbe als vorige, und in einigen, wenn man zerschlägt, kann man in dem Kern noch die Quarzartige Gestalt sehen; die noch tiefer liegende sind lichtgelb, auch weißlicht, und fassen allen Ansehen nach erst zu verwittern an. Der Erdboden dieser Gegend ist mit Birkenbäumen, Wachholder Stauden, und verschiedenen Kräutern überwachsen.

V. Beobachtung.

Auf dem gegen Mitternacht uns naheliegenden Berge, woran die alte Landstraße nachher Hemaß geht, und den ich wegen den Mergelsteinen, mit welchen er überhäufet ist, Mergelberge nenne, findet man weiße Steine, welche, wenn man es zerschlägt, gelbe Flecken haben, sie schlagen mit Stahl Feuer, und wenn man es ausglühet, so geben sie mehrere Funken, werden folglich in Feuer härter, und wegen letzteren glaube ich, daß sie unter die Mergelsteine, wegen ihrer Weiße aber unter die Porcellansteine zu rechnen sind.

Nicht weit von diesen Steinen habe ich eine weiße Thonerde gefunden, welche ebenfalls gleich vorigen Steinen mit gelben Flecken bemackelt ist. Um die Gegend dieser Erde findet man auch sehr kleine, runde, und weiße Steine, welche mit einem Hammer ohne Mühe in die Gestalt der weißen Erde gebracht werden können; welches beweiset, daß diese Erde aus den Steinen verwittert, und da ich einem Erdborhrer ergründen wollte, wie tief sich diese Erde erstreckt, habe ich in der Tiefe von 18 Schuben Stücke herausgezogen,

gelb, und mit weißlichten Flecken, und zwar also versehen, daß diese mit dem ganzen wieder vereinigt, und nicht so abgesondert, wie im 1ten und 2ten Grade in Vorschein kommen.

In diesem Grade zieht der Magnet nach dem Ausglühen keinen Eisenstaub mehr aus, doch läßt sich auch die Masse, wenn sie mit Wasser angefeuchtet wird, zu keinem Teige machen.

Der 5te und letzte Grad endlich ist, wenn der in 4ten Grade beschriebene Stein in einen gelben mit weißlichten Flecken begabten Thon übergeht. Dieser Thon ist Zäh, und läßt sich wie ein anderer Thon behandeln.

IV. Beobachtung.

Wenn man von Postsaal nacher Abensberg fahet, so wird man in dem sogenannten Brückenthale, ehe man auf die Reisinger Felder hinauf kommt, neben der Landstraße eine Grube antreffen, aus welcher man zum Straßenmachen Kieselsteine herausgegraben. In der Höhe dieser Gegend, wo dieser Kiesel liegt, ist 1tens Leim, oder Zieglerthon, sodann kommt 2tens mit Leim vermischter Sand, dann 3tens dunkelgelber Ocherhafter Sand; nach dieser Lage findet man 4tens verschiedene große und kleine Kieselsteine, deren einige (a) wie mit einem Eisenroste überzogen ausgehen, und noch feste sind, auch von Innen, wenn man es zerschlägt, ebenfalls rostig, und gelb aussehen. Andere (b) kann man mit den Fingern zu Sande reiben. Andere (c) lassen sich in Blatten zertheilen, und die auseinander gehende Stücke bleiben auf einer Seite breit, auf der andern aber sind sie schneidend, und gleichen an Gestalt abgerichteten Flintensteinen. Wiederum andere (d) ungeacht sie ihre Gestalt noch haben, kann man gleich einer Leimerde mit Wasser zum Teige machen, worunter aber sehr vieler feiner Sand ist. Alle diese aber, wenn sie ausgeglüht

het werden, werden dunkelroth, und der Magnet ziehet sodann eine unge Eisen aus selbst; nach diesen ziemlich verwitterten Steinen kommen andere, so mehr oder weniger von der Verwitterung angegriffen sind; sie sind licht und dunkelgelb, auch einige braun, und roth; sie sind nicht so mürbe als vorige, und in einigen, wenn man zerschlägt, kann man in dem Kern noch die Quarzartige Gestalt sehen; die noch tiefer liegende sind lichtgelb, auch weißlicht, und fangen allen Anschein nach erst zu verwittern an. Der Erdboden dieser Gegend ist mit Birkenbäumen, Wachholder Stauden, und verschiedenen Kräutern überwachsen.

V. Beobachtung.

Auf dem gegen Mitternacht uns naheliegenden Berge, woran die alte Landstraße nach Hemaue geht, und den ich wegen den Mergelsteinen, mit welchen er überhäufet ist, Mergelberge nennen will, findet man weisse Steine, welche, wenn man es zerschlägt, blass gelbe Flecken haben, sie schlagen mit Stahl Feuer, und wenn man es ausglühet, so geben sie mehrere Funken, werden folglich in Feuer härter, und wegen letzteren glaube ich, daß sie unter die Sandsteine, wegen ihrer Weisse aber unter die Porcellansteine zu rechnen sind.

Nicht weit von diesen Steinen habe ich eine weisse Thonerde gefunden, welche ebenfalls gleich vorigen Steinen mit gelben Flecken bemackelt ist. Um die Gegend dieser Erde findet man auch sehr kleine, runde, und weisse Steine, welche mit einem Hammer ohne Mühe in die Gestalt der weissen Erde gebracht werden können; welches beweiset, daß diese Erde aus den Steinen verwittert, und da ich mit einem Erdborher ergründen wollte, wie tief sich diese Erde erstreckte, habe ich in der Tiefe von 18 Schuhen Stücke herausgezogen,

die denen gleichen, so die Ringe und lockere Steine geben. Es läßt sich also nicht zweifeln, daß, wenn man tiefer gräbe, als ich mit dem Erdbohrer gekommen, unverwitterte dergleichen Steine angetroffen würden.

So wie erstbemeldte Thonsteine in ihr eigene Erde verwittern, so verwittern auch andere nicht glasartige Steine in ihre eigene, und so viel ich auch deren Verwitterungen gesehen, so ich kürze halber übergehen will, so habe doch niemals wahrnehmen können, daß sie wie die Kieselartige Steine in eine andere Erde übergegangen wären, es mögen auch die äußere Umstände gewesen seyn, wie sie immer wollen.

Diesen meinen Beobachtungen muß ich noch zwei andere beisetzen, welche, die Verwitterung betreffen, und mit den meinigen vollkommen übereinstimmen, aber in der Erklärung ganz entgegen gesetzt sind. Ich will sagen, es sind einige Schriftsteller, welche die Versteinerung zu geschehen glauben, die aber keine Versteinerung, sondern in Gegentheil eine wahre Verwitterung ist.

VI. Beobachtung.

Venette. (*) hat die Verwitterung, und Steinwerdung, wie mir scheint, nicht zu unterscheiden gesucht, und hat jenes, so eine Verwitterung ist, als eine Steinwerdung angegeben. „ Wenn man „ um Paris herum eine Grube machen will, sagt er, findet man „ anfänglich eine gemeine Erde, weiter unten eine harte, darauf einen „ zarten Stein, und endlichen einen Stein, der so hart, wie Marmor ist. „

Aus

(*) Abhandlung von den Steinen, aus dem Französischen übersetzt Corau 1763. Seite 84.

Aus diesem schließt Herr Venette, daß mittelst des Kessels das steinmachende Salz zugeführt, und mit diesem der unterliegende Marmorharte Stein erzeugt worden sey, daß der zarte Stein auch schon vermöge dieses Salzes den unteren gleich zu werden fange, die harte Erde aber wenig, und die Gemeine von solchem Salz noch gar nichts habe.

Betrachtet man diese, des Herrn Venette beschriebene Beobachtung mit denen obenangeführten, so wird man eine vollkommene Gleichheit finden. Wer wird aber wohl glauben können, daß die Hornsteine am Goldberge (3te Beobachtung) und die Kieselsteine Brückenthale von einem obenzufließenden steinmachenden Salz erzeugt worden seyen? ich konnte mir keinen Begriff machen, wie es der obensiegenden Leirerde die untenliegende quarzartige Kiesel (V. Beobachtung) erzeugt werden sollten; und die auf dem Goldberge (III. Beobachtung) hervorragende Hornsteine müßten nach den Begriffen des Herrn Venette in der Erde von dem oben, durch eben diese Steine zufließende steinmachende Salz sich erzeugen, und die ich meiner Meinung in Verwitterung stehende, eben diese Steine hätten außer der Erde in wahre hornsteinmäßige Gestalt erst übersehen. So wenig aber dieses wahrscheinlich ist, eben so wenig ist es des Herrn Venette angegebene Steinwerdung eine solche, sondern die gemeine Erde ist schon ganz verwittert, die harte Erde ist in der Verwitterung noch nicht so weit gekommen, und gleichet der in der Beobachtung (b) und 3ter Beobachtung 4ten Grade. Der harte Stein aber fangt erst zu verwittern an, und der Marmorharte ist von solcher noch ganz frey.

VII. Beobachtung.

Wie Venette um Paris ganze Steinlagen erzeugt zu werden glaubet, so sind auch andere, welche aus der obensiegenden Erde kleine Steine entstehen lassen.

Der berühmte Herr Lehmann (*) glaubt die Chrysoprase steine aus einer grünen Erde zu entstehen, unter welcher dieser Stein bey Rosemütz in Schlesien gefunden wird. Ich will keineswegs läugnen, daß nicht aus Erden Steine werden sollten, ja die Erfahrungen beweisen solches unläugbar. Aber! wenn ich meine Beobachtungen, und des Herrn Lehmanns Abhandlung gegen einander halt, so kann ich nichts anders abnehmen, als daß die Chrysoprase in die grüne Erde verwittert, und keineswegs die Steine aus solcher entstanden seyen. Die Lehmannische Bemerkung (**) von verschiedenen Thonarten, und besonders die No. 6. in grüner fetter Erde befindliche grüne doch etwas weiche Steine, mit bemelter Erde vermischt, lassen mich dieß vermuthen. Diese weiche Steine lassen sich um darumen nicht poliren, weiln durch die angefangene Verwitterung das steinmachende Wesen schon in etwas gewichen, folglich der Stein weicher geworden. Und wo einmal dieses dem Steine die Härte gebende Wesen abgängig, so ist das Poliren vergeblich. Die grüne Erde aber kommt von dem wirklich verwitterten und aufgelösten Steine her, wie die Thonerde von dem Hornsteine (II. Beob.) herkommt. Es haben also die suchende Steinschneider (***) mit Grunde für ein gutes Zeichen, wenn sie in der grünen Erde die weiche hoch grüne Steine finden, weil diese anzeigen, daß die Verwitterung sich nicht weit mehr erstrecken, sondern in der Nähe un- verwitterte Chrysoprase angetroffen werden müssen.

Der Unterschied, den Herr Lehmann angiebt, (****) „ daß
 „ nämlich die reiffesten Steine einige feste und harte, bisweilen aber
 „ einige klüftig und löcherig, einige eisenmalig sind, und braune Fle-
 „ fen,

(*) Fortsetzung der Probiertkunst.

(**) Ebendas. Seite 122.

(***) Ebendas. Seit. 123.

(****) Ebendas. Seite 124. No. 9.

„ten, ja einige gar die grüne Erde bey sich haben, : zeigt nichts anderes an, als daß auch in den festesten Steinen schon merckmaale der Verwitterung zugegen; wie dann all dieses mit dem verwitternden Hornsteine (2te Beobachtung) übereins kommt; auch die 3te, und 4te Beobachtungen mit diesen einstimmig sind. Ja die Lehmannsche Untersuchung der grünen fetten Erde (*) lassen an der Verwitterung ebenfalls nicht zweifeln; sie ist nicht tief unter der Dammerde, wodurch die Verwitterung am ersten dringt, und die dabei gefundene eben so gefärbte, aber in der Verwitterung noch nicht so weit gekommene steinartige Erde, welche sich nicht in Wasser weichen läßt, ist eben diese Chrysopraserde, und wird in Grade der Verwitterung derjenigen beikommen, welche Venette über den zarten Stein liegend beschreibt, auch mit jenen übereins stimmen, welche in II. Beobachtung (b) und III. Beobachtung 4ten Grade ich oben angemerkt habe.

Daß es ein gewisses Wesen giebt, welches die Erden zu Steine bindet, und wenn dieses wieder weicht, die Steine in Erden zerfallen, ist eine gewisse Sache, welches auch erst bemeldte Beobachtungen genugsam bezeugen, was aber dieses sey, ist zur Zeit noch nicht außer allen Zweifel gesetzt. De Savvages in denen französisch-akademischen Schriften für das Jahre 1746. (**) nennt dieses Wesen einen steinmachenden Saft (*succus lapidescens*) ob aber dieser Saft jenes seye, was dieser gelehrte Abbt sagt, und ob aus dessen Beschreibung (***) die Wesenheit des steinmachenden Wesens klar erhellet, lasse ich dahin gestellt seyn. Dessen aber ungeachtet ist es

Æ 3

sehr

(*) Eben dasselbe Seite 129. § 2.

(**) Coment. de rebus in scientia naturali & Med. gest. volum. I. pag. 309.

(***) Ibid. *succus lapidescens ex minimis compositus est molecularis, materie tenuis transparentis, quid in aqua dissoluta natat,*

sehr wahrscheinlich, daß von dem mehreren oder weniger Antheile dieses Wesens, mit dem die Steine begabt sind, die Härte, der Glanz, und andere Eigenschaften, abhängen. Hat dieses Wesen sich in genügsamer Menge mit der Kalkerde verbunden, so ist auch der Stein sehr hart, läßt sich poliren, und erhält durch dieses einen Glanz, (III. Beobachtung Marmor). Ist aber dieses Wesen in geringer Quantität mit der Kalkerde verbunden, so ist dieser Stein nicht fest, und nimmt auch keine, oder schlechte Politur an (III. Beobachtung unsere Kalksteine). Hat dieses Wesen in genügsamer Menge sich mit der reinen Kieselerde vereinigt, so wird der Stein im höchsten Grade feste, z. B. Quarze, Kristallen &c. Ist aber dieses Wesen in weniger Quantität mit der Kieselerde verbunden, so wird der Stein auch nicht feste zusammen hangen, (III. Beobachtung Sandstein,) oder, wenn aus dem festen Steine schon etwas gewichen, so sind diese Steine nicht mehr so hart, und zum Poliren untauglich, und ohne, oder vorr minderm Glanze, z. B. die in der Verwitterung stehende Chrysoprasen, Rosemüs, und die in 2ten Grade verwitterende Hornsteine (III. Beobachtung.

Gleichwie nun aus vorgehenden erhellet, daß durch den Austritt des steinmachenden Wesens die Erden zu Steine gebildet werden, so folget eben aus diesen, daß die Steine, wenn dieses wiederum austritt, in Erden zerfallen. Aber! in eben dieser letzteren Behandlung scheint mir Merkwürdig zu seyn, daß die Kalksteine, Mergelsteine, Thonsteine &c. wenn unter solchen keine Kieselerde vermengt ist, in jene Erde verwitteren, aus der sie bestehen, es mögen die äußerliche Umstände und Ursache beschaffen seyn, wie sie wollen. Wenigstens habe ich keine dergleichen Steine in eine andere Erde verwitteren sehen, so viel ich auch Wahrnehmungen habe. Da in Gegentheile der Kieselartige Stein, ganz allein zu Zeiten in eine ganz andere in der Verwitterung übergeht, wie die Hornsteine am Goldberge (III. Beobachtung

tung

ung) und die Kieselsteine in Brückenthale (IV. Beobachtung) Zeugnisse ablegen. Diese Steine machen durch Beytritt einer fremden Sache, welche sie anzunehmen fähig sind, in der Verwitterung eine weitzusamgesetztere Erde, als in dem unverwitterten Steine enthalten ist. Ja diese Steine, wenn sie in einem gewissen Grade der Verwitterung stehen, und keine Hinderniß des fremden Beytritts zugegen ist, können sogar in Eisen-Erze verkehrt werden, wie die Steine in III. und IV. Beobachtung solches beweisen, die nach der Menge des Eisens, so nach dem Ausglühen der Magnet an sich ziehet, als gutes Eisen-Erze anerkannt werden können. Und aus diesem Grunde glaube ich, daß die sowohl in unseren Gemeinwalde, als Frauenholze hin- und wieder gefundene Eisenerze von verwitterten Hornsteinen, und vielleicht alle Eisen-Erze von verwitterten Glasartigen Steinen ihren Ursprung haben. Zenkel also, und andere haben nicht unrecht, wenn sie die Grunderde des Eisens, als eine Kieselartige betrachten, welches oben angemerkte Steine genugsam zu erproben scheinen.

Dieses in der Verwitterung betreffende fremde Wesen, kömmt aus einem organischen Körper. Die Vegetabilien, welche verfaulen und zerstört werden, geben etwas von ihrer Grundmischung dem Steine, und dieser ist fähig solches anzunehmen, mit sich in Verbindung zu bringen, und aus dieser Verbindung wird eine andere Erde, nämlich Eisen, oder Thonerde. Wird aber dieses fremde Wesen durch Zufälle von der Verbindung abgehalten, so wird auch der glasartige Stein in keine andere Erde, als aus der er bestehet, verwitteren.

Der Hornstein (I. Beobachtung) verwittert aus letzter Ursache in Kiesel-erde, weil, obwohl das in der Atmosphäre befindliche Auflösungsmittel den Stein zerleget, der Zutritt einer fremden Sache aber, nicht Platz findet: dann dieser Stein steht frey; nichts kann sich von den Vegetabilien oder anderen darauf halten, noch weniger auf solchen von diesen etwas verfaulen, oder in Verbindung kommen, weil

weil Regen und Winde solchen jederzeit von allen bestreuen. Hingegen sind die Umstände bey den Hornsteinen (III. Beobachtung) ganz anders beschaffen. Diese Steine sind von Bäumen überschattet, wodurch sowohl das Regenwasser, als andere Feuchtigkeiten länger erhalten werden. Blätter der Bäume, und andere Vegetabilien bleiben auf solchen liegen, und diese verfaulen nicht allein auf selbst, sondern die argonische Erde, Salze, und andere Theile der zerstörten Vegetabilien, können sich bey der Verwitterung in der Ruhe mit der Kiesel Erde verbinden, und also eine neue erzeugen.

Eben diese Beschaffenheit hat es auch mit denen Brückenthälischen Kieseln (IV. Beobachtung), mithin hat bey beeden diesen Steinen der Zutritt eben jener Sache Platz gefunden, und bey diesen grasartige Steine werden in Eisenerze, und endlich auch in Thonerde verkehrt.

Aus diesen so klar in die Sinne fallenden Beobachtungen, kann man billich Herrn Buffon beypflichten, wenn er in allgemeiner Histori der Natur, Seite 143 die Thonerde von zerstörtem Sande (man kann noch hinzu setzen, von allen glasartigen Steinen) erzeugt zu seyn vorgiebt.

Da also die glasartige Steine nur allein, so viel mir wissend, bey gewissen Umständen in eine andere Erde übergehen: sollte man nicht vermuthen dürfen, daß die Kiesel Erde allein in gewissem Verstande jene einfache Erde sey, welche nach der Schöpfung entstanden, und in ihrer reinen und einfachen Gestalt nur allein als die Ursprüngliche anerkannt werden kann, von welcher all übrige herkommen? ich vermuthete es wenigstens, und nehme diese Hypothese als eine der wahrscheinlichsten an; dann, da die Vegetabilien, und Animalien neben anderen Urfanfängen die Kiesel Erde als dem Bestandtheil haben (*)

da

(*) Man sehe D. Carl Wilhelm Borners, Churf. Sächsischer Rathes Anmerkungen über Herrn Baumes Abhandlung von Thon.

in allen Steinen, welche nicht Kieselartig sind, solche Merkmale zeigen, welche vermuthen lassen, daß die Kiesel Erde nur verändert: da diese so beschaffen, daß sie wegen ihrer einfachen Wesen: in den Stand gesetzt sey, bey hinzukommender anderer Sache als anders zu bilden, wie solches in denen zu Eisenerze verwitterten Kiesel zu sehen ist, und also auch wie Herr Baume und Herr Linné anmerken (*) aller Metallen, Grunderde, ein Kiesel- oder dieser abstammende Erde sey: folglich keine andere Erde, was nur für natürliche Körper entstehen können oder mögen, nöthig sey; kann man auch solche als die ursprüngliche, allein nothwendige, als jene ansehen, welche nach der Schöpfung allein gewesen, und in ihrer einfachesten Feinheit, Reinheit, und Vollkommenheit: Grunde aller körperlichen Dinge allein nöthig ware, durch verschiedene Zufälle aber von der Schöpfung an, bis auf gegenwärtige verändert, und unter viele Gestalten verborgen worden.

Es würde eine schwere, und meine Kräfte übersteigende Aufgabe seyn, diese auch von anderen angenommene Hypothese mit gesammten überweisenden Gründen zu erproben, oder zu zeigen, daß alle von der Kiesel Erde abstammen, ich will also nur eine, und zwar Kalkerde, welche am weitesten von der Kiesel Erde entfernt zu seyn findet, im Betrachtung kommen lassen, und mit wahrscheinlichen Gründen zu erproben suchen, daß diese ursprünglich eine Kiesel Erde seyn, und durch Beytritt einer fremden sich zugesellter Sache, eben hart, und noch mehrers ausgeartet sey, als der Thon, und andere Erden ausgeartet sind.

Beispiele geben in zweifelhaften Umständen ein Licht, und wir haben dergleichen, welche beweisen, daß die Kiesel Erde sich Stufenweis der Erde nähert, und endlich gar in Kalkerde verändert wird. Und wenn man diese Beispiele in Gegenwärtigen uns nicht in solchen Stand setzen, wir durch Erfahrungen solches ungezweifelt darstellen könnten, son-

Denn nur allein durch gewisse Beobachtungen eine Wahrscheinlichkeit zeigen, so hat man doch, wie in vielen zweifelhaften Sachen geschieht, auch hier ein wenig Recht auf die Wahrscheinlichkeit einen Schluß zu machen, und in der Hypothese die Ausartung der Kieselersde, oder Verfehrung in Kalkerde anzunehmen.

Die Beyspiele sind folgende: 1. wenn die Kieselersde aus der Kieselfeuchtigkeit (liquor silicis) niedergeschlagen, und sodann auf der reineste gewaschen, und von dem Alkali gereinigt wird; so läßt sie sich in Sauern auflösen, und erhält eine Eigenschaft der Kalkerde; und wenn schon durch diese Behandlung nichts anders, als eine größere Theilung der Kieselersde geschehen seyn sollte, die das Alkali bewirkt, folglich dem Auflösungsmittel einen mehreren Zutritt oder Affinität verschafft hat; so ist eben diese Eigenschaft der Kalkerde gemein.

2. Die Kieselersde, welche die Pflanzen als ihren Bestandtheil in sich genommen haben, wenn sie wieder von solchen geschieden wird, nähert sich mehr der Kalkerde, als die aus der Kieselfeuchtigkeit geschiedene. Die in diesen organischen Körpern befindliche Salzichte, und blüchte Theile, welche sich mit der Kieselersde verbunden, haben die Veränderung verursacht.

3. So wie diese Erde in den Pflanzen sich ändert, so geschieht es noch mehr in den thierischen Körpern. Die Salzichte, und blüchten Theile, die Wärme, und organische Bewegung bringt die Kieselersde der Kalkerde sehr nahe, wie in den Beinen der Thieren zu sehen.

Und wenn man ztens betrachtet, daß die Everschaalen aller Vögeln, und unsere Landschaalen Thiere, als Schnecken, welche auch in Orten wohnen, wo von einer Kalkerde nichts zu finden, folglich kein Muthmaßung zu schöpfen, daß diese Thiere aus solcher ihre Schaalen, sondern von ihrer Nahrung, welches Vegetabilien sind, ausarbeiten, so muß ein Theil der in Vegetabilien stecender
Kie

Kieselerde in den Schnecken, und Vögeln zu einer wirklichen Kalk-
e werden, weil die Schale dieser Thiere eine solche ist.

Da aus diesen die Wahrscheinlichkeit einer Ausartung, und
nderung der Kieselerde ganz sicher erhellet; so kann man auch zu-
den, daß es auf noch mehrere Art, und ebenfalls in Mineralreiche
stehen könne. Und aus der großen Menge der in der Welt befind-
en Kalkgebürge muß man glauben, daß solches auch wirklich bey
wissen Umständen sich ereignet habe, und thierische Substanzen mit
Kieselerde vermischt, und innerst verbunden worden seyen.

Die Möglichkeit dieses großen Naturgeschäfts aber stelle ich
k folgender Maßen vor.

Bev der allgemeinen Ueberschwemmung des Erdbodens (*)
die damals noch meistens einzige Kieselerde durch Stürme,
gegenlaufende Flüße, Ebbe und Fluth in jenen Orten, wo jetzt
Kalkgebürge sind, über einen Haufen zusammengetrieben, und un-
solche, und mit solcher die getödtete Thiere und Menschen Milio-
n viele vermischt worden. Die mit thierischen Körpern vermischte
Kieselerde lag 150. Tage lang 15. Cubitos unter Wasser, (**) und
dieses von solcher Gemische Gerichen, ist es noch längers an-
gestanden. (***) Sodann aber wurde diese aus Kieselerde und
thierischen Substanzen bestehende Vermischung der Luft, und Son-
stige ausgesetzt, und also der Gährung, und Fäule unterworfen.
solchen vergiengen unbestimmende Jahre, bis das steinmachende
Besen die Berge verhärtet hat. Unter dieser Zeit, und verschiednen
mständen also hat durch Fäule, Gährung, Austretung aus den

D 2

und

(*) Genes. VII.

(**) Ibid.

(***) Ibid. VIII.

thierischen Körpern verschiedener Oele, Fetten, Salze u. in die Kiesel Erde um destomehr in Actio, und Reactio geschehen können, und müssen, als ebenfalls das mineralische Alkali, so genugsam in dem Mineralreiche vorrätzig, wie auch die thierische Salze selbst im Wasser aufgelöst, sich in die damals sehr zarte Kiesel Erde gesetzt, und eine dergleiche Theilung, wenn es nöthig gewesen, wie bei der Kiesel Feuchtigkeit zugeschehen pflegt, gemacht haben können, wodurch denen durch Fäule, und Gährung ausgetretenen thierischen Substanzen ein mehrer Zutritt bereitet worden, und folglich die Kiesel Erde mit denen verfaulten, und zerstörten diesen thierischen Substanzen in eine zusammengekehrte übergehen, und auf solche Art, wenn die Proportion der Kiesel Erde, und thierischen Substanzen übereinstimmt die Kalk Erde erzeugt hat werden müssen. In jenen Umständen aber wo die Verhältnisse der Kiesel Erde die der thierischen Substanzen übertraf, ist nur ein Kieselartige Kalk Erde, und sodann, da das schwächende Wesen hinzugekommen, eben dergleichen Stein gebildet worden. Von dergleichen Gattung Steinen können wir in unser Gegend aufweisen, in welchen zwar Seemuscheln gefunden werden, aber nach ihrer Eigenschaft nur halb kalkartige Steine sind. Wie dann die Statuen so an dem Frontispicio der Theatiner Kirche in München aufgestellt worden, von einem Halbkalk, und halbkieselartigen hiesigen Steinbruche verfertiget worden.

Ich wünschte zwar, daß ich diese Hypothese mit gewichtigen Erfahrungen erproben, und überzeugend darthun konnte, wie die mit der Kiesel Erde vermischte thierische Substanzen gewirkt, und diese große Aenderung verursacht haben. Ich kann aber keine andere Beweismittel beybringen, als daß theils durch die unterirdische, theils Sonnenhitze, theils aber auch durch die Wärme, so in der Gährung und Fäule der getödeten Thiere erregt worden, wie auch mit in Verbindung kommenden Salzen, eben das für sich gegangen sey, was in den

den Pflanzen und lebenden Thieren vorgeht, wenn die Kiesel-erde Stufenweise zu Kalkerde wird.

Dieser Hypothese scheint ebenfalls der Chursächsishe Herr Bergrath Pörner zugethan zu seyn, wenn er sagt (*) „wie, wenn die Kalkerde selbst aus der Kiesel-erde entstanden wäre? sollte man nicht durch Versuche auf Wege kommen, da man zeigen könnte, die Kalkerde seye entstanden, nachdem sich mit der Kiesel-erde eine mit brennbaren Wesen verbundene salinische Substanz vereinigt habe.“ Und sollte der Bemerkung des Herrn Peter Kalms zu trauen seyn, daß nämlich „in Engeland, auf den mit Kreide gedüngten Feldern, wo vorher kein einziger Feuerstein anzutreffen gewesen, dergleichen Steine in großer Menge, welche fast die ganze Oberfläche bedeckt erzeugt werden“, (**) auch des Herrn Hope Bericht in Wahrheit sich gründen, „daß in gelbschten Kalken, welcher lange Zeit mit Erde bedeckt gewesen, eine ziemliche Menge großer Feuersteine gefunden worden“, (***): so wäre es eine ausgemachte Probe, daß die Kalkerde eine veränderte Kiesel-erde sey, und solche, wenn das thierische mit der Kiesel-erde in Verbindung stehende Wesen wieder austritt, wieder in seinen vorigen Stand zurück geht, und Kiesel-erde wird.

So wie die Kiesel-erde in und nach der allgemeinen Fluth wegen fremder Beymischung in Kalkerde übergegangen, so hat sie auch nach verschiedener Mischung andere Gestalten erhalten. Dann wenn schon die Kiesel-erde nach der Schöpfung die weißeste einfachste wäre, hat sie jedoch neben dem, daß aus selber nach geschehenen frem-

U 3

den

(*) Anmerkung über H. Baume Abhandlung von Thon Seit 122.

(**) Nov. acta Physico-med. Academ. Cæsar. natur. Curios. Tom.

II. spend. Fol. 220. in Not. (c)

(***) ibid.

thierischen Körpern verschiedener Oele, Fetten, Salze etc. in die Kieselersde um destomehr in Actio, und Reactio geschehen können, und müssen, als ebenfalls das mineralische Alkali, so genugsam in dem Mineralreiche vorrätzig, wie auch die thierische Salze selbst im Wasser aufgelöst, sich in die damals sehr zarte Kieselersde gesetzt, und eine dergleiche Theilung, wenn es nöthig gewesen, wie bei der Kieselersdeuchtigkeit zugefchehen pflegt, gemacht haben können, wo durch denen durch Fäule, und Gährung ausgetretenen thierischen Substanzen ein mehrer Zutritt bereitet worden, und folglich die Kieselersde mit denen verfaulten, und zerstörten diesen thierischen Substanzen in eine zusammengekehrte übergehen, und auf solche Art, wenn die Proportion der Kieselersde, und thierischen Substanzen übereinstimmt die Kalkersde erzeugt hat werden müssen. In jenen Umständen aber wo die Verhältnisse der Kieselersde die der thierischen Substanzen übertraf, ist nur ein kieselartige Kalkersde, und sodann, da das steinmachende Wesen hinzugekommen, eben dergleichen Stein gebildet worden. Von dergleichen Gattung Steinen können wir in unser Gegend aufweisen, in welchen zwar Seemuscheln gefunden werden, aber nach ihrer Eigenschaft nur halb kalkartige Steine sind. Wie dann die Statuen so an dem Frontispicio der Theatinerkirche in München aufgestellt worden, von einen Halbkalk, und halbkieselartigen hiesigen Steinbruche verfertiget worden.

Ich wünschte zwar, daß ich diese Hypothese mit gewichtigen Erfahrungen erproben, und überzeugend darthun konnte, wie die mit der Kieselersde vermischte thierische Substanzen gewirkt, und diese große Aenderung verursacht haben. Ich kann aber keine andere Beweismittel beybringen, als daß theils durch die unterirrdische, theils Sonnenhitze, theils aber auch durch die Wärme, so in der Gährung und Fäule der getödeten Thiere erregt worden, wie auch mit in Verbindung kommenden Salzen, eben das für sich gegangen sey, was in
den

den Pflanzen und lebenden Thieren vorgeht, wenn die Kiesel-erde Sturmsweise zu Kalkerde wird.

Dieser Hypothese scheint ebenfalls der Ehursächsishe Herr Bergrath Hörner zugethan zu seyn, wenn er sagt (*) „wie, wenn die Kalkerde selbst aus der Kiesel-erde entstanden wäre? sollte man nicht durch Versuche auf Wege kommen, da man zeigen könnte, die Kalkerde seye entstanden, nachdem sich mit der Kiesel-erde eine mit brennbaren Wesen verbundene salinische Substanz vereinigt habe.“ Und sollte der Bemerkung des Herrn Peter Kalms zu folgen seyn, daß nämlich „in Engeland, auf den mit Kreide gebüngten Feldern, wo vorher kein einziger Feuerstein anzutreffen gewesen, dergleichen Steine in großer Menge, welche fast die ganze Oberfläche bedeckt erzeugt werden,“ (**) auch des Herrn Hope Bericht in Wahrheit sich gründen, „daß in gelöschten Kalk, welcher lange Zeit mit Erde bedeckt gewesen, eine ziemliche Menge großer Feuersteine gefunden worden,“ (***): so wäre es eine ausgemachte Probe, daß die Kalkerde eine veränderte Kiesel-erde sey, und welche, wenn das thierische mit der Kiesel-erde in Verbindung stehende Wesen wieder austritt, wieder in seinen vorigen Stand zurück geht, und Kiesel-erde wird.

So wie die Kiesel-erde in- und nach der allgemeinen Fluth wegen fremder Beymischung in Kalkerde übergegangen, so hat sie auch nach verschiedener Mischung andere Gestalten erhalten. Dann wenn schon die Kiesel-erde nach der Schöpfung die weißeste einfachste wäre, hat sie jedoch neben deme, daß aus selber nach geschehenen frem-

Y 3

den

(*) Anmerkung über H. Baume Abhandlung von Ehon Seit 122.

(**) Nov. acta Physico-med. Academ. Caesar. natur. Curios. Tom.

II. spend. Fol. 220. in Not. (c)

(***) ibid.

thierischen Körpern verschiedener Oele, Fetten, Salze etc. in die Kiesel Erde um destomehr in Actio, und Reactio geschehen können, und müssen, als ebenfalls das mineralische Alkali, so genugsam in dem Mineralreiche vorrätzig, wie auch die thierische Salze selbst im Wasser aufgelöst, sich in die damals sehr zarte Kiesel Erde gesetzt, und eine dergleiche Theilung, wenn es nöthig gewesen, wie bei der Kiesel Feuchtigkeit zugegehen pflegt, gemacht haben können, wo durch denen durch Fäule, und Gährung ausgetretenen thierischen Substanzen ein mehrer Zutritt bereitet worden, und folglich die Kiesel Erde mit denen verfaulten, und zerstörten diesen thierischen Substanzen in eine zusammengekehrte übergehen, und auf solche Art, wenn die Proportion der Kiesel Erde, und thierischen Substanzen übereinstimmen die Kalk Erde erzeugt hat werden müssen. In jenen Umständen aber wo die Verhältnisse der Kiesel Erde die der thierischen Substanzen übertraf, ist nur ein kieselartige Kalk Erde, und sodann, da das fleischmachende Wesen hinzugekommen, eben dergleichen Stein gebildet worden. Von dergleichen Gattung Steinen können wir in unser Obgenanntem aufweisen, in welchen zwar Seemuscheln gefunden werden, aber nach ihrer Eigenschaft nur halb kalkartige Steine sind. Wie dann die Statuen so an dem Frontispicio der Theatiner Kirche in München aufgestellt worden, von einem Halbkalk, und halbkieselartigen hiesigen Steinbruche verfertiget worden.

Ich wünschte zwar, daß ich diese Hypothese mit gewichtigen Erfahrungen erproben, und überzeugend darthun konnte, wie die mit der Kiesel Erde vermischte thierische Substanzen gewirkt, und diese große Veränderung verursacht haben. Ich kann aber keine andere Beweismittel beibringen, als daß theils durch die unterirdische, theils Sonnenhitze, theils aber auch durch die Wärme, so in der Gährung und Fäule der getödteten Thiere erregt worden, wie auch mit in Verbindung kommenden Salzen, eben das für sich gegangen sey, was in den

Abhandlung,

von den Kräften der Körper und der Elemente.

von

P. Benedict Arbuthnot,

Ordentlichen Mitglied zu St. Jacob in Regensburg.

財

Steine scheint mir folgender zu seyn. Bey dem Kalksteine hat die Kiesel-erde mit der thierischen Substanz sich verbunden, und bestehet also aus einer gemischten Erde. Bey dem Hornstein hingegen hat die Kiesel-erde mit der thierischen Substanz keine Verbindung eingehen können, sondern die thierische Bestandtheile sind z. B. aus dem Muschelthiere entwichen, und die Kiesel-erde ist statt diesen hineingetreten, und hat bey hinzukommenden steinmachenden Gaste eine wahre Versteinung gemacht; eben auf jene Art, wie es bey versteinerten Hölzern zu geschehen pflegt. Dieses aber hat geschehen können, da thierische Körper unter der Kiesel-erde zwar lagen, die Mittel aber, die zur Verbindung der Kiesel-erde mit der thierischen Substanz nothwendig waren, abgiengen, und die thierische Bestandtheile sodann von dem Wasser nach und nach z. B. aus dem Seemuschelthiere ab, und statt dessen die feine Kiesel-erde zu- und eingeführt wurde: und also das Seemuschelthier nur zum Model dienete, in welchem sich die Kiesel-erde geformet, und das hingekommene steinmachende Wesen die Gestalt des Hornsteines bewürket hat. Auf solche Art also sind bey dieser großen Revolution der Sündfluth die verschiedene Arten der Erden entstanden. Und so lagen diese vermischt, oder unvermischt in kleinen oder großen Haufen mit Wasser vermengt, als ein weicher Teige übereinander. Hier waren Berge von Kiesel-erde, und thierischen Körpern vermischt, welche in Kalk-erde überzugehen alle nothwendige Mittel eingeschlossen hatten. In anderen Orten reine Kiesel-erde allein mit Wasser vereinigt, und wieder an anderen Orten erste oder letzte Erde mit anderen Sachen vermengt.

Zwischen diesen von weicher Erde aufgehäuften Bergen oder Hügeln, war das Wasser eingesperrt, und hat entweder Kraft seiner eignen genugsamen Schwere, oder durch den Druck zukommender Flüsse durch die weiche Erde gebrochen, und sich zum Ausflusse einen Wege gebannt, zugleich aber auch auf beyden Seiten Erhöhungen

gen hinterlassen, welche nach und nach in Steine übergegangen, und uns in manchen Orten diese Steinmauren bewundern lassen. Vergleichen neben vielen Orten zwischen hier und Weidenburg, wodurch die Donau fließet, und ebenfalls an der Altmühl zu sehen sind.

Die abgerissnen Stücke, wenn die weiche Erde kalkartig war, sind durch das Wasser fortgeführt, und in dem beständigen Fortrollen und herumwälzen sind sie rundlicht geworden, oder haben, nachdem sie auf etwas hartes gestoßen, oder durch andere Zufälle etwas erlitten, eine andere Form erhalten. Diese kalkartige sogenannte Kiesel, giebt es in der Donau und vielen Flüssen, welche meines Wissens von abgerissnen Kalkbergen, da solche noch weich waren, abstammen, vielfältig; und in manchen Orten z. B. in München, brennt man aus solchen Kalk. Hat aber das Wasser durch Berge, oder Hügel, welche aus reiner weicher Kiesel Erde bestanden, gebrochen, oder vorbeiströmende Flüsse haben diese weiche Erde abgespüht, und mit sich fort geführt; so sind in dem Fortwälzen die wahre, auf eben diese Weise, wie die Kalkkiesel geformet worden. Keineswegs aber, und eben so wenig als Herr Hofmann (*) konnte ich mir begreiflich machen, wie die schon erhärtete Kiesel durch bloßes Fortwälzen eine rundlichte Gestalt sollten erhalten haben, welches aber auf erstbemeldte Art leichter zu fassen ist.

Diese wahre Kieselsteine sind glaublich anfänglich, nachdem sie nämlich erhärtet, durchsichtig gewesen, und haben so ausgesehen, wie die Krystalle und Quarze, die keiner Verwitterung oder andern Aenderung unterworfen sind, aussehen. Auf diesen Gedanken hat mich eine Krystalldruse gebracht, welche ich auf einem in hiesiger Gegend verlassenen Steinbruche gefunden. Diese Druse lag in freyer Luft auf einem Schieferstein festgemacht, und sah auswendig milch-

für.

(*) Nov. act. phys. med. academ. Caesar. Tom. II. apend. S. LVII. p. 226.

farbig und undurchsichtig aus, so wie die weisse und reine Kieselsteine aussehen. Da ich aber diese zerschlug, hatt sie von Innen noch den Krystallglanz; von außen also ist schon etwas gewichen, und die Krystalldruse steht in der Verwitterung: sollte diese noch längers der Luft ausgesetzt gewesen seyn, und es hätte sich eine organische Erde beigesellt, so würde solche mit der Zeit gelb geworden, und endlich gar gleich den Brückenthalischen Kieseln in Eisenerze übergegangen seyn.

Da also diese Krystalldruse die Farbe der weissen Kieseln angenommen, und die weisse Kieselsteine ebenfalls in ihren Kern Krystallisch aussehen, wie solches auch Herr Hofmann (*) in Noten zur Zentels kleinen mineralogischen Schriften anmerket, so glaube ich, daß ich wegen dieser Gleichheit, so diese Krystalldruse, und die weisse Kieselsteiner haben, nicht ungereimt geschlossen setze: daß gleichwie ein Krystall durchsichtig ist, und seinen Glanz und Durchsichtigkeit verlieren, und einem Kieselsteine in allen Ansehen gleich werden könne, auch die Kieselsteine durchsichtig gewesen, und erst mit der Zeit solches Aussehen bekommen haben, wie die Krystalldruse durch die anfangende Verwitterung erhalten hat.

Man könnte also auf die Frage: „wer des Kieselsteins Mutter wäre?“ (*) Herrn Zentel antworten: dieser Stein seye nichts anders, als ein aus reiner Kiesel Erde anfänglich mit Wasser angemacht gewesener Teig, welcher von fließenden Wasser in dem herumwelzen und fortrollen jene Gestalt annehmen müssen, die er wirklich hat. Durch das hinzukommende steinmachende Wesen aber die größte Härte, und durch diese den Glanz, und Durchsichtigkeit erhalten habe. Nachdem aber dieser Stein durch die Verwitterung angegriffen worden, so hat er gleich obenbeschriebener Krystalldruse den Glanz, und mit solchen die Durchsichtigkeit verlohren. Jene Steine, so noch mehr der Verwitterung unterworfen worden, haben

ben Risse bekommen, die des ausgetretenen bindenden Wesens sichtbare Merkmale sind, und zugleich anzeigen, weil sie noch weiß, daß sich noch nichts fremdartiges beygefüget habe. Wo hingegen die gelbe, braune, oder rostige neben den mehreren Rissen und Klüften, des mehr ausgetretenen bindenden, auch eines sich beygefügeten fremden Wesens gewisse Zeugenschaft geben.

Zum Beschluß muß ich noch anmerken, wie einigen Naturforscheren sehr sonderbar vorkommt, daß auf den höchsten Bergen Seemuschel gefunden werden. Um nun diese dunkle Sache zu erklären, sollen aus dem Grunde des Meers durch Erdbeben, und dergleichen Zufälle die Berge entstanden sein, folglich, weil in dem Meersgrund Muschel sind, werden diese mit solcher Gelegenheit dahin versetzt.

Daß neue Inseln, und auf solchen Berge entstanden, bezeugen zwar die Geschichte, daß aber alle Berge, welche Muschel haben so entstehen müssen, ist eine unglaubliche Sache; und wie ich vermuthet, hat man gar nicht Ursache zu solchen außerordentlichen Zufällen seine Zuflucht zu nehmen, dann entweder sind vor der Sündfluth Berge gewesen, und die Erden haben sich durch die Gewalt der Fluth übereinander häufen müssen, so haben mit den Erden auch Muschel sich vermischen, und als leichte Körper tod oder lebendig ober der angehäuften Erde liegen bleiben können, welche jetzt noch versteinert gesehen werden. Sollen aber die Berge schon vor der Sündfluth gewesen seyn, so haben bey dieser Ueberschwemmung durch Sturm u. s. w. auch auf die höchste Berge diese Seethiere hinauf geführt werden können, und so sind die Thode, die nicht wieder hinweg geschwemmt worden, liegen geblieben, die noch Lebende aber, haben sogar auf den Gipfeln der Berge um destomehr brüten können, als das Wasser etliche Monate 15 Cubitos über solche gestanden, welche aber, nachdem das Wasser gewichen, und die Erde getrocknet, sich versteinert haben.

Bewegung veranlaßt. Folglich in den größern Entfernungen die anziehende Kraft. Viertens: die Erde, und alle Planeten werden um die Sonne in einer krummen Linie bewegt; nun aber die Bewegung in einer krummen Linie von wenigern als zweien Seiten nicht entstehen; da nemlich eine nach der Tangente, die andere nach dem Mittelpunkte wirkt, also zieht die Sonne alle Planeten in so großen Entfernungen an sich; also wirkt die anziehende Kraft auch in sehr großen Entfernungen.

7.

7. Aus diesem erhellet, daß dies das allgemeine Gesetz der Natur sey; daß nemlich in den allerkleinsten Entfernungen die abstoßende Kraft, in den kleinern die Cohäsion, und in den größern auch sehr großen Entfernungen die allgemeine anziehende Kraft herrsche. Aber das Gesetz, nach welchem diese Kräfte wirken, für jede Entfernung zu bestimmen, ist eine Sache, welche größere Beschränkungen unterworfen ist.

8.

Wenn zwey Körper von verschiedenen Kräften bewegt werden, wird jener in gleicher Zeit einen größeren Raum zurücklegen, welcher von der größeren Kraft bewegt wird; folglich kann man die Kräfte durch die Räume, welche die Körper in gleicher Zeit zurücklegen,füglich ausdrücken

9.

Das Gesetz der allgemeinen anziehenden Kraft, welches sich in großen Entfernungen zeigt, ist dieses, daß sie nemlich in dem umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen wirkt. Denn aus den astronomischen Beobachtungen

tungen weiß man, daß sich alle Planeten um die Sonne beynähe in elliptischen krummen Linien bewegen; nun aber könnten die Planeten in solchen krummen Linien nicht bewegt werden, wenn die anziehende Kraft nicht nach diesem Gesetze wirkte. Denn es sey (Fig. 1.) $p q$ ein unendlich kleiner Bogen einer Ellipse: man ziehe zu dem Punkte p die Tangente $p m$: es solle $r q$ parallel seyn mit dem Radius vector $\int p$; diese Linie wird die Central = Kraft ausdrücken, weil sie den Raum anzeigt, um welchen der Körper von der Tangente gegen den Mittelpunkt der Bewegung in einer unendlich kleinen Zeit abweicht. Die Kräfte aber werden füglich durch die Räume angezeigt (N. 8.) man führe ferner von dem Punkte q auf den Radius vector $\int p$ die perpendicular Linie $q t$; endlich nenn man den Parameter die größere Achse P . Nun beweiset Newton Phil. nat. Prin. Math. Tom. I. Prop. XI. daß das Produkt aus dem Parameter und der Central Kraft gleich sey dem Quadrat der Perpendicular Linie, so die Central = Kraft anzeigt, die Ellipse schneidet, auf den Radius vector gezogen wird. Das ist: $P \times q t = q t^2$.

10.

$$\text{Da also } r q \times P = q t^2; \text{ ist } P = \frac{q t^2}{r q}$$

der Parameter ist eine beständige Größe,

$$\text{also ist } P = 1. \text{ daher } \frac{q t^2}{r q} = 1.$$

$$\text{also } q t^2 = r q$$

$$\text{daher } \frac{r q}{q t^2} = 1.$$

Denn ein Bruch kann einer Einheit nicht gleich seyn, wenn der Zähler dem Nenner nicht gleich ist.

11.

11.

Ferner beweiset cl. de la Caille Sect. 1. P. 1. Astron. ar. Cap. 2. de Panet. Art. 13. §. 156. erstlich: daß jede Central-Kraft, so veränderlich sie immer seyn mag, in einer kleinen Zeit für eine einförmig wachsende zu halten. Zweytens: beweist er part. 1. Mechan. §. 113. daß die Räume welche durch eine einförmig wachsende Bewegung zurück gelegt werden, in einem zusammen gesetzten Verhältnisse aus der bewegenden Kraft und dem Quadrate der Zeit stehen. Das ist wenn man Raum S nennet, die Kraft v , und die Zeit t , sey $S = v t^2$.

12.

Da man nun setzt, daß $p q$ (Fig. 1.) ein sehr kleiner Bogen sey, so wird (N. 11.) die Bewegung in $r q$ einförmig seyend, und folglich der zurück gelegte Raum in dem zusammen gesetzten Verhältnisse aus der Kraft und dem Quadrate der Zeit stehen. Das ist: $f = v t^2$.

$$\text{Da also } f = v t^2$$

$$\text{ist } v = \frac{f}{t^2}$$

$$\text{ist } f = r q$$

$$\text{ist } v = \frac{r q}{t^2}$$

in diese Linie den durch die Central-Kraft zurückgelegten Raum setzet.

13.

Ferner nach dem erste Gesetze des Keplers wenn sich ein Körper in einer krummen Linie um einen Punkt, gegen welchen

welchen er durch eine Kraft gezogen wird, bewege verhalten sich die zurückgelegten Räume oder Sektoren die Zeiten. Folglich kann man die Zeiten durch die dreie Flächen, so die Radii vectores, und der zurückgelegte Bog schließen, füglich ausdrücken. Da also die Fläche des Dreiecks $\int p \times q \times t$; oder (weil a eine beständige Größe ist) $\int p \times q \times t$; so ist die Zeit $t = \int p \times q \times t$.

14.

$$\begin{array}{l} \text{Weil demnach } t = \int p \times q \times t \\ \text{so ist } t^2 = \int p^2 \times q \times t^2 \end{array}$$

$$\text{(N. 12.) war } v = \frac{r \times q}{t^2}$$

$$\text{also ist auch } v = \frac{r \times q}{\int p^2 \times q \times t^2}$$

$$\text{(nach N. 10.) war } \frac{r \times q}{p \times t^2} = 1.$$

$$\text{also ist endlich } v = \frac{1}{\int p^2}.$$

das ist; die anziehende Kraft in den Planeten oder in den Entfernungen verhält sich umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen.

15.

Eben dieses Gesetz in dem umgekehrten Verhältniß Quadrate der Entfernungen dauert fort bis zu der Entfernung welcher die Cohäsive Kraft wirkt. Denn wenn man erweise daß sich bey dem Monde (als welcher in einer ziemlich großen

fernung von der Erde absteht,) und bey den Körpern, welche auf die Oberfläche der Erde fallen, das nemliche Gesetz der anziehenden Kraft zeigt; so ist es auch erwiesen, daß dieses Gesetz immer fort dauere bis auf jene Entfernung, in welcher die Cohäsive Kraft wirkt, nun zeigt man in der Physik, daß der Mond und die irdischen Körper nach dem nemlichen Gesetze gegen die Oberfläche der Erde drücken. Denn wenn man die Rechnung machet, so erfährt man, daß der Mond, (als welcher 60. Halbmesser der Erde von der Erde selbst entfernt ist) in einer Minute eben so weit gegen die Erde herabfällt, als die Körper, so gleich an der Oberfläche der Erde selbst, oder einen Halbmesser von dem Mittelpunkte der Erde entfernt sind, in einer Secunde herabfallen. Nun nach dem Gesetze in dem umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen muß sich eben dieses ereignen. Denn da die Fallhöhen sich wie die Quadrate der Zeiten verhalten; wenn ein Körper an der Oberfläche der Erde in einer Secunde 15. Fuß zurückleget, so wird er in einer Minute oder in einer Zeit von 60 Secunden $\frac{15 \times 60 \times 60}{1}$ Fuß = $\frac{v}{d^2}$ zurücklegen, wo v den zurückgelegten Raum erzeigt (indem N. 8. die Kräfte sind wie die Räume,) und d die Entfernung an dem Mittelpunkte der Erde in Halbmesser der Erde = 1. folglich auch $d^2 = 1$. Nun setze man, daß dieser Körper um 60 Halbmesser der Erde von der Erde selbst entfernt werde; alsdann, wenn sich die anziehende Kraft umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen verhält, wird der Körper in dieser angenehmen Entfernung in einer Zeit von 60. Secunden $\frac{15 \times 60 \times 60}{60 \times 60}$ Fuß = $\frac{V}{D^2}$ zurücklegen: wo $D = 60$; das ist er wird 15 Fuß zurücklegen. Nun verhält sich die Sache also bey dem Monde. Also erfahren wir das nemliche Gesetz der anziehenden Kraft bey dem Monde, und den Körpern, welche nahe an der Oberfläche der Erde sind. Folglich ist das Gesetz der an-

Die Erfahrung lehret uns *erstlich*; wenn die Körper über ihren natürlichen Stand zusammen gedrückt so widerstehen sie diesem Drucke, und zwar desto mehr, je gedrückt werden: und wenn sich die Theile gegen die S hinziehen können, so wird man wahrnehmen, daß sie sich mit icken Kraft, mit welcher sie zusammengedrückt werden, n stellen, also wenn man die Luft zusammen drückt, so wi dem Drucke, und so bald dieser aufhört, stellet sie sich wied vorigen Stande her. Folglich fängt die zurücktreibende S allerkleinsten Entfernungen von der Berührung an, und wa je näher die Elemente zusammen kommen. *Zweytens*. einen Theil des Körpers von dem andern absondern will dieser Theil an dem übrigen Körper also fest gleben, daß nur mit Gewalt absondern kann; also findet man in den etwas, so sie zusammen hangen machet; welches man die Kraft nennen kann; weil aber die zusammenhangenden T Drucke widerstehen, müssen die Entfernungen, in welchen sine Kraft wirkt, größer seyn als jener, in welchen die bendenden Kräfte wirken. Ferner wenn man einen Theil d von dem übrigen absonderet, wird er keinen Zusammenh haben; denn die Punkte, die sich vorher den Sinnen nach Kommen nicht mehr so zusammen, daß sie sich berühren; Diese Entfernungen so klein seyn, daß sich die Theile den Si berühren, daher man auch diese Entfernungen die *Kleine* kann. *Drittens*: will man einen Körper von der Erde so wird man ein Gewicht wahrnehmen: ja wenn man auch Raume einen Körper in die Höhe schnellet, wird er bald zu welches ja nicht geschehen könnte, wenn nicht die anziehen der Erde, jene Kraft, mit welcher der Körper in die Höhe worden, endlich überträte: denn ein Körper behält seine S nach der nemlichen Richtung, wenn keine Ursache da ist, i

18.

Wenn zwey unpolirte Metalle an einander gedrucket werden, so man kaum eine Cohäsion wahrnehmen: wenn aber diese Metalle wohl poliret werden, so wird man bemerken, daß sie an einander hangen bleiben, ja wenn diese Metalle vorher warm gemacht mit Fette geschmiert werden, so wird man wahrnehmen, daß sehr stark an einander kleben, so daß die Cohäsion den Druck, die Luft verursachen könnte, weit übertrifft. In dem ersten Falle können sich nur sehr wenige Punkte berühren; in dem zweyten mehr, in dem dritten die allermeisten Punkte berühren. Folglich ist die Cohäsion desto größer erstlich je mehrere Punkte berühren.

19.

Obschon die Entfernung, in welcher die Cohäsion wirkt, sehr klein ist, muß sie doch eine obschon sehr kleine Ausdehnung haben, und da in einem obschon sehr kleinen Raume mehrere Molekula, sehr kleine Theilchen der Materie seyn können, die Körper aber dichter sie sind, desto mehr dergleichen Theilchen in dem nemlichen Raume enthalten müssen; so müssen auch die Körper, je dichter sie sind, desto stärker an einander kleben. Deswegen, wenn ich ansehe, daß in den Oberflächen zweyer Körper gleich viele Punkte berührt werden, würde doch die Cohäsion in dem dichten Körper stärker seyn. Denn nicht nur die Theilchen, welche unmittelbar sich berühren scheinen, sondern auch die kleinen Theilchen, welche sehr unmittelbar folgen (indem sie noch in der Cohäsions Sphäre seyn) müssen etwas zu der Cohäsion selbst beytragen. Nun aber ist es mehr dergleichen Theilchen in dem dichten Körper; also muß auch die Dichtigkeit des Körpers zu der Cohäsion etwas tragen.

Dahero man diesen allgemeinen Schluß machen kann; daß nemlich die Cohäsion (wenn sonst alles übrige gleich ist) sich verhalte wie das Produkt aus der Berührungsgröße und der Dichtigkeit des Körpers.

Ich sage, wenn sonst alles übrige gleich ist, denn aus einer großen Menge genauer Beobachtungen so man in verschiedenen Körpern angestellt, weiß man, daß die Cohäsion sich nicht anders verhalte wie die Dichtigkeit des Körpers verhalte. Der berühmte Maschinenbroeck (S. 656. von der Cohäsion der Körper) bringt folgende Experimente vor, die er in verschiedenen Körpern von gleicher Oberfläche, welche er in gleichem Grade der Hitze mit Unschlitt über schmerte, angestellt hat.

	lb.
1. Die gläsernen Flächen kleben zusammen wie	130.
2. Die Flächen von Messing	150.
3. Von Kupfer	200.
4. Von Silber	125.
5. Von Stahl	225.
6. Von Eisen	300.
7. Von Zinn	100.
8. Von Bismuth	100.
9. Von Gold Markasit	150.
10. Von Blei	275.
11. Von weißem Marmor	225.
12. Von schwarzem Marmor	230.
13. Von Helsenbein	108.

Da nun Silber, Zinn und Bismuth schwerere Körper sind als Glas, auch Silber und Blei schwerer als Eisen, wenn sie die

Cohäsion allzeit wie die Dichtigkeit verhielte, so müßten diese Körper stärker zusammenhängen als die Gläser, wie auch das Silber und Blei stärker als Eisen.

Hernach nahm er Drähte von verschiedenen Metallen gleiches Querschnitts (§. 671.) welche durch folgende angehängte Gewichte auseinander gerissen wurde.

				lb.
1.	Kupferdrat durch ein Gewicht von	"	"	299 $\frac{1}{4}$.
2.	Von Messing	"	"	360.
3.	Von Gold	"	"	500.
4.	Von Eisen	"	"	400.
5.	Von Silber	"	"	370.
6.	Von Zinn	"	"	49 $\frac{1}{4}$.
7.	Von Blei	"	"	29 $\frac{1}{4}$.

Da doch das Blei viel dichter als alle andere Metalle ist als Gold, und nichts desto weniger ist seine Cohäsion die geringste, Silber und Kupfer sind dichtere Körper als das Eisen, die Cohäsion aber geringer. 20. Ferner wird der Mercurius von dem Gold, Silber und Zinn also angezogen, daß er nur durch das Feuer aus diesen Körpern kann getrennet werden, da er im Gegentheile an Kupfer und Eisen kaum merklich anklebet.

21.

Aus diesen und sehr vielen andern Beobachtungen erhellet; daß obgedachtes Gesetz der Cohäsion nemlich in dem zusammengesetzten Verhältnisse der Berührungsgröße und der Dichtigkeit nicht statt findet, wenn Körper von verschiedener Gattung mit einander verglichen werden; sondern nur in demjenigen Körpern, deren Theilchen

B b

mit

mit der nämlichen Cohäsions-Kraft versehen sind, wo dieses aber herrühre, werde ich nachher untersuchen.

22.

Das Gesetz der Cohäsion ist nicht in dem umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen. Denn setze man (Fig. 2) in dem Regel $a d e$, $a c = c e$; so ist $a e = 2 a c$, folglich $d e = 2 b c$; weil die Dreiecke $a c b$ und $a e d$ ähnlich sind. Da wegen $d e^2 = 4 b c^2$. Denn weil die Flächen cirkular sind, halten sie sich wie die Quadrate ihrer Durchmesser. Nun setzen wir, daß die cirkular Fläche $b n c$ mit einer andern Fläche $d m e$ in der nämlichen Entfernung von $b n c$ bleibt. Dann sage ich, wenn die Cohäsion umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen verhält, so würden beyde Flächen $b n c$ und $d m e$ gleich stark Cohärrin; denn man setze die Fläche $b n c = b c^2$; und $d m e = d e^2$; die Entfernung $a c = d$, und $a e = D$; so würde die Cohäsion der Fläche $b n c = \frac{b c^2}{d^2}$; und die Fläche $d m e = \frac{d e^2}{D^2}$ seyn. Nun ist $\frac{b c^2}{d^2} = \frac{1}{4}$; und $\frac{d e^2}{D^2} = \frac{1}{4}$; nun ist $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$; also würde die Cohäsion in beyden Flächen gleich seyn; welches wider die Erfahrung ist. Denn die Fläche $d m c$ hat gar keine merkliche Cohäsion, so bald sie nur ein wenig von dem Berührungspunkte absteht.

23.

Die Cohäsion wächst in einem umgekehrten Verhältnisse der kleineren Entfernungen, aber dieses Verhältniß muß in einer höhern als der zweyten Potenz seyn. Das erste erhellet aus dem; daß die Cohäsion desto stärker ist, je vollkommener sich die Theilchen den Sinnen nach berühren, desto schwächer entgegen, je weiter sie von einander entfernt werden. Das zweyte aber läßt sich aus die
seyn

Man beweisen: daß wenn sie nur in dem umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen wüchse, so würde sie in einer kleinen Entfernung von dem Berührungspunkte nicht viel schwächer seyn, als in der Berührung selbst, man erfährt aber das Gegentheil, denn so bald die Theilchen nur ein wenig von einander entfernt werden, so nimmt man schon gar keine Cohäsion wahr auch bei jenen Körpern, deren Theilchen sonst in der Berührung selbst sehr stark an einander hängen. Der berühmte Newton hat das Verhältniß dieser Kräfte aus der Brechung der Lichtstrahlen berechnet, und hat gefunden, daß die Cohäsion (wenn sich die Theilchen berühren) sich zu der allgemeinen Attraktion (welche die Ursache der Schwere ist) verhalte wie 10. 000''. 000. 000'. 000. 000. 1. welcher ungeheurer Unterschied von dem Gesetze der allgemeinen Attraktion gewißlich nicht herrühren kann.

24.

Uebrigens hat man auch durch die genauesten Beobachtungen das Gesetz der Cohäsion noch nicht bestimmen können, und wird auch schwerlich jemals bestimmt werden können.

Man könnte zwar sehr viele Hypothetische Gesetze die Sache zu erklären anführen, aber aus diesen das wahre seyn, kann man in der That nicht bestimmen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß die Elemente nicht alle nach dem nemlichen Gesetze wirken: es wird aber nachher von dieser Sache weitläufiger gehandelt werden. In dessen wenn man setzt, daß das Gesetz der allgemeinen Attraktion aus mehreren Gliedern bestehe, aus denen das eine sich umgekehrt verhalte wie die Quadrate der Entfernungen, das andere aber umgekehrt wie die vierte Potenz der Entfernung; wenn man die Entfernung D nennet, das erste Glied A , und das zweyte B ; so wird das Gesetz der Attraktion seyn $= \frac{A}{D^2} \times \frac{B}{D^4}$; nun wenn D sehr

ziehenden Kraft in den größern und sehr großen Entfernungen unveränderlich.

16.

Folglich hat Newton dieses Gesetz der anziehenden Kraft durch eine kubische Hyperbole füglich ausgedrückt, in welcher nemlich die Ordinate sich umgekehrt verhalten wie die Quadrate der Abscisse. Das ist (Fig. 2.) wenn man aus der Scheitel der Hyperbole die Linie $d e$ mit dem Asymptoto $a b$ parallel zieht, wird diese Potentia hyperbolæ genannt, welche in jeder Hyperbole unveränderlich ist. Wenn nun $b l^2 \times l k$ oder $b g^2 \times g f = d e^3$ ist; nennet man sie eine kubische Hyperbole. Wenn man also $b g$ oder die Abscisse $= x$, $g f$ oder die Ordinate $= y$ und $d e$ oder die Potentia hyperbolæ $= d$ setzt, so wird die Gleichung seyn $x^2 y = d^3$, und für jede andere Abscisse und Ordinate, wenn man sie mit größern Buchstaben ausdrückt $x^2 T = d^3$. Da nun d^3 unveränderlich ist, oder $= 1$, so wird $x^2 y = x^2 T$; folglich $T y = x^2$, x^2 ; oder $T. y = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x^2}$.

17.

In den kleinern Entfernungen, oder wenn sich die Theile den Sinnen nach berühren, erfährt man ein ganz anderes Gesetz der anziehenden Kraft, welches man die Kohäsion nennet. Dies unterscheidet sich von der allgemeinen Attraktion, theils weil sie stärker ist, theils weil sie sich nur in kleinern Entfernungen zeigt; das Gesetz aber nach welchem sie wirkt, wird man nicht so leicht bestimmen können.

lementen diese Kraft nicht nach dem nemlichen Gesetze wirke, wonach ich nachher handeln werde.

26.

Die Lufttheilchen scheinen einander in einer größeren Entfernung zurück zu treiben, als die Theilchen anderer Körper, auch bey diesen scheint die zurücktreibende Kraft langsamer zu wachsen, als bey den meisten andern Körpern. Und doch weis man, daß bey diesen die Reflexion in einer höheren Potenz, als in dem umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wachse, welches sich hieraus erweisen läßt. Der Donnerstrahl, wenn er in die untere Luft fällt, giebt einen höheren Thon, als in der oberen Luft. Dieses aber könnte nicht geschehen, wenn die elastische Kraft der Luft nicht mehr wüchse, als in dem Verhältnisse des Quadrats der Dichtigkeit. Denn aus der Theorie von dem Schalle weis man, daß die Verschiedenheit des höheren und tieferen Thones von der größeren, oder kleineren Zahl der Vibrationen, welche ein Körper in gleicher Zeit macht, abhänge; also zwar, daß der Thon desto höher ist, je mehrere, und desto tiefer, je weniger Vibrationen der Lufttheilchen in gleicher Zeit geschehen.

Ferner verhält sich die Zahl der Vibrationen, grad wie die Quadratwurzel der elastischen Kraft der Luft, und umgekehrt wie die Dichtigkeit; daß ist, wenn man die Zahl der Vibrationen $= n$. Die elastische Kraft $= v$, und die Dichtigkeit $= d$ sezet, so ist $n = \frac{\sqrt{v}}{d}$, und in einem andern Falle, wenn man die Formel mit größeren Buchstaben ausdrücket, ist $N = \frac{\sqrt{V}}{D}$; dahero damit $n = N$ sey, muß $\frac{\sqrt{v}}{d} = \frac{\sqrt{V}}{D}$ seyn; oder $\sqrt{v} : \sqrt{V} = d : D$. oder endlich $v : V = d^2 :$

folglich so lang die elastische Kraft in dem Verhältnisse des Qua-

drats der Dichtigkeit wächst, bleibt einerley Thon; wenn also der Thon höher wird, muß die elastische Kraft mehr als wie das Quadrat der Dichtigkeit wachsen; nun aber ist es bekannt, daß die elastische Kraft der unteren Luft, oder die Kraft, mit welcher die Lufttheilchen einander zurück treiben, dem Gewichte der obern Luft, die auf die untere drucket, gleich sey. Je größer nun das Gewicht der obern Luft ist, desto dichter wird auch die untere Luft, daß ist, die Theilchen der unteren Luft werden näher zusammen gehen; wenn nun die elastische Kraft nur wie die Quadrate der Entfernungen wächst, da die Lufttheilchen zusammen gehen, so würde der nemliche Thon bleiben; man erfährt aber das dieser höher wird, also muß die zurücktreibende Kraft der Luft mehr als wie die Quadrate der Dichtigkeit, oder was eines ist, mehr als in dem umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wachsen. In was aber für einem Verhältnisse die zurücktreibende Kraft der Lufttheilchen eigentlich wachse, wird man, glaube ich, nicht so leicht bestimmen können. Jener die Wassertheilchen hat man bisher durch keine Kraft, auch nicht merklich zusammen treiben können. Also muß gewiß die zurücktreibende Kraft der Wassertheilchen in einem weit höheren umgekehrten Verhältnisse der Entfernungen wachsen, als jene der Lufttheilchen. Dergleichen Versuche und Erfahrungen, die in verschiedenen Körpern so verschieden sind, berauben uns gänzlich der Hoffnung zu einem allgemeinen bestimmten Gesetze der zurücktreibenden Kraft zu gelangen.

27.

Weil man nun jede Größe durch Zahlen oder Linien ausdrücken kann, ist es vor sich klar, daß die Gesetze der anziehenden und zurücktreibenden Kräfte, in so weit als sie uns bekannt sind, durch Linien ausgedrückt werden können. Es sey demnach (Fig. 4.) AB die Entfernung zweyer Elemente, $Al, Ap, Ac, Ag, \text{etc.}$ oder die Abscissen der krummen Linie $n. o c i k t v$, werden die Entfernungen der

Punkte voneinander, und die Ordinaten nl, op, ds, hk &c.
 en die Größe der Kräfte, so einem jeden Punkte der Entfernung
 nimen, anzeigen, und zwar wenn die Ordinaten ds, ct, ro &c.
 der Linie die positiven Größen, oder die anziehenden Kräfte aus-
 sen, so werden die Ordinaten ober der Linie, nemlich op, nl die
 tiven Größen, oder die zurücktreibende Kräfte füglich anzeigen.
 soll Al, Ap, Ac die kleinsten; Ad, Ah die kleinere, $Ae,$
 AB die größeren Entfernungen anzeigen. Wenn nun $r v: iet$
 $e^2: Ar^2$; so wird sich die anziehende Kraft in den größern Ent-
 ngen umgekehrt verhalten, wie die Quadrate der Entfernungen;
 a ferner $hk: ds = Ad^4: Ah^4$; so würden sich die Cohäsions-
 re in den kleinern Entfernungen umgekehrt verhalten, wie die
 e Potenz der Entfernungen. Aber dieses letzte Verhältniß habe
 hier nicht als eine Wahrheit, sondern als ein Exempel angeführt,
 uns dieses Gesetz nicht bekannt ist. Da es aber wider die Ge-
 der Natur wäre, daß sich die größte Cohäsive auf einmal, und
 ittelbar in eine Repulsive veränderte, so werden die Cohäsions-
 re in einer gewissen Entfernung z. E. in Ad am stärksten seyn,
 ann aber werden sie nach dem Gesetze des Continui immer ab-
 uen von d bis c , wo die Gränzen der Cohäsion und Repulsion
 Von c aber werden die zurücktreibenden Kräfte bis auf die
 hematische Berührung selbst sehr geschwind wachsen, also zwar,
 die Kräfte in dem Punkte der mathematischen Berührung selbst
 dlich werden, denn die Seite der Hyperbole cn wird nie mit dem
 mptoto zusammen kommen; folglich ist die Ordinate nächst an
 Asymptoto unendlich. Was aber für ein Verhältniß die Or-
 ten zu den Abscissen in den kleinsten Entfernungen haben, hat
 keine Erfahrung, oder Versuche bisher bestimmt werden kön-
 Dieses allein darf man gewiß behaupten, daß sich die Ordi-
 a umgekehrt verhalten, mehr als die Quadrate der Abscissen oder
 ertungen, wie ich schon vorhin angemerkt habe; daher die zurück-
 treis

mit der nämlichen Cohäsions-Kraft versehen sind, wo dieses die herrühre, werde ich nachher untersuchen.

22.

Das Gesetz der Cohäsion ist nicht in dem umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen. Denn setze man (Fig. 2) in dem Regel $a d e$, $a c = c e$; so ist $a e = 2 a c$, folglich $d e^2 = 4 b c^2$; weil die Dreiecke $a c b$ und $a e d$ ähnlich sind. Denn wegen $d e^2 = 4 b c^2$. Denn weil die Flächen cirkular sind, so halten sie sich wie die Quadrate ihrer Durchmesser. Nun setze man, daß die cirkular Fläche $b n c$ mit einer andern Fläche $d m e$ in der nämlichen Entfernung von $b n c$ bleibt. Dann sage ich, wenn die Cohäsion umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen verhält, so würden beyde Flächen $b n c$ und $d m e$ gleich stark Cohärrin; denn man setze die Fläche $b n c = b c^2$; und $d m e = d e^2$; die Entfernung $a c = d$, und $a e = D$; so würde die Cohäsion der Fläche $b n c = \frac{b c^2}{d^2}$; und die Fläche $d m e = \frac{d e^2}{D^2}$ seyn. Nun ist $\frac{b c^2}{d^2} = \frac{1}{4}$; und $\frac{d e^2}{D^2} = \frac{1}{4}$; nun ist $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$; also würde die Cohäsion in beyden Flächen gleich seyn; welches wider die Erfahrung ist. Denn die Fläche $d m e$ hat gar keine merkliche Cohäsion, so bald sie nur ein wenig von dem Berührungspunkte absteht.

23.

Die Cohäsion wächst in einem umgekehrten Verhältnisse der kleineren Entfernungen, aber dieses Verhältniß muß in einer höhern als der zweyten Potenz seyn. Das erste erhellet aus dem; weil die Cohäsion desto stärker ist, je vollkommener sich die Theilchen den Sinnen nach berühren, desto schwächer entgegen, je weiter sie von einander entfernt werden. Das zweyte aber läßt sich aus die
 sem

repulsive Kraft sehr stark bis 0 wächst, wo sie am stärksten ist, liehrt sich nach und nach die vorige Geschwindigkeit, die es in cohäsiven Räume erhalten hat, und das Element wird in denselben Raum zurück geworfen, welchen es durch die erlangte Geschwindigkeit durchlaufen, und in den repulsiven Raum $s t u$ an andern Seite hineindringen wird; allwo es wieder seine Geschwindigkeit durch die repulsive Kraft verlieren muß, und wird also zurück geworfen, und auf solche Art wird das Element hin und her wandeln.

30.

Wenn ein Element durch eine erlangte Geschwindigkeit kommt, so, daß es den ganzen repulsiven Raum bis zu s durchläuft, wenn ich setze, daß die Geschwindigkeit, so es in u hatte, sey u und die Geschwindigkeit, die es haben wird, nachdem es den repulsiven Raum $u t s$ durchlofen, sey x , so wird $x^2 = c^2 - u t s$ seyn, und $x = \sqrt{c^2 - u t s}$ hier ist der Beweis.

31.

Wenn die Größe $z. E. A$ um einen unendlich kleinen wächst, so wird ihr Quadrat vermehrt, um das Product einer nemlichen Größe multipliciert, mit zwey dergleichen unendlich Theilchen. Dahero wenn man die Vermehrung des Quadrats nennet, so ist $q = a \times \frac{2}{\infty} = 2 a \times \frac{1}{\infty} = \frac{2 a}{\infty}$; denn es ist das Quadrat der Größe $a = a^2$, und der Größe $a + \frac{1}{\infty} = a^2 + \frac{2 a}{\infty}$ folglich ist der Unterschied zwischen den zweyen Quadraten $a^2 + \frac{1}{\infty^2} - a^2 = \frac{2 a}{\infty} + \frac{1}{\infty^2}$; nun $\frac{1}{\infty^2}$ kann einen Infinitesimaltheil

den Ordnung weder vermehren noch vermindern, folglich kann es gelassen werden; folglich ist $q = \frac{a^2}{\infty}$, und wenn man $\frac{1}{\infty} d$ nennt, so $q = 2 a d$.

32.

Die grade Linie AB (Fig. 6.) soll den Raum vorstellen, den ein beweglicher Körper durchläuft nach der Richtung AB , und seiner Bewegung durch was immer für veränderliche Kräfte, welche nach der nemlichen Richtung wirken, angetrieben wird, die Orten $m o$, $n p$ &c. sollten die verschiedenen Größen dieser Kräfte seyn; alsdenn wird der Raum ACB die Vermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit, welche der Körper in dem Raume AB erlangt, ausdrücken; denn man nehme einen unendlich kleinen Theil des Raums $z. E. m, n$, so wird $m o p$ die Vermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit von m bis n anzeigen. Es sey also die Geschwindigkeit, welche der bewegliche Körper in m hatte $= c$, die Vermehrung dieser Geschwindigkeit, welche der Körper durch den unendlich kleinen Raum $m n$ erlangt hat, sey $= d$, und die Vermehrung Quadrats der Geschwindigkeit in den nemlichen Raume $m n$ sey q , so ist (n. pract.) $q = 2 c d$; nun aber ist $z c d = m o p n$, denn die Geschwindigkeit vermehrt sich je nachdem die Zeit und die Bewegende Kraft größer wird, folglich verhält sich die Geschwindigkeit wie das Product aus der Zeit und der bewegenden Kraft; deswegen wenn man die Zeit t nennet, ist die Vermehrung der Geschwindigkeit, oder $d = t \times n p$. ferner in einer unendlich kleinen Zeit ist die Bewegung einformig, und in einer einformigen Bewegung verhält sich Zeit grad wie der Raum, und umgekehrt wie die Geschwindigkeit; also ist $t = \frac{m n}{c}$ wenn man nun diesen Ausdruck in der vorigen Gleichung setzt, so wird seyn:

$$q = 2$$

$$d =$$

$$d = \frac{m n \times n p}{c}.$$

folglich $cd = m n \times n p$.

nun ist $m n \times n p = m n r p$,

und $m n r p = m n o p$, indem $o p r = \frac{1}{\infty^2}$, daher es ausgesagt werden kann. Also ist $dc = m n o p$.

Da aber sich das Gedoppelte wie das Einfache verhält, so ist $x d c = m n o p$.

33.

Dahero wenn man den ganzen Raum ABC in unendlich kleine Theile z. E. $a o m$, $m n o p$, $n p i h$, $i h l b$ abtheilet, so ist die Vermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit in den Räumen $a m = a o m$, in $m n = m o p n$, in $n i = n p i h$, und a in $i B = i h c B$ seyn, folglich wird sich die Vermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit durch den ganzen Raum AB verhalten wie die Fläche $A C B$.

34.

Derowegen wenn man die Geschwindigkeit, welche der Körper in a bekommt, c nennt, und wenn man jene, welche der Körper in B hat, nachdem er z. E. den attractiven Raum ACB durchloffen x setzt; so ist $x^2 = c^2 + A C B$, und $x = \sqrt{c^2 + A C B}$. Wenn man aber setzt, daß der Raum ACB repulsiv sey, so ist in diesem Räume die Geschwindigkeit des Körpers vermindert, folglich muß man ihn von c^2 abziehen, und dann wird seyn $x^2 = c^2 - A C B$ und $x = \sqrt{c^2 - A C B}$ w. z. e. w.

35.

Nun wollen wir die Boscovichsche Curva wieder be-

1; gesetzt, es komme ein Körper in u mit der Geschwindigkeit c , kraft dieser Geschwindigkeit bis auf den letzten Repulsiven Raum fortbeweget werde; nun ist die Frage, welche die Geschwindigkeit x dem Punkte i seyn werde. Nach dem vorhergehenden Lehrsatz sey $x^2 = c^2 - uts + spq - pnm + mli$, und $x = \sqrt{c^2 - uts + spq - pnm + mli}$ und wenn man setzt $uts = ipq$, $pnm = mli$, so ist $x = \sqrt{c^2} = c$, das ist, die nemliche Geschwindigkeit wird in i seyn, welche in u war.

36.

Wenn man setzt, daß das Element a , welches wir bisher unbeweglich betrachtet haben, beweglich sey, muß man die nemliche Curva für das Element a setzen, welche für das Element B angesetzt ist, nur mit diesem Unterschiede, daß ihre Richtungen entgegenge-
setzt seyn müssen. Alsdann werden diese zwey Elemente einander weder anziehen, oder zurück treiben, je nachdem sie in attractiven, oder repulsiven Räumen stehen; oder sie werden hin und her schwanken, und einander bald anziehen, bald zurück treiben. Aber mit was immer für einer bestimmten Geschwindigkeit sie gegen einander bewegt werden, werden sie doch nie zu der mathematischen Berührung kommen können.

37.

Es soll ein Theilchen eines Körpers aus zweyen Elementen bestehen z. E. A und B , welche auf den Punkt C wirken (Fig. 7.) in der Are AB (Fig. 5.) zwey Abscissen, welche AC , und BC gleichen, man bemerke die Ordinaten, welche mit diesen Abscissen überein kommen, z. E. ce und cf ; erstlich sind diese beyde Ordinaten entweder in einem attractiven Bogen, oder zweytens sie sind in einem Repulsiven, oder drittens die eine z. E. ce ist in

C c 3

einem

einem attractiven, und die andere cf in einem Repulsiven Bogen. Viertens: oder cf ist in einem attractiven, und ce in einem repulsiven Bogen.

Im ersten Falle, wird der Punkt A den Punkt c anziehen mit der Kraft ce , und der Punkt B wird ihn anziehen mit der Kraft cf , folglich werden ihn beyde mit einer zusammengesetzten Kraft cl anziehen.

Im zweyten Falle wird der Punkt A den Punkt c zurücktreiben, mit der Kraft ch , und der Punkt B wird ihn ebenfalls zurücktreiben mit der Kraft ck , folglich werden beyde zugleich den Punkt C zurück treiben mit einer zusammen gesetzten Kraft, welche gleich ci seyn wird.

Im dritten Falle wird der Punkt A den Punkt c an sich ziehen mit der Kraft ce , und der Punkt B wird ihn zurück stoßen mit der Kraft ck , folglich werden sie ihn gegen die Seite treiben mit einer zusammengesetzten Kraft, welche gleich cl seyn wird.

Endlich im vierten Falle wird der Punkt B den Punkt c an sich ziehen mit der Kraft cf , und der Punkt a wird ihn zurücktreiben mit der Kraft ch , und folglich werden ihn beyde mit der zusammengesetzten Kraft cg gegen die Seite hinaus drücken.

38.

Dahero nach dieser Meynung entsteht der ganze Unterschied aus der verschiedenen Zusammensetzung jener Kräfte, welche sich in den kleinern Entfernungen zeigen. Denn in den kleinsten wirkt die zurücktreibende Kraft allein, und in den größern Entfernungen wirkt allein die anziehende Kraft im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernungen.

Diese

Diese sind also die merkwürdigsten Grundsätze jenes Systems, welches der gelehrte Boskovich mit großer Spitzfindigkeit gedacht hat. Nun aber wollen wir untersuchen, ob diese Curven auf einen zureichenden Grunde ruhe, und ob durch selbe die Eigenschaften der Körper, und die Erfahrungen genugsam erklärt werden können.

39.

Ich behaupte demnach, daß man eine solche Abweichung Kräfte in den kleinern Entfernungen nicht zulassen könne. Denn wenn man dem, daß es wider das Gesetz der Kräfte in den übrigen Entfernungen ist, würde es die Curva zu viel zusammengesetzt machen, zwar ohne zureichenden Grunde. Damit aber dieses desto klärer werde, so vergleiche man die fünfte Figur mit der achten. Da die Seite der Hyperbole Bz (Fig. 5.) bis auf x in dem umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernungen stets fortgeht, so müßte es von diesem Gesetze nicht abweichen, wenn eine neue Kraft zu dem dazu käme, welche eine Veränderung hervorbrächte. Also in den kleinern Entfernungen, derer Anfang wir in Φ setzen, könnte sich die angefangene Gesetz von x bis w nicht ändern, wenn nicht in w die Cohäsion am stärksten ist, eine zurücktreibende Kraft angehe, welche auf der andern Seite der Axe in einen höhern Verhältnisse wüchse, als das Gesetz der Cohäsion von Φ bis λ , und welche demnach die Cohäsion z. Er. in u gänzlich tilgte. Und also müßten die Kräfte auf einander wechseltweise folgen, so daß die nachfolgenden immer in einem höhern Verhältnisse als die vorhergehenden wüchsen, sonst könnten diese von jenen nie gänzlich getilget werden, wie (Fig. 8.) zu ersehen ist. Also

Erstlich wurde das Gesetz der allgemeinen Attraktion in umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen von einer

einer unbestimmten Entfernung angefangen, bis h verbleiben (woher Punkt h mit dem Punkte Φ (Fig. 5.) übereinkommt. Wenn aber würden andere Kräfte dazu kommen, deren Wirkung einem höhern umgekehrten Verhältnisse als der Quadrate der Entfernungen wäre; daher entstünde ein anders Gesetz, z. Ex. in dem umgekehrten Verhältnisse der dritten Potenz der Entfernungen.

Zweytens in g (Fig. 8.) oder x (Fig. 5.) würden die zurücktreibenden Kräfte anfangen, welche in einem noch höhern Verhältnisse wüchsen als die vorigen anziehenden Kräfte z. Ex. in dem umgekehrten Verhältnisse der vierten Potenz der Entfernungen, und diese würden in u (Fig. 5.) die anziehenden Kräfte tilgen.

Drittens in f (Fig. 8.) oder v (Fig. 5.) würden andere anziehende Kräfte zu wirken anfangen, welche in einem noch höhern Verhältnisse wüchsen als die vorhergehenden zurücktreibende Kräfte z. Ex. in dem umgekehrten Verhältnisse der fünften Potenz der Entfernungen.

Viertens in e (Fig. 8.) oder r (Fig. 5.) kommen andere zurücktreibende Kräfte dazu, welche in dem umgekehrten Verhältnisse der sechsten Potenz der Entfernungen zunehmen.

Fünftens in d (Fig. 8.) oder o (Fig. 5.) fangen andere anziehende Kräfte an, welche z. Ex. in dem umgekehrten Verhältnisse der siebenten Potenz der Entfernungen zunehmen: und

Sechstens endlich in c (Fig. 8.) oder k (Fig. 5.) kommen andere zurücktreibende Kräfte, z. Ex. in dem umgekehrten Verhältnisse der achten Potenz der Entfernungen zunehmen, und weil sie sehr geschwind wüchsen, würden sie die vorhergehenden anziehende Kräfte bald zernichten, z. Ex. in i (Fig. 5.) und diese wirkt bis auf die mathematische Berührung in das unendliche fortwach

40.

Sobiel, als ich einsehe, läßt sich die Boskovichische Curva auf keine andere Art genugsam erklären, aus diesen aber erhellt genugsam, wie diese Curva zusammengesetzt werde in den kleinern Entfernungen, und wie weit sie von dem steten Gesetze der übrigen Entfernungen unterschieden sey.

41.

Dreyerley Kräfte sind, welche die gegenwärtige Ordnung der Dinge erfordert: erstlich die allgemeine anziehende Kraft, oder die Schwere. Denn wenn die Planeten nicht gegen die Sonne drückten, würden sie alle nach der Tangente in unendliche Räume ohne Gesetze abgehen. Dahero damit sie sich um die Sonne nach einem unveränderlichen Gesetze wälzten, war eine solche Kraft nöthig. Zweitens die Cohäsion der Theile in den kleinern Entfernungen; denn wenn diese nicht wären, so würden keine festen Körper seyn, sondern alle würden flüßig seyn. Derowegen da die ewige Weisheit hat wollen, daß auch feste Körper seyn sollten, hat sie ein anders Gesetz, als jenes der allgemeinen Attraktion in der Natur erschaffen müssen. Drittens die zurücktreibende Kraft in den kleinsten Entfernungen, denn wenn keine zurücktreibende Kräfte wären, so mußten die Theilchen der Materie einander mathematisch berühren, und die ganze Erdkugel würde nichts mehr als den Raum eines einzigen Punktes erfüllen. Folglich damit die Körper ausgedehnt würden, und einen bestimmten Raum erfüllen, war es nothwendig, daß der Urheber der Natur den Elementen eine zurücktreibende Kraft in den kleinsten Entfernungen einflößte. Dahero uns die Natur selbst diese drey Kräfte in verschiedenen Entfernungen anzeigt; und mehr als diese erfordert die Natur nicht.

$$d = \frac{m n \times n p}{c}.$$

$$\text{folglich } c d = m n \times n p.$$

$$\text{nun ist } m n \times n p = m n r p,$$

und $m n r p = m n o p$, indem $o p r = \frac{1}{\infty}$, daher es ausgelassen werden kann. Also ist $d c = m n o p$.

Da aber sich das Gedoppelte wie das Einfache verhält, so ist auch $x d c = m n o p$.

33.

Dahero wenn man den ganzen Raum $A B C$ in unendlich kleine Theile z. E. $a o m$, $m n o p$, $n p i h$, $i h l b$ abtheilet, so wird die Vermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit in den Räumen $a m = a o m$, in $m n = m o p n$, in $n i = n p i h$, und endlich in $i B = i h c B$ seyn, folglich wird sich die Vermehrung des Quadrats der Geschwindigkeit durch den ganzen Raum $A B$ verhalten, als die Fläche $A C B$.

34.

Derowegen wenn man die Geschwindigkeit, welche der Körper hat, da er in a kömmt, c nennt, und wenn man jene, welche der Körper in B hat, nachdem er z. E. den attractiven Raum $A C B$ durchlossen x setzt; so ist $x^2 = c^2 + A C B$, und $x = \sqrt{c^2 + A C B}$. Wenn man aber setzt, daß der Raum $A C B$ repulsiv sey, so wird in diesem Raume die Geschwindigkeit des Körpers vermindert, folglich muß man ihn von c^2 abziehen, und dann wird seyn $x^2 = c^2 - A C B$ und $x = \sqrt{c^2 - A C B}$ w. z. e. w.

35.

Nun wollen wir die Boscovichsche Curva wieder betrachten;

den Theilchen (*minimæ moleculæ*) der Körper von dem Ur-
 : der Natur selbst aus solchen Kräften zusammengesetzt seyen, daß
 : auf keine uns bewusste Art geändert werden können, und eben
 : müssen die Boßkovichianer selbst annehmen. Denn sonst nach
 : Meinung, wenn die kleinsten Theilchen 3. E. der Luft geändert
 : en, so würden sich auch die Kräfte und die Entfernungen der
 : ente, aus welchen diese Theilchen entstehen, ändern; also, daß
 : welche 3. E. in dem repulsiven Räumen waren, in die attracti-
 : tomen, und folglich die Luft zu Wasser, Gold, Quecksilber,
 : er 2c. oder zu was immer für einen andern Körper werden könnte,
 : es ja wider die Erfahrung ist.

44.

Dieses also vorausgesetzt, wird 3. E. das Eisen durch das
 : fer also aufgelöst: die kleinsten Theilchen des Wassers, so dem
 : anleben, dringen in die kleinsten Oefnungen dieses Körpers;
 : ob ein Wassertheilchen zwischen zweyen Eisentheilchen hineindrin-
 : so stößt es diese durch seine Elastische Kraft voneinander ab,
 : treibt sie bis zu den Gränzen der Cohäsion, oder wirft sie völli-
 : dem Cohäsionsräume hinaus. Auf gleiche Art wird das Gold
 : Aqua Regis aufgelöst. Ferner wird das Wasser durch die
 : in Elastische Dünste auf folgende Art getrieben, die Feuertheil-
 : , welche die Natur mit einem sehr großen repulsiven Räume ver-
 : hat, dringen in die Oefnungen des Wasserkörpers hinein, und
 : en die Wassertheilchen von einander ab, treiben sie erstlich zu den
 : nzen der Cohäsion, und endlich wenn sie in einer größern Menge
 : n dringen, werfen sie dieselbe sammt den Lufttheilchen, welche
 : Wässerigen stark anhängen, über die Gränzen der Cohäsion hin-
 : und reißen sie zugleich mit sich in die kältere Luft. Derowegen
 : man sich nicht verwunderen, daß dergleichen Dünste, wenn sie
 : n eisernes Geschloß wohl eingeschlossen werden endlich das Ge-
 : schloß

einem attractiven, und die andere cf in einem Repulsiven Bogen. Viertens: oder cf ist in einem attractiven, und ce in einem repulsiven Bogen.

Im ersten Falle, wird der Punkt A den Punkt c anziehen mit der Kraft ce , und der Punkt B wird ihn anziehen mit der Kraft cf , folglich werden ihn beyde mit einer zusammengesetzten Kraft cd anziehen.

Im zweyten Falle wird der Punkt A den Punkt c zurücktreiben, mit der Kraft ch , und der Punkt B wird ihn ebenfalls zurücktreiben mit der Kraft cf , folglich werden beyde zugleich den Punkt C zurück treiben mit einer zusammen gesetzten Kraft, welche gleich ci seyn wird.

Im dritten Falle wird der Punkt A den Punkt c an sich ziehen mit der Kraft ce , und der Punkt B wird ihn zurück stoßen mit der Kraft ch , folglich werden sie ihn gegen die Seite treiben mit einer zusammengesetzten Kraft, welche gleich cl seyn wird.

Endlich im vierten Falle wird der Punkt B den Punkt c an sich ziehen mit der Kraft cf , und der Punkt a wird ihn zurücktreiben mit der Kraft ch , und folglich werden ihn beyde mit der zusammengesetzten Kraft cg gegen die Seite hinaus drücken.

38.

Dahero nach dieser Meynung entsteht der ganze Unterschied aus der verschiedenen Zusammensetzung jener Kräfte, welche sich in den kleinern Entfernungen zeigen. Denn in den kleinsten wirkt die zurücktreibende Kraft allein, und in den größern Entfernungen wirkt allein die anziehende Kraft im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernungen.

Diese

per auflösen können; und diese ist wahrscheinlich die Ursache, warum gewisse Körper z. E. das Gold weder durch das gemeine Wasser, noch durch das Scheidwasser aufgelöst wird, da es sich doch durch Aqua Regis auflösen läßt, nemlich die verschiedenen Kräfte der kleinsten Theilchen bringen dergleichen verschiedene Wirkungen vor, und diese Verschiedenheit wird noch vermehret, da aus den verschiedenen Kräften, zusammengesetzte Kräfte entstehen.

46.

Der gelehrte Boskovich selbst läßt zwar in den kleinsten Theilchen oder Molekula verschiedene Kräfte zu, aber er behauptet, daß diese Verschiedenheit aus Elementen entstehe, welche mit gleichen, und ähnlichen Kräften versehen sind, je nachdem die Elemente, aus welchen diese Theilchen entstehen, in repulsiven, oder attractiven Räumen sich befinden, aus derer Zusammensetzung die größte Verschiedenheit der Kräfte entstehen kann. Aber wenn man in den Elementen in Rücksicht auf die kleinern Entfernungen (denn hier ist die größte Beschwerniß) dergleichen Abwechslung der Kräfte zuläßt; so muß man die nemlichen Abwechslungen der Kräfte in Rücksicht auf die kleinern Entfernungen auch in den Molekula selbst zulassen, welche der gelehrte Author selbst auch zuläßt; nun aber eben dieses ist, welches die Erfahrung läugnet.

47.

Man drücke nach und nach die Luft zusamm in $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}$ des jenigen Raumes, in welchen sie zuvor war: nun sage ich, weil in den kleinern Entfernungen so viele Abwechslungen der Kräfte sind (wie aus der Boskovichischen Curva Fig. 5. zu sehen ist) da dieser Druck dauret, müßten die Lufttheilchen, welche stets ihre Entfernungen von einander ändern, in die stärksten

attractiven Räume kommen, in welchen folglich alle zurücktreibende Kraft aufhören würde, aber die Erfahrung lehrt uns das Widerspiel, oder man kehre diesen Versuch um, und lege eine geschlossene Blase worinne sich nur wenig Luft befindet, unter dem gläsernen Recipienten man ziehe die Luft heraus, so wird sich diese Luft in der Blase ausdehnen, daß sie wenigstens einen hundertmal größern Raum vorher anfülle; in diesem Falle müßten ja die Lufttheilchen einzeln in einem starken Cohäsiven Raum kommen, welcher die weitere Ausdehnung verhindern würde; und doch lehret die Erfahrung uns abwechselnd das Widerspiel. Zweytens, da die Metalle in Fluß gebracht werden, erfüllen sie einen großen Raum, und die Theilchen werden auseinander gedehnet; folglich müßten sie zuweilen aus attractiven in repulsive Räume getrieben werden, in welchen sie ganz andere Kräfte haben würden, als zu vor, folglich da die Feuertheilchen wieder angehen, könnten sie nicht mehr den nemlichen Körper statthalten, da doch die Erfahrung das Widerspiel zeigt. Drittens das Wasser ist ein solcher Körper, welcher durch keine Kraft merklich zusammen gedrückt werden kann; folglich kann man mit Vernunft seine Theilchen nahe an den Gränzen des letzten repulsiven Raum setzen, allwo die zurücktreibende Kraft sehr schnell wächst z. E. nahe bey i (Fig. 1). Nun da dieser Körper durch das Feuer in Elastische Dünste aufgelöst wird, müssen die in der Luft befindlichen Dunsttheilchen, da sie wider zusammengehen, und Regen Tropfen zu statthalten anfangen, durch so viele attractive und repulsive Räume gehen. Es ist aber nicht wahrscheinlich, welche mit so verschiedener Geschwindigkeit zusammen kommen müssen, alle andere Räume durchlaufen, und stets den nemlichen Raum erreichen, und den nemlichen Körper statthalten, welcher wir doch stets erfahren. Auf gleiche Art muß man auch von den Meteorialischen Dünsten schließen. Mehr dergleichen Beispiele anzuführen, vermeine ich unnöthig zu seyn. Dieses allein setze ich noch hinzu; wenn der verschiedene Stand der sonst von Natur gleichen Elemente

nte einen so großen Unterschied der Theilchen hervor bringen kann, muß auch der nemliche Unterschied in den Körpern erfolgen, je dem die ob schon sonst ähnlichen Theilchen in verschiedene Räume kommen, folglich so oft die Körper aufgelöset, so oft die Metalle in gebracht, so oft Wasser und Quecksilber in Elastische Dünste leben würden, müßten aus den aufgelöseten Theilchen, wenn sie her zusamm kommen, ganz andere Körper entstehen, denn es ist nicht wahrscheinlich, daß nach der Boskovichischen Curva alle Theilchen in eben die nemlichen Räume kommen, da in den klein- sten Entfernungen ein solcher Unterschied und Abwechslung der Räume ist.

48.

Nun aber, wenn man dergleichen Abwechslungen der Kräfte in Theilchen, in Rücksicht auf die kleinern Entfernungen, nicht annehmen kann, so werden sie auch in den Elementen ohne zureichenden Grunde behauptet; wenn man aber nicht setzt, daß sie in den Elementen sind, so kann man die Verschiedenheit der Theilchen oder Moleculn (wenn man setzt, daß alle Elemente gleich, und ähnlich sind) nicht erklären; folglich da man diese Abwechslungen der Kräfte in den Elementen nicht zulassen kann, so muß man den Schluß machen, daß sie nicht alle gleich seyen, sondern daß man verschiedene Kräfte der Körper in verschiedenen Elementen zulassen müsse. Da es sehr wahrscheinlich ist, daß die Verschiedenheit der Theilchen in der Zusammenkunft der in ihrer Natur verschiedene Elemente entsteht, folglich kann man auch die Kräfte aller und jeder Elemente nicht durch die nemliche Curva vorstellen, indem weder das Gesetz der anziehenden Kraft in den kleinsten, noch das Gesetz der Cohäsion in den kleinern Entfernungen das nemliche in Rücksicht auf alle Elemente seyn kann.

42.

Aber der gelehrte Boscovich, und die seiner Meynung folgen, behaupten, daß die Auflösung der Körper besonders des Wassers und Mercurius in elastische Dünste ohne dergleichen Abweichungen der anziehenden und zurücktreibenden Kräfte in kleinern Entfernungen nicht geschehen könne. Dieses will ich gerne zugeben, wenn man zum voraus als einen gewissen Grund setzt, daß alle und jede Elemente, mit gleichen Kräften versehen seyen, und daß sie alle nach dem nemlichen Gesetze wirken. Aber hat wohl der höchste Schöpfer, den sein eigener uneingeschränkter Wille ein reichender Grund ist, lauter Elemente von einer Natur, gleichen Kräften erschaffen müssen? war es denn nicht in seiner Macht auch Elemente von verschiedenen Kräften aus ihrem Nichts hervor zu bringen? oder sollte vielleicht die Gleichheit der Elemente seine Größe und Macht mehr beweisen? warum hat er denn nicht lauter Geister von gleichen Naturgaben erschaffen? kann man wohl sagen, daß die Geister der Thiere und Menschen von einer Natur seyen, oder daß sie mit gleicher Kenntniß begabet seyen? warum sollten denn alle Elemente gleiche Natur einerley Kräfte haben. Also zeigt die Aehnlichkeit der erschaffenen Dinge selbst, daß die Verschiedenheit der Elemente nicht nur der Einförmigkeit der Natur nicht zuwider seyn, sondern vielmehr der Größe und Macht des allerweisesten Schöpfers offenbare.

43.

Wenn man demnach setzt, daß die Elemente in den kleinern und kleinsten Entfernungen mit verschiedenen Kräften versehen seyen, lassen sich die Phänomenen der Natur gewißlich leichter erklären, als die Boscovichische Curva.

Zuvor wird man aber mir eines zugeben, nemlich, daß die
klein-

für die größern, und kleinern Entfernungen könnte diese Gleichung dienen. Wenn man die eine positive oder attractive Kraft v nimmt, welche in dem umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen wachsen soll, das ist $v = \frac{1}{d^2}$; die zweite positive Kraft v heissen, welche 3. E. in dem umgekehrten Verhältnisse der vierten Potenz der Entfernungen wachsen soll; das ist $v = \frac{1}{d^4}$; so wird

$V + v = \frac{1}{d^2} + \frac{1}{d^4}$. Nun wenn d sehr groß ist, so wird $\frac{1}{d^4}$ ein kleiner Bruch seyn, folglich kann es in der Gleichung ohne merk-

Fehler ausgelassen werden, so wird $V + v = \frac{1}{d^2}$ seyn, daher in größern Entfernungen die einige Kraft in dem umgekehrten Verhältnisse der Quadrate der Entfernungen statt finden wird. Wenn d ein sehr kleiner Bruch ist, so wird er desto kleiner, je je größer die Potenz er erhoben wird, folglich wird $\frac{1}{d^4}$ viel größer als $\frac{1}{d^2}$ seyn

(je kleiner der nenner, desto größer ist der Bruch) daher $\frac{1}{d^2}$ in der Gleichung ohne merklichen Fehler ausgelassen werden kann: so wird die Gleichung seyn $V + v = \frac{1}{d^4}$ mithin wird in den kleinern Entfernungen die einige attractive Kraft in dem umgekehrten Verhältnisse der vierten Potenz der Entfernungen Platz finden. Aber

Obgleich ich nur als ein Beyspiel an, gleichwie (N. 24.) eingebracht worden, endlich in den kleinsten Entfernungen, wenn man ein negatives Glied oder die repulsive Kraft u nennet, welche 3. E. in dem umgekehrten Verhältnisse der sechsten Potenz der Entfernungen wachsen soll; so wird die Gleichung für die kleinsten Entfernungen

seyn $V + v - u = \frac{1}{d^2} + \frac{1}{d^4} - \frac{1}{d^6}$. Wenn nun d ein sehr kleiner Bruch ist, gleichwie es auch wirklich ist in den kleinsten Entfernungen;

E e

als


alsdenn wird $\frac{1}{d^5}$ weit größer seyn als $\frac{1}{d^2} + \frac{1}{d^4}$; folglich können positive Glieder in der Gleichung gänzlich ausgelassen werden, diejenige Kraft in dem umgekehrten Verhältnisse der sechsten Potenzen der Entfernungen wird Platz finden: folglich wird $V r v - u = -$ seyn; welches Gesetz der zurücktreibenden Kraft abermal nur zumspiele angeführt wird.

51.

Auf gleiche Weise mögen diese drey Kräfte auch geom. durch eine Curva angezeigt werden; gleichwie ich sie (Fig. 4. N) angezeigt habe: aber diese Curva kann nur einmal ihre Axi den 3. E. in c wo die zurücktreibenden Kräfte die anziehenden nichten. Hier ist die Erklärung dieser Curva: es soll demnachlich die allgemeine Attraction in dem umgekehrten Verhältnisse der Entfernungen von einer unbestimmten Entfernung 3. E. von B dauern, in h soll ein anderes Gesetz 3. E. in dem umgekehrten Verhältnisse der vierten Potenz der Entfernungen anfangen, dieses das vorige Gesetz verändern, und soll dauern bis d (Fig. 4. und in d , wo die Cohäsion am stärksten ist, soll die repulsive Kraft anfangen, und in dem umgekehrten Verhältnisse der sechsten Potenz der Entfernungen wachsen. Diese negative Kraft wird bald die positive oder attractive Kraft vernichten; also daß 3. E. in p (Fig. die Cohäsion sey $= p r - p n$, und endlich in c (Fig. 4. und $= c q - c o = 0$; da $c q = c o$ ist.


Aus dieser Erklärung erhellet zugleich, wie das Gesetz der Continui erhalten werde, und daß die stärkste Cohäsion auf einmal in eine Repulsion übergehe; sondern von d an, wo sie am stärksten ist, durch die stets wachsende repulsive Kraft immer schwächer werden müsse, bis sie endlich zu nichts werde, wo die Curva in

reide. Diese Carba ist weit einfacher als die Bostowichische, in man setzt, daß die Elemente mit verschiedenen Kräften ver-
d, so kann man, wie mich deucht durch dieselbe die Thän-
der Natur leichter erklären; und sie kommt auch mit der Er-
mehr überein. Dieses ist Erlauchte Herren, was ich Ihnen
Kräften der Elemente, und von den Gesetzen dieser Kräfte zu
m vorlege. Wenn meine Gründe der Vernunft und Erfah-
neß, nicht seyn sollten; so bitte ich meinem Fehler gütig zu



Tab I

Fig. 1.





ab. II

Fig. 1

on
A

Abhandlung,


von dem

Zusammenhang der Theile in den Körpern, und
Dem Anhang der flüssigen Materien an die Solide.

von

Kaveri Epp,

Professor der Philosophie im Gymnasio zu München.



Erster Theil

von dem

Zusammenhang der Theile in den Körpern.

§. 1.

Eine Kraft, welche die Theile der Körper verbindet, und durch
seine Wirkung den Zusammenhang verursacht, untersuchen
wir in gegenwärtiger Abhandlung.

§. 2.

Gewiß ist, daß die Theile aller Körper zusammen hangen,
und mithin der Zusammenhang eine allgemeine Eigenschaft der Körper
ist. Wir wissen keinen Körper in der ganzen Natur, dessen Theile
keine Verbindnuß haben.

§. 3.

Von Zusammenhang.

§. 3.

Obwohl die Theile aller Körper zusammenhangen, so ist der Grad des Zusammenhangs nicht in allen gleich. Es giebt Körper von stärksten, von mittelmäßigen, von wenigem Zusammenhange.

4. §.

Körper von der ersten Gattung sind in allen Reichen der Natur zu finden. In dem Reiche der Thiere die Beine. In dem Reiche der Pflanzen die Bäume. In dem Reiche der Fossilien die Metalle, und Steine.

Ein Körper der zweiten Gattung ist z. B. ein Schwamm aus dem Reiche der Pflanzen. Nur eine mittelmäßige Kraft ist nöthig, um die Theile des Schwammes zu sondern.

Körper der dritten Gattung sind alle flüssige Körper: deren Theile so schlecht zusammenhangen, daß auch eine kleine Kraft vermögend ist, die Verbündniß aufzuheben. Wir können ohne Mühe das Wasser bewegen, oder theilen, wie es uns beliebt.

§. 5.

Alle Körper widerstehen jener wirkenden Kraft, welche den Zusammenhang ihrer Theile zu verhindern sich bemühet. Der Widerstand ist desto größer, oder kleiner, je stärker oder weniger Zusammenhang der Theile ist.

Ich muß eine größere Kraft anwenden, um eine eiserne Kugel zu brechen, als wenn selbe von Holz ist. Mithin widersteht Eisen den brechenden Kräften heftiger, als das Holz.

§. 6.

Dieser Widerstand, den die Körper den brechenden Kräften ent-

gegen sehen, ist eine wahre Wirkung, vera Actio, und rüh-
: nicht minder von einer Kraft her, als die wirkliche Sönderung
: Theile von einer Kraft entspringet.

§. 7.

Ich weiß, dieser Satz hat viele Gegner: doch ist es nicht
: selbst gründlich zu beweisen. Wir wollen der Wahrheit allge-
: nachforschen.

Lacys von Cyrene behauptete mit vielen andern aus dem Al-
thum, daß alle Wirkungen, Veränderungen, die wir täglich vor
igen sehen, nichts anderes seyn, als Betrüge unsrer Sinne, Blend-
rte der ausschweifenden Phantasie. Mithin wenn man diesem Welt-
issen eine tönnende Mausschelle versetzte, glaubte er nichts weniger,
: daß eine Veränderung in seinen Wangen geschehen: die Empfin-
ng hielt er für eine Wirkung seiner träumenden Einbildungskraft.

Auf diesen artigen Gedanken verfiel er durch den Betrug sei-
r Bedienten Lacys hatte viele mit Getreide reichlich versehene Spei-
er. Damit aber seine Hausgenosene kein Getreid stehlen könnten,
wahrte er die Thüren auf das sorgfältigste, und druckte sein Sie-
el darauf. Diesem allen ungeachtet fanden die Bediente heimliche
änge in die Speicher, und raubten alle Tage eine zimliche Menge
ächten. Lacys vermerkte den täglichen Abgang gar wohl, doch weiß
t sein Siegel allezeit unverletzt gefunden, glaubte er, dieser Abgang
in ein pures Blendwerk seiner Sinne. Ja mit diesem noch nicht zu-
rieden, machte er gleichen Schluß auf alle Veränderungen der
ingen Natur. Mithin sind nach dessen Lehre, gleichwie alle Ver-
änderungen der Natur, so auch die wirkenden Kräfte lauter Miß-
burten der lügenden Phantasie.

Wir heut zu Tage lachen billig über den narrrischen Einsall

dieses träumenden Philosophen, und glauben, er verdiene vielmehr in ein Tollhaus gesperrt, als mit Beweis widerlegt zu werden.

§. 8.

Cartes, und nach ihm Malebranch behaupteten, daß wahre Veränderungen in der Natur täglich geschehen: und also diese Wirkungen von einer wahren wirkenden Kraft müssen herrühren; indem ein Effect sich selbst nicht erzeugen kann. Diese wirkende Kraft ist Gott: von Gott hangen alle Wirkungen der Natur ab, als von einer unmittelbaren, und einzigen Ursache. Die Körper besitzen keine Kraft: sie können weder in sich, weder in andern Körpern eine Veränderung verursachen.

Es ist hier meines Thuns nicht, diese Lehre weitläufig zu widerlegen: dieses ist schon von andern geschehen: und sind die Gründe so wichtig, daß bey unsern Zeiten kein Philosoph mehr zu finden, der diese Lehre behauptet. Mir scheinen Cartes, und Malebranch einer gewissen Gattung der Comödianten gleich zu seyn, welche in ihren Trauerspielen alles mit Involutionen verwickeln, und wenn sie auf die letzt so viele gehäufet, daß sie sich aus diesem Labyrinth nicht mehr entwickeln können, nehmen sie ihre Zuflucht zu einer Machin. Ein Götter-Ausspruch muß dem bedrangten Dichter aus seinem verwirrten Mischmasch helfen, wider die ausdrückliche Ermahnung des Horaz: Nec Deus interfit.

§. 9.

Die dritte Gattung der Philosophen giebt zwar gerne zu, daß es wirkende Kräfte in der Natur gebe; doch, daß der Widerstand eine wahre Gegenwirkung, Reactio, welche in einem Zurückstoßen bestehet, sey, wollen sie hart glauben. Doch dem ist also.

Wir,

Wirken, agere, ist nichts anders, als den Stand eines Körpers ändern. Woher wissen wir, daß eine eiserne aus einer ganzen Kartause gegen die Mauer einer Festung geschossene Kugel wirke? Nicht wahr, aus dem veränderten Stande der Mauer? die Kugel zersprengt, zerschmettert die Steine, macht eine große Oeffnung. Dieß ist lauter Effect einer wirkenden Kraft. Woher wissen wir, daß eine in dem Stande der Bewegung gesetzte Billard-Kugel in eine andere ruhende, auf welche sie anstößt, wirke? Daher: sie setzt die ruhende Kugel aus dem Stande der Ruhe in den Stand der Bewegung, sie giebt ihm eine gewisse Richtung, und Geschwindigkeit.

Gut! wenn diese Effect erklecklich sind, das Daseyn einer wirkenden Kraft zu folgern, so wird es, wie ich glaube, nicht viel Kopfschmerzen kosten, um erproben zu können, daß der Widerstand eine wahre Gegenwirkung sey; denn es zeigen sich die nämlichen Wirkungen. Wenn eine Kugel von Helfenbein auf einen mit Unschlitt bestrichenen Amboss fällt, hinterlaßt selbe eine runde Mackel, welche desto größer wird, je höher die Kugel herab fällt.

2. Wenn ich einen von Erde gemachten Hafen an die Mauer werfe, zerbricht er in viele Stücke.

3. Schieße ich aus einer Flinte eine Kugel auf ein dickes Brett, wird sie zwar die Theile des Holzes sondern; doch aber endlich seine Geschwindigkeit verlieren, und in dem Brett ruhend stecken bleiben.

Aus diesem erhellet, daß der Widerstand die Figur der Körper verändern, die Theile des anfallenden Körper zersprengt, und die Geschwindigkeit der bewegten Masse hemmt, ja endlich gar ausschlägt. Sind dieß nicht klare Proben, daß der Widerstand eine wahre Gegenwirkung sey? Proben, daß diese Effect von einer

Kraft, und zwar einer den anfallenden Körper zurücktreibende Kraft herrühre.

§. 10.

Nun wiederum auf dasjenige zu kommen, was S. 1. meldet worden. So ist itens gewiß, daß die Körper jenen widerstehen, die sich bemühen die Verbindniß der Theile zu trennen, oder gar aufzuheben.

Versuch. Man nehme einen kleinen Koffer, oder Kasten, welchen ein hölzerner Zwerchbalken, so von einem Ende bis an das andere reicht, in zween gleiche Theile *E G* abtheilet, um in die eine Seite Wasser zu gießen, und die andere nur mit Luft angefüllt zu lassen. An einem doppelten Galgen, der mitten auf dem Kasten aufgerichtet steht, hängen zwey Stänglein von gleicher Länge herab, an derer Ende 2. metallene Kugeln *a a* befestigt sind, die einerley Gewicht, und Umfang haben, und derer jede, wenn sie in Bewegung setzt, in demjenigen Theile des Kastens, da sie sich befindet, hin- und hergehen kann.

Wirkungen. Wenn diese beyde Kugeln zu einerley Zeit mit gleicher Größe der Bewegung fortgehen, so verliert diejenige, die sich in dem Wasser *F* bewegt, innerhalb 4. oder 5. Stunden ihre Geschwindigkeit, da hingegen die andere, welche sich in dem nassen Theil des Kastens hin und her bewegt, in welchem nie Wasser *G* befindlich ist, ihre Geschwindigkeit sehr lange behält, solche nicht eher, als nach sehr vielen dergleichen geschehene Schwingungen gänzlich wieder verliert.

Erklärungen. Es können die metallenen Kugeln nicht so leicht bewegt, ausgenommen sie raumen auf die Seite den Luft und Wasser, welches den Raum anfüllet, in dem sich diese Körper befinden.

n. So ist dann nothwendig, daß die Luft- und Wassertheile einander getrennet werden. Dieser Sönderung widerstreben. Daher müssen beyde Körper endlich, und endlich ihre Geschwindigkeit verlieren.

2. Die Kugel, welche sich in dem Wasser bewegt, verliert Geschwindigkeit geschwinder. So ist dann der Widerstand Wassers größer, als des Luft, weil jener Körper dicker, dieser er ist.

3. Dieser Widerstand ist eine wahre Gegenwirkung, siehet her von einer Kraft, dessen Richtung schnurgerad entgegen ist der Richtung des sich bewegenden metallenen Körpers.

4. Eben jene Kraft, welche die Absönderung der Theile verwehrt, verbindet auch selbe mit einander. Nun weil die Pflicht dieser Kraft ist, die Theile zu verbinden, so kann sie füglich eine anziehende Kraft genennet werden.

§. 11.

Von dieser anziehenden Kraft, als der Ursache des Zusammenhangs der Körper, z. B. des Eisens, ist die Frage, ob selbe in dem Körper, dessen Theile zusammenhängen, zu suchen, oder außerhalb dem Körper? die Meinungen der Philosophen sind verschieden.

§. 12.

Einige suchen die Ursache des Zusammenhangs außer dem Körper und vermeinen selbe glücklich gefunden zu haben in dem Druck einer flüssigen Materie. Und was soll wohl diese für flüssige Materie seyn? vielleicht der Luft? Wahr ist es, unsre Körper ruhen, und bewegen sich in dem Luftmeer, fast wie die Fische

dieses träumenden Philosophen, und glauben, er verdiene vielmehr in ein Tollhaus gesperrt, als mit Beweis widerlegt zu werden.

§. 8.

Cartes, und nach ihm Malebranch behaupteten, daß wahre Veränderungen in der Natur täglich geschehen: und also diese Wirkungen von einer wahren wirkenden Kraft müssen herrühren; indem ein Effect sich selbst nicht erzeugen kann. Diese wirkende Kraft ist Gott: von Gott hangen alle Wirkungen der Natur ab, als von einer unmittelbaren, und einzigen Ursache. Die Körper besitzen keine Kraft: sie können weder in sich, weder in andern Körpern eine Veränderung verursachen.

Es ist hier meines Thuns nicht, diese Lehre weitläufig zu widerlegen: dieses ist schon von andern geschehen: und sind die Gründe so wichtig, daß bey unsern Zeiten kein Philosoph mehr zu finden, der diese Lehre behauptet. Mir scheinen Cartes, und Malebranch einer gewissen Gattung der Comödianten gleich zu seyn, welche in ihren Trauerspielen alles mit Involutionen verwickeln, und wenn sie auf die letzt so viele gehäufet, daß sie sich aus diesem Labyrinth nicht mehr entwickeln können, nehmen sie ihre Zuflucht zu einer Machin. Ein Götter-Ausspruch muß dem bedrangten Dichter aus seinem verwirrten Mischmasch helfen, wider die ausdrückliche Ermahnung des Horaz; Nec Deus interfit.

§. 9.

Die dritte Gattung der Philosophen giebt zwar gerne zu, daß es wirkende Kräfte in der Natur gebe; doch, daß der Widerstand eine wahre Gegenwirkung, Reactio, welche in einem Zurückstoßen bestehet, sey, wollen sie hart glauben. Doch dem ist also.

Wir,

Wirken, agere, ist nichts anders, als den Stand eines Körpers ändern. Woher wissen wir, daß eine eiserne aus einer ganzen Karttaune gegen die Mauer einer Festung geschossene Kugel wirke? Nicht wahr, aus dem veränderten Stande der Mauer? die Kugel zersprengt, zerschmettert die Steine, macht eine große Oeffnung. Dieß ist lauter Effect einer wirkenden Kraft. Woher wissen wir, daß eine in dem Stande der Bewegung gesetzte Billard-Kugel in eine an der ruhende, auf welche sie anstößt, wirke? Daher: sie setzt die ruhende Kugel aus dem Stande der Ruhe in den Stand der Bewegung, sie giebt ihm eine gewisse Richtung, und Geschwindigkeit.

Gut! wenn diese Effect erklecklich sind, das Daseyn einer wirkenden Kraft zu folgern, so wird es, wie ich glaube, nicht viel Kopfschmerzen kosten, um erproben zu können, daß der Widerstand eine wahre Gegenwirkung sey; denn es zeigen sich die nämlichen Wirkungen. Wenn eine Kugel von Helsenbein auf einen mit Unschlitt bestrichenen Amboss fällt, hinterlaßt selbe eine runde Mackel, welche desto größer wird, je höher die Kugel herab fällt.

2. Wenn ich einen von Erde gemachten Hafen an die Mauer werfe, zerbricht er in viele Stücke.

3. Schieße ich aus einer Flinte eine Kugel auf ein dickes Brett, wird sie zwar die Theile des Holzes sündern; doch aber endlich seine Geschwindigkeit verlieren, und in dem Brett ruhend stecken bleiben.

Aus diesem erhellet, daß der Widerstand die Figur der Körper verändern, die Theile des anfallenden Körper zersprenge, und die Geschwindigkeit der bewegten Masse hemme, ja endlich gar auslösche. Sind dieß nicht klare Proben, daß der Widerstand eine wahre Gegenwirkung sey? Proben, daß diese Effect von einer

Kraft, und zwar einer den anfallenden Körper zurücktreibenden Kraft herrühre.

§. 10.

Nun wiederum auf dasjenige zu kommen, was S. 6. gemeldet worden. So ist itens gewiß, daß die Körper jenen Kräften widerstehen, die sich bemühen die Verbindniß der Theile zu hemmen, oder gar aufzuheben.

Versuch. Man nehme einen kleinen Koffer, oder Kasten, welchen ein hölzerner Zwerchbalken, so von einem Ende bis an das andere reicht, in zween gleiche Theile *E G* abtheilet, um in die eine Seite Wasser zu gießen, und die andere nur mit Luft angefüllt zu lassen. An einem doppelten Galgen, der mitten auf dem Zwerchholz aufgerichtet steht, hängen zwey Stänglein von gleicher Länge herab, an deren Ende 2. metallene Kugeln *a a* befestiget sind, die einerley Gewicht, und Umfang haben, und deren jede, wenn man sie in Bewegung setzt, in demjenigen Theile des Kastens, darüber sie sich befindet, hin- und hergehen kann.

Wirkungen. Wenn diese beyde Kugeln zu einerley Zeit mit gleicher Größe der Bewegung fortgehen, so verliert diejenige, die sich in dem Wasser *F* bewegt, innerhalb 4. oder 5. Stunden all ihre Geschwindigkeit, da hingegen die andere, welche sich in demjenigen Theil des Kastens hin und her bewegt, in welchem nichts als Luft *G* befindlich ist, ihre Geschwindigkeit sehr lange behält, und solche nicht eher, als nach sehr vielen dergleichen geschehenen Vibrationen gänzlich wieder verliert.

Erklärungen. Es können die metallenen Kugeln sich nicht bewegen, ausgenommen sie raumen auf die Seite den Luft und das Wasser, welches den Raum anfüllet, in dem sich diese Körper bewegen.

wegen. So ist dann nothwendig, daß die Luft- und Wassertheile von einander getrennet werden. Dieser Sönderung widerstreben sie. Daher müssen beyde Körper endlich, und endlich ihre Geschwindigkeit verlieren.

2. Die Kugel, welche sich in dem Wasser bewegt, verliert ihre Geschwindigkeit geschwinder. So ist dann der Widerstand des Wassers größer, als des Luft, weil jener Körper dicker, dieser leichter ist.

3. Dieser Widerstand ist eine wahre Gegenwirkung, sie kommt her von einer Kraft, dessen Richtung schnurgerad entgegen gesetzt ist der Richtung des sich bewegenden metallenen Körpers.

4. Eben jene Kraft, welche die Absönderung der Theile verhindert, verbindet auch selbe mit einander. Nun weil die Ursache dieser Kraft ist, die Theile zu verbinden, so kann sie füglich eine anziehende Kraft genennet werden.

§. 11.

Von dieser anziehenden Kraft, als der Ursache des Zusammenhangs der Körper, z. B. des Eisens, ist die Frage, ob selbe in dem Körper, dessen Theile zusammenhangen, zu suchen, oder außerhalb dem Körper? die Meinungen der Philosophen sind verschieden.

§. 12.

Einige suchen die Ursache des Zusammenhangs außer dem Körper und vermeinen selbe glücklich gefunden zu haben in dem Druck einer flüssigen Materie. Und was soll wohl diese für eine flüssige Materie seyn? vielleicht der Luft? Wahr ist es, unsere Körper ruhen, und bewegen sich in dem Luftmeer, fast wie die Fische

§. 17.

Ob dieser Satz gut, oder unrichtig, entscheide ich jetzt nicht. Denn ein Philosoph muß keinen Satz, der von den Erscheinungen abhängt, behaupten, bevor er die Natur um Rath befragt, dieser müssen wir eine Offenbarung erbetteln.

Erster Versuch

§. 18.

Zubereitung. Die (II. Fig.) stellet eine Wage A vor. An dem Fuß der Wage liegen allerhand sehr genau polirte Platten von verschiedener Materie $M m$ sind gläserne. $N n$ Eisen, $P p$ von Messing. Die Grundfläche der Platte $m n p$ ist 24 Quadratlinsen. Die Platten $M N P$ werden mittelst zweier Schrauben $c c$ fest gemacht. Die kleineren aber $m n p$ werden nach und nach mittelst eines Seidenfadens an dem Arm des Wagebalkens gehängt, doch so, daß auf der andern Seite B ein Gleichgewicht gelegt werde.

Wirkungen. Wenn Glas auf Glas, Messing auf Messing, Eisen auf Eisen, so wie in der (III. Fig.) zu sehen, gesetzt wird, muß man auf der Schale d ein Gewicht zulegen, um die anziehende Kraft, mit welcher M mit m verbunden wird, zu überwinden. Diese anziehende Kraft ist bey dem Glas $= 3 \text{ Quind} \times \frac{1}{16}$. Bey dem Eisen, und Messing ist die anziehende Kraft in 6 mal stärker.

Zweiter Versuch.

§. 19.

Vorbereitung. Man lege auf die gläserne Platte *M* ein zarten Seidenfaden *M 1*, und wiederhole das Experiment, von welchem wir §. 18. geredet,

Wirkung. Die anziehende Kraft wird schwächer seyn.

Man nehme zween Seidenfäden, also, daß o o den Faden der Richtung eines rechten Winkels schneide.

Wirkung. Die anziehende Kraft wird so klein seyn, daß sie kaum mehr vermerket.

Dritter Versuch.

§. 20.

Vorbereitung. Man nehme zwei Walzen von Blei *A B*, eine 12. Unzen schwer ist, man reibe beyde mit entgegen gesetzten Richtungen stark auf einander.

Wirkung. Beyde Walzen hangen zusammen, ungeachtet die Walze *B* 12. Unzen in seinem Gewicht hält. Mithin ist die anziehende Kraft 12. Unzen stark.

Erklärung.

§. 21.

Aus diesen Erscheinungen folget, daß die Natur zwei Wesen fodern, um zween Körper auf das engste zu verbinden,

ja aus zweenen gleichsam nur einen zu machen. Sie verlangt eine Politur, und die Berührung.

So giebt es dann in den Elementen der Körper eine anziehende Kraft. Und diese Kraft ist desto heftiger, je näher sie an einander, und je größer die Menge der Elemente in der Oberfläche ist. Zu diesen Sätzen leiten uns jene Bedingnisse, welche die Natur erfordert, um die Körper mit einander zu verbinden.

§. 22.

Denn warum verlangt sie eine Politur? Es giebt Körper, welche, wenn man sie mit freyen Augen betrachtet, glatt, und nicht rauhe zu seyn scheinen. Doch dieß Urtheil der Augen betriegt uns. Sehen wir dieses nicht täglich in den Fliegen, und andern Ungeziefer? die Füße dieser Thierchen sind mit Klauen versehen, mit welchen sie sich fest an die hervorragende Theile eines senkrecht hangenden, und geschliffenen Spiegels halten, und also ihren kleinen Körper in die Höhe schleppen, fast auf eben die Art, wie wir zu thun pflegen, wenn wir über eine senkrecht hangende Leiter hinauf klettern wollen.

Daß es aber dem also ist, dürfen wir nur das Aug mit einem Vergrößerungs-Glase bewaffnen, so wird sich in einem jeden Körper eine ganze Kette der Gebirge entwickeln. Nun legt man zwei rauhe Körper auf einander, werden sich nur die hervorragende Theile berühren, alle übrige, die sich in den Thälern befinden, kommen nicht zur Berührung. Damit aber dieses geschehe, ist nöthig, daß man die Berge abtrage, und die hervorragende Theile abschleife. So verlangt mithin die Natur aus keiner andern Ursache die Politur der Körper, als damit mehrere Elemente sich anziehen können.

§. 23.

Nit nur die Politur sondern auch die Berührung erfordert Natur um den Körper zu verbinden. So haben wir mithin eine Probe, daß die anziehende Kraft der Elemente auf eine kleine Entfernung wirke. Kommen in diese Entfernung die Elemente der polierten Körper nicht, so geschieht keine Anziehung. Entje größer die Menge der in dieser Entfernung sich befindenden Elemente ist, je stärker wird auch die Anziehung seyn.

Erscheinungen der Natur erproben diesen Satz. Wenn zwey Platten AB , AC also aufeinander gelegt werden, daß sie D einen sehr schiefen Winkel machen, und der Raum zwischen zwey Gläsern mit Wasser befeuchtet wird, so lehret die Erfahrung, daß das Wasser in dem innern Raume sich ausbreite, und je gegen A steige, je spiziger mittels der Schrauben MM , (je dienen den Winkel größer, oder kleiner zu machen) der Winkel in D wird.

Fast gleiche Erscheinung zeigt sich in den zwey gläsernen Platten der 7ten Figur, welche durch den Keil B mehr, oder weniger eröffnet werden. Wenn der unterste Theil CC die Oberfläche des Wassers auch berührt: steigt dieses in dem innern Raume beyden Gläser in die Höhe, so, daß das steigende Wasser das Ansehen einer Hyperbola bekömmt.

In beyden Erscheinungen sehen wir, daß das Wasser mehr dorthin gezogen wird, wo die Theile des Glases am meisten ähern. Die mehrere Erklärung dieser Experimente wird der zweyten und dritte Theil geben.

Erinnerung. Aus diesem, was wir gesagt, folget die Ursache,

§ § §

§. 17.

Ob dieser Satz gut, oder unrichtig, entscheide ich jetzt nicht. Denn ein Philosoph muß keinen Satz, der von den Erscheinungen abhängt, behaupten, bevor er die Natur um Rath befragt, dieser müssen wir eine Offenbarung erbetteln.

Erster Versuch

§. 18.

Zubereitung. Die (II. Fig.) stellet eine Wage A vor. An dem Fuß der Wage liegen allerhand sehr genau polirte Platten von verschiedener Materie $M m$ sind gläserne. $N n$ eiserne, $P p$ von Messing. Die Grundfläche der Platte $m n p$ ist mit 24 Quadratlinsen. Die Platten $M N P$ werden mittelst zweier Schrauben $c c$ fest gemacht. Die kleineren aber $m n p$ werden nach und nach mittelst eines Seidenfadens an dem Arm des Wagebalkens A gehängt, doch so, daß auf der andern Seite B ein Gleichgewicht gelegt werde.

Wirkungen. Wenn Glas auf Glas, Messing auf Messing, Eisen auf Eisen, so wie in der (III. Fig.) zu sehen, gesetzt wird, muß man auf der Schale d ein Gewicht zulegen, um die anziehende Kraft, mit welcher M mit m verbunden wird, zu überwinden. Diese anziehende Kraft ist bey dem Glas $= 3 \text{ Quind.} \times \frac{1}{16}$. Bey dem Eisen, und Messing ist die anziehende Kraft in etwas stärker.

Experiment.

Vorbereitung. Ich habe zwey Brettlein *A B* verfertigen
1 (Fig. VIII.) derer Grundfläche, wie 2 zu 1 sich verhalten.
1 Brettlein *A*, dessen Grundfläche 1024. Quadratlınien in sich
, wird mittels einen seidenen Faden an den Wagebalken *M*,
der andern Seite aber in *N* ein gleiches Gegengewicht gehängt.

Wenn nun das Brettlein *A* mitten in der Höhle des gläser-
Geschirres hängt, daß es nirgend anstößt, schüttet man allge-
1 so viel Wasser zu (doch ohne das Holz zu berühren) bis die
rfläche desselben das Brettlein erreicht.

Wirkungen. Das hölzerne Brettlein hängt sich mit solcher
t an das Wasser, daß, wenn man nach und nach Gewichte
ie andere Schaafe legt, selbe im Stande ist 1 Loth, und $\frac{1}{2}$ von
1 Quintl zu tragen.

Entgegen wenn man auf gleiche Weise mit dem Brettlein *B*,
1 Grundfläche noch so klein, den Versuch anstellet, wird die
hende Kraft, welche das Wasser mit dem Brettlein verbindet,
ie Hälfte kleiner seyn, wenn man anderst den Versuch mit ge-
er Genauigkeit anstellet.

Erklärung. In dem Brettlein *A*, dessen Grundfläche
ist so groß, als in dem andern ist, sind doppelt noch so viel Ele-
e. Weil dann alle die Wassertheilchen anziehen, so ist es ja
Wunder, wenn auch die Wirkung doppelt noch so groß ist.

Zweiter Theil

von

dem Anhang und Anklebung der flüssigen Materien an die soliden Körper.

§. 25.

Daß die flüssigen Materien an die Soliden sich hängen zeigt die tägliche Erfahrung. Stosse ich den Finger in das Wasser, Del, Wein, Bier &c. wird selber naß heraus gezogen, er ist nicht trocken, das Wasser, Del, Wein, Bier &c. hängt an demselben.

Doch, daß nicht alle flüssige Materien an die Soliden hängen sich hängen, zeigt ebenfalls die Erfahrung.

Das Quecksilber ist einer unter den flüssigsten Körpern dennoch, wenn ich den Finger, Steine, Holz, Tücher &c. hineinstreife, ziehe ich selbe trocken heraus. Entgegen die Metalle &c. von dem Quecksilber benetzt.

Wir haben noch mehrere Beispiele dieser wunderbaren Eigenschaften. Sehen wir nicht täglich die Schwäne an das Wasser steigen fast gänzlich trocken, obwohl sie kurz vorher ihren ganzen Körper in das Wasser gestossen. Wenn zu Sommerszeit die Luft ihre Gewebe zwischen zwey Baumlein hängt, und ein auch als mittelmäßiger Regen fällt, sehen wir das Gewebe trocken, genommen, daß da und dort einige kugelförmige kleine Wassertröpfchen auf den zarten Fäden sitzen. So ist dann gewiß, daß die flüssigen Materien an die festen sich hängen, doch nicht alle.

§. 26.

Aus diesen Erscheinungen der Natur entspringt eine wichtige Frage: warum die flüssigen Materien an die festen sich hängen, doch nicht alle? ich sage: eine wichtige Frage; denn nach meinem besten Urtheil hängen von der Entscheidung dieser Frage sehr viele Dinge, für das gemeine Wesen nützliche, und wunderbare Erscheinungen der Natur ab.

Bevor ich aber zur Auflösung dieser Frage schreite, muß ich mir etwas wenigstens von der Schwere der Körper reden; denn was ich behaupte, meine Ideen, die ich von der Schwere der Körper habe, kommen nicht überein mit den Gefinnungen vieler anderer Philosophen. Ob selbe falsch, oder gut seyn, lasse ich einem gelehrten Manne zu beurtheilen über. Ich mache mir eine Ehre daraus von einem gelehrten Freunde belehret zu werden.

Lehre

von der Schwere der Körper.

§. 27.

Jenen Körper nennen wir schwer, der zu Boden fällt, und dem Mittelpunkt der Erde sich nähert, so bald die Hinderniß des Weges aus dem Weg geraumet wird. Ob die Schwere, als die natürliche Ursach des Falls, in, oder ausser den Körper sich befinde, ist eine Frage, die ich hier nicht entscheide. In gegenwärtiger Materie gilt es gleich, ob wir das erste, oder zweyte betrachten.

§. 28.

§. 28.

§. 28.

Das ganze Geschäft unsrer Frage beruhet auf diesem. Aus was Zeichen man erkennen möge, ob ein solider Körper schwerer sey, als ein flüssiger. Dieses Zeichen muß unfehlbar seyn, also zwar, daß dessen Gegenwart uns versichern kann von der größeren Schwere des soliden Körper. Wo finden wir aber dieses?

§. 29.

Die Gelehrten sowohl, als Ungelehrten, wenn sie einen soliden Körper in einem flüssigen zu Boden sinken sehen, urtheilen, der solide Körper müsse schwerer seyn, als der flüssige. Wir sehen an das Beispiel in einer Wage. Ruhet der Wagebalken nicht: sinkt das Gewicht in der rechten, und steigt das Gewicht in der linken Schaaale: o! heißt es, das Gewicht in der rechten Schaaale ist schwerer; die Menge der schweren Bestandtheile, aus welchen dieses Gewicht zusammen gefüget ist, ist größer.

Wenn dann dieses Urtheil gut ist, so können wir den Fall, das Hinuntersteigen eines soliden Körpers in den flüssigen als ein unbetriegliches Zeichen der größeren Schwere annehmen. Und dieser Vernunftschluß wird gut seyn. Ein Cubischuh von Eisen, wenn man selben auf der Oberfläche des Wassers leget, sinkt zu Boden. So ist dann ein Cubischuh von Eisen schwerer, als ein Cubischuh von Wasser.

§. 30.

Wenn aber ein solider Körper auf der Oberfläche des flüssigen schwimmt: ist wohl dieses schwimmen ein unfehlbares Zeichen einer geringeren Schwere? o nein! Ein Schifflein von Blei schwimmt auf dem Wasser: und dennoch wird niemand so thöricht seyn,
und

sagen, das Bley ist leichter, als das Wasser. So ist in das Schwimmen, eines soliden Körpers auf der Oberfläche Flüssigen kein allgemeines, unfehlbares Zeichen einer geringern wäre.

§. 31.

Wir müssen einen Unterschied machen zwischen der Schwere des ganzen, und der Schwere der Theile. Es kann ein z. B. ein Holz in seinem ganzen Umfang leichter seyn, als Wasser von gleichen Umfang, und dennoch können seine Theile aufeinander passen, als die Theile des Wassers, mit diesem Unterschied, daß zwischen den Bestandtheilen des Holzes mehrere, größere Luftlöcher, oder leere Räume zu finden, als in dem Wasser.

Daß dieser Satz nichts widersprechendes lehre, wird nicht zu erweisen seyn, wenn wir nur auf die Art und Weise, mit der ein Körper entstehen kann, Acht haben.

§. 32.

Alle Körper, sie mögen flüssige, oder solide seyn, können dem Urheber der Natur in die kleinsten Theile aufgelöst werden, die nicht mehr aus andern kleinern zusammengesetzt, sondern einfach, und untheilbar sind. Diese kleinsten Theile nennen die Philosophen Elemente Punkte, Monaden, Atomen.

Aus diesen Elementen entstehen alle Körper: und zwar aus hunderttausenden entstehen die Körperchen von der ersten Gattung, *moleculæ primi generis*, die aber so klein sind, daß sie mit dem edelsten Vergrößerungsglas unmöglich können gesehen werden. Aus mehreren zusammengefügt Körperchen der ersten Gat-

tung entstehen die dickere Körperchen der zweyten Gattung *moleculæ secundi generis*. Und also weiter, bis sie so dick werden, daß man sie mit einem guten Vergrößerungsglas, ja endlich freyem Auge sehen kann. Diese kleinen Körperchen verstehen wir gegenwärtiger Materie, wenn die Rede ist von den Bestandtheilen und nicht die einfachen Elemente, aus welchen selbe zusammengefügt sind.

Daß aber diese Genealogie der Körper nicht eine Mißgelmenschlicher Phantasie sey, erkläret der vortrefliche Löwenhök dem Blute eines Thiers. Durch Hilf eines Vergrößerungsglases hat dieser große Naturkenner erfahren, daß ein rothes Blutkörnlein aus sechs andern gelblechten serösen kleinern Kugeln bestehe, welche man ohne Mühe selbes vertheilen könnte. Ein jedes aus diesen letztern bestund aus 6. andern noch kleinern limphatischen Kugeln. Ob diese wiederum in andere können aufgelöst werden hat er nicht in Erfahrung bringen können wegen der ungemeinen Feinheit dieser Kugeln. Doch ist es sehr wahrscheinlich, daß diese aus andern kleinern, und kleinern bestehen, bis endlich die einzelnen Elemente das Ende dieser Theilbarkeit machen.

§. 33.

Der Unterschied der Körper ist überaus groß, mithin ist unvergleichlich wahrscheinlicher: daß die Bestandtheile, oder jenen Körperchen, von welchen wir kurz vorher gehandelt, als eine ungleichen Zahl der Elemente bestehen: also, daß nach Verschiedenheit der Körper in dieser Maaß die Anzahl der Elemente, aus welchen die Körperchen bestehen, sehr groß, in einer andern mäßig, in der dritten sehr klein ist.

§. 34.

Derohalben, obwohl in einer gewissen Gattung der Körper B. in dem Löschpapier die kleinen Körperchen dicker sind, so ist doch möglich, daß in dem ganzen Umfang, und Inhalt des Löschpapier eine kleinere Anzahl der Elemente sich befindet, und mit in daß das Löschpapier in seinem ganzen Umfang betrachtet, leichter ist, als z. B. das Wasser, dessen einzelne Körperchen aus einer kleinen Anzahl der Elemente bestehen.

Denn in einem jeden Körper giebt es neben den Bestandtheilen auch leere Räume, in welchen entweder gar keine Materie ist, oder doch eine weit zartere, als jene kleinen Körperchen sind.

Nun: wenn in dem Löschpapier mehrere, oder größere leere Räume sind, als in dem Wasser, also zwar, daß die Verhältniß der leeren Räume in dem Löschpapier größer ist, als die Dicke, und Schwere seiner einzelnen Bestandtheile, so ist sich gar nicht zu verwundern, daß ein Löschpapier in seinem ganzen Umfang betrachtet, könne leichter seyn, als das Wasser von gleichem Umfang, doch schwerer, wenn wir seine einzelnen Bestandtheile, oder kleinen Körperchen betrachten.

§. 35.

Daß diese Theorie vollkommen mit den Wirkungen der Natur übereins kommt, werde ich durch einfältige, gar nicht weit hergesuchte Versuch, und Erscheinungen erklären.

Versuch.

Vorbereitung. Man lege auf die Oberfläche ein Blatt von Papier, oder ein Stücklein Leinwat etc. Man kehre sie öfters in dem

Wasser herum, bis sich das Wasser in alle leere Räume, in welche zu vor Luft gewesen, eingedrungen.

Wirkung. Das Schreib- und Löschpapier, Leinwand, Schwamm u. werden zu Boden sinken.

Erste Erklärung.

§. 36.

Was ist wohl dasjenige, welches in dem Löschpapier zu Boden fällt? vielleicht das Wasser? o nein; das Wasser fällt in das Wasser nicht zu Boden. Wohin ich immer einen Cubiczoll Wasser, oder einen andern dem Wasser an Schwere gleichen Körper legen, wird er in den übrigen Wasser niemals sinken, niemals zu Boden fallen, sondern allezeit ruhen; wir mögen ihn in die Mitte, an die Tiefe des Wassers, oder wo es immer hin beliebt, stellen. Was aber das Wasser, welches die Lufträume des Löschpapiers ausfüllt, nicht zu Boden fällt: was ist wohl dasjenige in dem Papier, welches diese Wirkung verursacht?

Ich finde in diesem Körper nichts anderes, als die Materie aus welcher das Schreibpapier besteht. Diese sinkt, und fällt zu Boden.

§. 37.

Weil dann das Hinuntersteigen eines soliden Körpers in einer flüssigen Materie ein unbetrügliches Zeichen einer größern Schwere ist (§. 29.) so folget ganz ungezwungen, daß die Materie des Löschpapiers schwerer sey, als die Materie des Wassers.

Weil

1. Weitere Erklärung.

§. 38.

Diesen Zweifel zu heben, wollen wir uns vorstellen ein kleines Schiffein von Bley AB (Fig. 9.) Es kann dieses bleyene Schiffein unmöglich zu Boden fallen, ausgenommen, es werde so viel Wasser ausgeschlossen, als groß der Raum ist, den das Schiffein einnimmt.

Nun ist es zwar gewiß, daß die kleinen Körperchen, aus welchen das Bley bestehet, dicker, und mithin schwerer sind, als die kleinen Bestandtheile des Wassers. Doch, weil in jenem Raume, das Schiffein besitzt, eine große Höhle ist, in welcher nichts Luft, welcher tausendmal leichter, als das Wasser, so kann man sagen, daß die Summe der auszuschließenden Wassertheile größer seyn müsse, als die Summe jener Elemente, aus welchen das Bley und Luft zugleich besteht.

Wenn dem also, so kann das bleyene Schiffein in dem Wasser so wenig sinken, und zu Boden fallen, so wenig in einer Waage. 1. H fallen, kann in Gegenwart eines andern Gegengewichts von 3. H .

Daß aber die gegebenen Ursachen die wahren seynd, können wir aus folgenden abnehmen. Wenn die Höhle des Schiffeins mit Wasser gefüllet, oder das Bley also zusamm gedrückt wird, wie in dem nämlichen (Fig. 9.) in c zu sehen, wird der Körper zu Boden sinken.

§. 39.

Wie sich die Schwere des Wassers verhält zu den soliden Körpern z. B. zu dem Lbschpapier, Baumwolle, Holz, Stein etc.
So

So verhält sich das Quecksilber zu den Metallen, und Halbmassen. Die nämlichen Grundsätze haben auch hier Statt, und Platz.

§. 40.

Fast allgemein war die Lehre, daß das Quecksilber alle Metalle, das Gold ausgenommen, an Schwere übertreffe. Der treffliche Herr Professor Hamberger war der erste, so viel mir bekannt, der das Gegentheil behauptet.

Seine Gründe scheinen mir so wichtig, daß ich meinem Stande müßte Gewalt anthun, wenn ich von seiner Lehre wollte weichen.

Ich gebe derothalben ganz gerne zu, daß das Quecksilber wenn wir selbes in seinem ganzen Umfang betrachten, schwerer sey, als das Silber, Kupfer, Bley, Zinn, Eisen u. also zwar, wenn die Schwere des Goldes ist 19636 Gran, die Schwere Quecksilbers seyn werde

	"	"	14019
des Bleies	"	"	11345
des Silbers	"	"	10535
des Kupfers	"	"	8843
des Eisens	"	"	7852
des Zinnes	"	"	7321

§. 41.

Dem ungeacht behauptete ich, daß, wenn die Rede ist von Schwere und Dicke der Bestandtheile, oder sogenannten kleinen Perchen, aus welchen ein jedes Metall bestehet, das Quecksilber nicht nur allein leichter, als das Gold, sondern auch leichter als Silber, Kupfer, Eisen, Zinn u. sey. Mit einem Worte: gleich ein solider Cubiezoll von Bley allezeit in dem Wasser zu Boden sinkt, ein solcher von Quecksilber nicht.

wenn man ihn auf die Oberfläche leget, und mithin sowohl in den
anzen, als auch in den einzelnen Theilen schwerer ist, als das
Wasser; so ist auch das Gold sowohl in seinem ganzen Umfange,
als auch in seinen einzelnen Theilen betrachtet, schwerer als das Queck
silber, weil es in diesem allezeit zu Boden fällt.

Ferner: gleichwie ein Cubiczoll Fichtenholzes in der Oberflä
che des Wassers schwimmt, doch aber endlich zu Boden fällt, wenn
e lang genug auf selber gelegen, und die Wassertheilchen in gehörig
er Menge in die Zwischenräume des Holzes (in welchen entweder
er keine, oder nur eine Luftmaterie gewesen) eingedrungen, und mit
in ein Cubiczoll Fichtenholzes zwar in dem Ganzen leichter, doch
ber in seinen einzelnen Theilen schwerer ist als das Wasser
(§§. 35. 36. 37. 38.) so ist auch das Quecksilber in seinem ganzen
anfange betrachtet, schwerer als das Blei, Silber, Kupfer u. doch
ber leichter in seinen einzelnen Theilen.

§. 42.

Diesen Satz haben wir keineswegs erdichtet, sondern von der
Natur erlernet.

Versuche.

Vorbereitung. Ich nehme eine Cubiclinie reines Golds,
lege selbe auf die Oberfläche des Quecksilbers.

Wirkung. Das Gold sinkt zu Boden.

2. Ich nehme eine Cubiclinie von einem andern Metall, z. B.
Zinn: ich lege selbe auf die Oberfläche des Merkurs.

Wirkung. Das Zinn schwimmt auf dem Quecksilber, wie
das Holz, Papier u. auf dem Wasser.

Z i

3. Ich

3. Ich löse das Zinn in dem Quecksilber auf, und lege dieses Amalgama auf die Oberfläche des Quecksilbers.

Wirkung. Das Amalgama sinkt, fällt zu Boden, wie ein mit Wasser imprägnirtes Papier, Leinwand, Holz.

Erklärung. Warum fällt das Zinn in dem ersten Falle nicht zu Boden: wohl aber in dem andern?

Das Zinn hat mehrere, oder wenigst weitem Zwischenräume, als das Quecksilber. So ist dann die Summe der Elemente in dem Quecksilber größer, als in dem Zinne. Ist aber die Summe größer, so wird auch das Quecksilber in seinem ganzen Umfange betrachtet, schwerer seyn: folglich, so wenig ein leichterer Körper, welcher auf der Schale einer Wage liegt, in Gegenwart eines andern schwerern Körpers sinken kann: so wenig wird das Zinn in seinem natürlichen Stande in dem Quecksilber zu Boden fallen.

Wenn aber in die Zwischenräume des Zinnes, in welche entweder gar keine, oder wenigst eine weit leichtere Materie verbor gen, die mercurialischen Theile hinein gedrungen; wird die leichte Materie hinaus getrieben, und die Zwischenräume mit Quecksilber gefüllet. Mithin können, und müssen die schwerern Theile des Zinnes in dem Quecksilber zu Boden fallen.

Ich sage, die schwerern Theile: denn was sinkt wohl zu Boden in diesem Amalgama? das Quecksilber? o nein! das Quecksilber in dem Quecksilber sinkt nicht zu Boden, wie wir schon oben gezeigt in dem Wasser S. 35. 36. 1c. Was dann?

Gewiß die schwerern Theile des Zinnes; denn was immer zu Boden sinkt, ist schwerer, als die flüssige Materie S. 29. Mithin ist das Zinn zwar leichter als das Quecksilber, wenn man beide

nach.

dem ganzen Umfange betrachtet; doch aber schwerer in Betrachtung der einzelnen Theile.

§. 43.

Was ich immer von der doppelten Schwere der Körper habe, sind lauter Vorbereitungen, um eine vernünftige Antwort geben zu können, auf jene Frage, die ich S. 26. vorgetragen, aber unantworret gelassen.

Warum hängen sich nur einige flüssige Materien an solide Körper, nicht aber alle?

Mehrerer Klarheit halber werde ich aus allen flüssigen Materien nur zwei erwähnen, das Wasser nämlich, und das Quecksilber. Das Erste sich fast an alle Körper anhängt, nicht aber das Zweite. Habe ich die Ursache des Anhängens in diesen Zweien gefunden: so wird man selbe ohne sondere Mühe auf andere flüssige Körper von gleicher Wirkung können anwenden.

W a h r e U r s a c h e

des Anhangs flüssiger Materien an solide Körper.

§. 44.

Das Wasser hängt sich an Holz, Metall, Glas, Papier, und selbst andere Sachen. Die Ursache ist nicht hart zu errathen, wenn man ohne Vorurtheil erwägt, was SS. 21. 22. 23. 24.) item p. 1. 31. 32. 2c. gemeldet werden.

Denn, wenn die Wassertheile einander anziehen, zugleich stärker von den Theilen des Holzes gezogen werden: müssen jene größern Kraft weichen, und von den übrigen Wassertheilen sich

ablösen, und an das Holz sich hängen. Und dieß ist, was wir befeuchten nennen.

§. 45.

Die ganze Beschränkung kommt auf dieß an, ob die Wassertheile sich wechselweise anziehen, und ob die anziehende Kraft des einen 26. größer sey, als jene.

Erster Satz.

Eine anziehende Kraft verbindet die Wassertheile.

§. 46.

Die Wahrheit dieses Satzes erlernen wir von der Natur. Betrachten wir nur einen Wassertropfen, der auf einen zarten Theil eines Spinnengewebes liegt. Er ist nach dem Urtheil auch des scharfen Auges vollkommen rund, und kirkelförmig.

Wie kann aber der Wassertropfen kirkelförmig seyn, wenn die Theile keine Kraft besitzen, wechselweise sich anzuziehen? ganz wenn ich einen Haufen Steine nehme, und aus selben eine Kugelform gestalte, wird das ganze zusammengefügte Wesen zerfallen, so bald ich meine Hand zurück ziehe. Warum? die einzelne Steine sind ganz vollständige Körper, welche keine anziehende Kraft besitzen, um aus mehreren einen Stein zu machen. Auf gleiche Weise würde es den Theilen eines Wassertropfens ergehen, wenn sie nicht miteinander verbunden wären.

§. 47.

Gleiche Verbindung der Wassertheilen, zeigt uns die Natur in tausend andern Gelegenheiten.

Br.

V e r s u c h.

Vorbereitung. A B. (Fig. 10.) ist ein Glasrohr: man taucht selbes in das Wasser.

Wirkung. Wenn es heraus gezogen wird, zeigt sich an dem untersten Rande ein Wassertropfen C B, welcher ungeacht seiner Schwere nicht zu Boden fällt.

Erklärung. Theilen wir den Wassertropfen in drey Stockwerke, in das unterste, mittlere, und oberste.

Daß der oberste Gaden $x y$ nicht sinkt, kann ich faßen; indem er das Glas berührt, von welchem das Wasser $x y$ merklich angezogen wird. Daß aber die zweyte und dritte Lage von Wasser gemäß seiner Schwere nicht zu Boden fällt, kann ich unmöglich faßen, wenn keine verbindende Kraft zugegen ist, welche das Unterste mit dem Mittlern, das Mittlern mit dem Obersten Wasser verbindet.

Z w e y t e r S a t z.

Die anziehende Kraft, welche die Wassertheile verbindet, ist nicht groß.

§. 48.

Ein Kind von einem Tage, ja ein noch weit kleinere Kraft ist im Stande den Zusammenhang des Wassers aufzuheben. So klein diese anziehende Kraft ist, so ist sie doch merklich, und kann nach meinem mindesten Urtheile ziemlich genau bestimmt werden.

Meine Methode die anziehende Kraft zu bestimmen ist folgende (Fig. 11.) Ich nehme eine, so viel möglich genaue Wage, in welcher gar keine sensible Reibung zu bemerken. Zu diesem Ziel und Ende habe ich mir eine von unserm berufenen Künstler Herrn Wolf

3. Ich löse das Zinn in dem Quecksilber auf, und lege dieses Amalgama auf die Oberfläche des Quecksilbers.

Wirkung. Das Amalgama sinkt, fällt zu Boden, wie ein mit Wasser imprägnirtes Papier, Leinwand, Holz.

Erklärung. Warum fällt das Zinn in dem ersten Falle nicht zu Boden: wohl aber in dem andern?

Das Zinn hat mehrere, oder wenigst weitem Zwischenräume, als das Quecksilber. So ist dann die Summe der Elemente in dem Quecksilber größer, als in dem Zinne. Ist aber die Summe größer, so wird auch das Quecksilber in seinem ganzen Umfange betrachtet, schwerer seyn: folglich, so wenig ein leichterer Körper, welcher auf der Schale einer Wage liegt, in Gegenwart eines andern schwerern Körpers sinken kann: so wenig wird das Zinn in seinem natürlichen Stande in dem Quecksilber zu Boden fallen.

Wenn aber in die Zwischenräume des Zinnes, in welchen entweder gar keine, oder wenigst eine weit leichtere Materie verhorgen, die mercurialischen Theile hinein gedrungen; wird die leichtere Materie hinaus getrieben, und die Zwischenräume mit Quecksilber gefüllet. Mithin können, und müssen die schwerern Theile des Zinnes in dem Quecksilber zu Boden fallen.

Ich sage, die schwerern Theile: denn was sinkt wohl zu Boden in diesem Amalgama? das Quecksilber? o nein! das Quecksilber in dem Quecksilber sinkt nicht zu Boden, wie wir schon oben gezeigt in dem Wasser S. 35. 36. 1c. Was dann?

Gewiß die schwerern Theile des Zinnes; denn was immer zu Boden sinkt, ist schwerer, als die flüssige Materie S. 29. Mithin ist das Zinn zwar leichter als das Quecksilber, wenn man beide

nach

n ab, so ist es ein Zeichen, daß die Kraft der Schwere größer werden, als die anziehende, und verbindende Kraft gewesen.

Diese zu erfahren, habe ich auf die Platte *D* kleine Gewichte nach und nach gelegt, und den losgerissenen, und auf die andere Platte *A* gefallenem Wassertropfen gewogen. Die Erfahrung hat belehret, daß der Wassertropfen ein wenig mehr, als der 466te $\frac{1}{2}$ eines baierischen in 131072. Particul getheilten Pfundes gewesemithin $\frac{466}{131072}$. oder fast ein halbes Quintel.

Weil dann der Wassertropfen ein wenig mehr gewogen, als $\frac{56}{872}$. So kann ich ohne merkliche Irrung die anziehende Kraft, die die Wassertheile miteinander verbindet, ansetzen, als den vierert, sechs- und sechzigsten Theil eines baierischen in 131072. Particul getheilten Pfundes.

§. 50.

So ist dann gewiß, daß sich die Wassertheile wechselweise anziehen, und daß diese Kraft zwar nicht groß, doch ziemlich merklich.

Nun müssen wir noch untersuchen, ob jene soliden Materien, welche sich das Wasser anhängt, die Wassertheile anziehen, und stärker, als sich selbst. Denn wenn die Theile der soliden Körper mit weniger, oder auch wenigstens mit keiner größern Kraft ziehen, die Wassertheile sich selbst anziehen: werden diese niemals von den jenen Wassertheilchen sich los reißen. Können aber diese sich nicht reißen, so werden sie sich an die festen Körper nicht hängen, und in geschicht keine Bewegung.

Drit-

verfertigen lassen, welche alle Vollkommenheit besitzen, die immer die Mechaniker erfordern. Beiderseits zu Ende der Arme *BC*, habe ich zwei zirkelförmige Platten *AD* angeschafft, welche mir auch dienen zu einem sichern electrischen Versuch.

Nun auf eine dieser Platten halte ich senkrecht das in das Wasser getauchte Glasrohr. Es hängt sich zu unterst der Röhre ein Wassertropfen, damit aber dieser größer und dichter werde, benetze ich öfters die Seite der Röhre mit wenig Wasser, welches sich mit dem an dem untersten Rande hangenden Tropfe vereinigt.

Durch diesen Zusatz verliert der Wassertropfen allgemach seine vorige Figur. Oben wo er an das Glas anschließt, verdünnt er sich: unten ist er dichter, und kömmt fast heraus, wie ein Apfel, der mittels eines Stiels an dem Aste hangt.

Endlich wird er durch den zwar wenig, doch aber öfters wiederholten Zusatz so schwer, daß sich der untere Theil von dem Halse los reißt, und zu Boden fällt.

Ich habe mit den vortreflichen Männern *Lamberger*, und *Weitbrecht* bemerkt, daß der Wassertropfen allezeit sich los reißt, wenn er die Größe einer Erbse erreicht.

§. 49.

Nach mit allem Bedacht angestellten Versuche, habe ich also bey mir geschlossen.

Anfänglich ist der untere Theil des Wassertropfens nicht zu Boden gefallen, obwohl er ziemlich schwer war. Mithin muß die anziehende Kraft, welche den untern Theil mit dem obern verbindet, größer seyn, als die Kraft der Schwere. Diese wächst mit der Menge des zufließenden Wassers. Löst sich endlich der Untertheil von dem
obern

ern ab, so ist es ein Zeichen, daß die Kraft der Schwere größer worden, als die anziehende, und verbindende Kraft gewesen.

Diese zu erfahren, habe ich auf die Platte *D* kleine Gewicht
n nach und nach gelegt, und den losgerissenen, und auf die ande
Platte *A* gefallenem Wassertropfen gewogen. Die Erfahrung hat
ch belehret, daß der Wassertropfen ein wenig mehr, als der 466te
heil eines bayerischen in 131072. Particul getheilten Pfunds gewo
mithin $\frac{466}{131072}$. oder fast ein halbes Quintel.

Weil dann der Wassertropfen ein wenig mehr gewogen, als
 $\frac{466}{131072}$. So kann ich ohne merkliche Irrung die anziehende Kraft,
che die Wassertheile miteinander verbindet, ansetzen, als den vier
dert, sechs- und sechzigsten Theil eines bayerischen in 131072. Par
al getheilten Pfundes.

§. 50.

So ist dann gewiß, daß sich die Wassertheile wechselweise
ziehen, und daß diese Kraft zwar nicht groß, doch ziemlich merk
lich sey.

Nun müssen wir noch untersuchen, ob jene soliden Materien,
welche sich das Wasser anhängt, die Wassertheile anziehen, und
ar stärker, als sich selbst. Denn wenn die Theile der soliden Kör
mit weniger, oder aufs wenigst mit keiner größern Kraft ziehen,
die Wassertheile sich selbst anziehen: werden diese niemals von den
eigen Wassertheilchen sich los reißen. Können aber diese sich nicht
reißen, so werden sie sich an die festen Körper nicht hängen, und
ihin geschicht keine Bewegung.

Drit

Von Zusammenhang Dritter Satz.

Die Theile der soliden Körper, welche von dem Wasser benetzt werden, ziehen die Wassertheilchen stärker an sich, als sie sich selbst untereinander ziehen.

§. 51.

Dieser Satz ist eine natürliche Folge jener Theorie, die in (§. 27. 36.) von der Schwere der Körper gegeben.

§. 52.

Die beständige Erfahrung lehret, daß alle jene Körper, welche von dem Wasser benetzt werden, wenn man sie auf die Oberfläche des Wassers legt, entweder alsobald zu Boden fallen, oder aufs wenigst zu sinken anfangen, wenn sie genug Wassertheile in die leere Räume eingeschlucket.

Ferner lehret uns die gesunde Vernunft, daß jene Körper, welche alsobald zu Boden fallen, schwerer sind, als das Wasser, ich mag selbe betrachten wie ich will, in dem ganzen Umfange, oder in den Theilen. §. 29.

Entgegen die Körper, welche erst zu Boden fallen, wenn sie genug Wasser geschlucket, sind zwar nicht schwerer, als das Wasser in dem ganzen Umfange, wohl aber in den Theilen. (§. 36.) Das ist, die Theile dieser Körper passen dichter aufeinander, als die einzelnen Theile des Wassers. §. 33.

§. 53.

Wenn derothalben z. B. ein Papier auf die Oberfläche des Wassers gelegt wird, so geschieht eine Berührung, das ist: die
Theil

eile des Papiers berühren die Waßertheile: und auf diese Berührung allein müssen wir sehen, da die Rede ist von der anziehenden Kraft. Es ist gar kein Zweifel, daß viele 1000. Waßertheile auf leeren Räume des Papiers, und nicht wenige Theile des Papiers die leeren Räume des Wassers passen; doch dieses vermehret, und vermindert die anziehende Kraft nicht, und ist gar nicht darauf zu geben.

§. 54.

Auf die Berührung der Theile folget die Wirkung der anziehenden Kraft. (S. 23. 24.)

§. 55.

Die Wirkung der anziehenden Kraft ist desto heftiger, je größer die Zahl der Elemente, aus welchen die sich berührenden einzelnen Theile zusammengesetzt sind. (S. 24.) Denn dasjenige, was angezogen wird, sind nur die Elemente, nicht aber die leeren Räume.

§. 56.

Derohalben, weil die einzelnen Theile des Papiers, Bausteine, Holzes etc. dichter aufeinander passen, als die einzelnen Theile des Wassers (S. 36. & 37.) so muß auch die Kraft, mit welcher die einzelnen Theile des Papiers die Waßertheile anziehen, größer seyn, als die Kraft ist, mit welcher die Waßertheile miteinander verbunden sind. Ist aber jene größer, so müssen die berührenden Waßertheile sich von dem übrigen Wasser los reißen, der größern Kraft gehorchen, und an das Papier etc. sich hängen. Diese Wirkung nennen wir Befechten.

Von Zusammenhang Dritter Satz.

Die Theile der soliden Körper, welche von dem Wasser benetzt werden, ziehen die Wassertheilchen stärker an sich, als sie sich selbst untereinander ziehen.

§. 51.

Dieser Satz ist eine natürliche Folge jener Theorie, die ich (§. 27. 36.) von der Schwere der Körper gegeben.

§. 52.

Die beständige Erfahrung lehret, daß alle jene Körper, welche von dem Wasser benetzt werden, wenn man sie auf die Oberfläche des Wassers leget, entweder alsobald zu Boden fallen, oder aufs wenigst zu sinken anfangen, wenn sie genug Wassertheile in die leere Räume eingeschlucket.

Ferner lehret uns die gesunde Vernunft, daß jene Körper, welche alsobald zu Boden fallen, schwerer sind, als das Wasser, ich mag selbe betrachten wie ich will, in dem ganzen Umfange, oder in den Theilen. §. 29.

Entgegen die Körper, welche erst zu Boden fallen, wenn sie genug Wasser geschlucket, sind zwar nicht schwerer, als das Wasser in dem ganzen Umfange, wohl aber in den Theilen. (§. 36.) Das ist, die Theile dieser Körper passen dichter aufeinander, als die einzelnen Theile des Wassers. §. 33.

§. 53.


Wenn derothalben z. B. ein Papier auf die Oberfläche des Wassers geleet wird, so geschieht eine Berührung, das ist: die
Theile

Vierter Satz.

Versuche bestätigen die gegebene Lehre.

§. 58.

Diese Lehre wird bestätigt mit andern Erscheinungen der Na-
 1. Ein Wassertropfen zerfließt auf einem kalten, nicht aber auf
 n glühenden Eisen. Ist das Eisen glühend, so wird der Wasser-
 m nicht unmittelbar das Eisen, sondern die überaus zarte, und
 rein leichte Feuermaterie berühren, von welcher die Wassertheile
 er angezogen werden, als sie sich selbst anziehen. 2. Lege ich
 inen sehr polierten Staal ein kleines Stück Golds: mache ich
 Staal glühend, wird das Gold schmelzen, und seine runde Figur
 inmen behaupten. Entgegen ist der Staal rauch, werden die
 ragenden Staaltheile schmelzen mit dem Gold, und weil dieses
 rer, werden sie sich mit ihm vereinigen, und auf solche Weise
 ht möglich, daß das Gold seine zirkelförmige Figur behalte, es
 zerfließen.



Von Zusammenhang
Dritter Theil,
 Anwendung

der gegebenen Theorie auf verschiedene Erscheinungen
 der Natur.

§. 59.

Die Theorie von der anziehenden Kraft hat sehr großen Einfluß in die Erscheinungen, welche wir in den 3. Reichen der Nature, Pflanzen, und Fossilien bewundern. Bevor wir uns diese betrachten, wollen wir uns um die Ursache umsehen anderer Erscheinungen, sonderlich jener, die wir in den flüssigen Materien bewundern. Sind wir auf die wahre Ursache dieser Erscheinungen gekommen, werden sie uns ein helles Licht anzünden, um die verborgenen Geheimnisse der Natur in den 3. Reichen aufzuklären.

Erscheinungen in dem Löschpapier.

§. 60.

Wenn wir das Unglück haben unvorsichtiger Weise unsere Feder tiefer in das Dintensaf zu tauchen, und auf das Schreibpapier einen kleinen Dintenberg zu erschaffen: bedienen wir uns des Lösch- oder sogenannten Flüßpapiers, um den Berg abzutragen. Sobald wir selbes der Dinte nähern, wird diese stärker von den stärkern Theilen des Papiers angezogen (§. 47.) als die Theile der Dinte unter sich zusammen hängen: so muß dann der Gipfel, und die Mitte des Berges der stärkern Kraft folgen, und in den Körper des Löschpapiers sich versenken: auf die Letzt bleibt nur eine kleine Linie auf dem Schreibpapier. Warum bleibt aber eine kleine Linie zurück?

ist? warum folget nicht der Fuß des Berges der anziehenden Kraft des Löschpapiers? das Schreibpapier zieht mit gleicher Kraft den letzten Theil des Dintenberges: mithin kann sich selber nicht von dem Schreibpapier los reifen. Entgegen weil der Gipfel, und Mitte des Dintenberges weiter entfernt ist von dem Schreibpapier, als von dem Löschpapier, gewinnt die anziehende Kraft dieses die Oberhand. (§. 18.)

§. 61.

Ich glaubte anfänglich gleiche Wirkung zu erhalten, wenn ich dem Dintenberge eine lockere Baumwolle, oder einen aus Baumwolle, geflochtenen Dacht näherte. Aber nein! Ich betrog mich in meiner Meinung. Aus diesem schloß ich, daß zwar die Theile der Baumwoll dichter, als der Dinte; indem die Baumwoll, wenn sie genug Dinte in seine leere Zwischenräume gesucket, in selben zu Boden fällt (§. 36.) doch aber dieser Exces weit geringer sey, als die ganze Schwere der anzuziehenden Dinte in seinem ganzen Umfange ist.

§. 62,

Wenn aus einem Löschpapier ein Schirmmügel *AB* gemacht, und die innere Fläche *c c* wohl mit Oel benezet wird, kann man in die Höhle nach Belieben Waßer schütten: es wird kein Tropfen durch das Löschpapier fließen. Warum? obwohl ein Wassertropfen also bald auf einem trocknen Löschpapier zerfließet, können wir doch diese Wirkung nicht hoffen, wenn die innere Fläche mit Oel befeuchtet ist: denn in diesem Falle berührt das Waßer nicht unmittelbar die Papiertheile, sondern das Oel. Das Oel aber ist in dem ganzen, und in seinen Theilen leichter, als das Waßer: mithin hangen die Wassertheile unter sich stärker zusammen, als sie von den Theilen des Oels

angezogen werden. Hangen sie aber stärker zusammen, so wird sich kein Theil von dem andern sondern, welches doch nothwendig folgen müßte, wenn anderst das Wasser durch das Lösspapier flöße. Gleich Wirkung geschieht, wenn die innere Fläche mit dem sogenannten Samen *Lycopodii* bedeckt wird.

Erscheinungen in dem Saamen *Lycopodii*.

§. 63.

Wenn man an das Holz, Glas, oder andere solide Materien den Saamen *Lycopodii* streuet, wird sich das Wasser an diese Körper nicht hängen. (Fig. 13.) Ja nehmet ein Gläschen voll Wasser, streuet auf die Oberfläche *a a* das *Lycopodium*, und leget darauf eine Münze *c*: sie wird trocken auf den Boden des gesessenen Geschirrs fallen, ja man kann selbe mit trocknen Fingern heraus ziehen. Die Ursache dieser bewunderungswürdigen Wirkung ist folgende:

Das *Lycopodium* ist respectiv leichter, als das Wasser, mithin hängen sich das Wasser an das *Lycopodium* nicht. (S. 45.) Hängt sich aber das Wasser nicht an das *Lycopodium*, so kann sich auch der Saamen an den Finger, an die Münze nicht hängen, weil das *Lycopodium* die Münze, den Finger *e* umgiebt.

Ich habe kurz vorher gesagt, Samen *Lycopodii* sey respectiv leichter, als das Wasser. Ich gestehe gar gerne, daß, wenn der Samen lange Zeit auf der Fläche des Wassers liegt, er zu Boden sinkt: mithin seine Theile schwerer seyn, als des Wassers, doch aber, weil er sehr locker liegt, zugleich auch seine Theile eine sehr zackigte Figur haben, so geschieht die Berührung nur in wenigen Theilen,

Theilen, welche nicht reflectlich ist einen merklichen Anhang an den Saamen zu verursachen.

Erscheinungen des in das Wasser gesenkten Glases.

§. 64.

Entgegen wenn das Lycopodium wegleibt, und ein gläsernes parallel lopipedum auf die Oberfläche eines reinen Wassers gesetzt wird, so erfahren wir, daß nicht nur allein der unterste Rand $a b$ von dem Wasser benetzt wird, sondern auch selbes von seinen wagrechten Stande abweicht, und in Form einer Schanz beyde seits gegen das Glas sich aufbaut: doch so, daß die erhabene Schanz in eine krumme Linie $c d e$ gebogen ist, deren äußere Fläche dem Glase sich nähert. Die Ursache ist nicht hart zu errathen. Die Unterfläche des Glases $a b$ wird benetzt, weil das Glas nicht nur in seinen Theilen, sondern auch in seinem ganzen Umfange betrachtet schwerer ist, als das Wasser: mithin ziehen die Theile des Glases die Wassertheile stärker an sich, als sie unter sich zusammenhangen. Was die Aufbäumung des Wassers gegen das Glas belanget, geschieht diese fast aus gleicher Ursache.

§. 65.

Doch diese noch besser zu erklären, ist zu wissen, daß die Erfahrung uns lehre, daß die anziehende Kraft des Glases auf eine Entfernung, doch aber auf eine sehr kleine, sich erstrecke. Wir erklären dieß in der 15. Fig. Stellen wir uns vor ein kleines gläsernes Kuglein c , welches wir betrachten wollen als den Mittelpunkt der Sphäre, dessen radius ist die Entfernung $A C$, über welche sich die anziehende Kraft des gläsernen Mittelpunkts nicht erstreckt. Diese Sphäre, welche durch die Wälzung des Halbzirkel $A C A$ um den Durchmesser $A C A$ ist erzeugt

erzeuget worden, nenne ich die Wirkung, oder Activität = Sphäre. Der radius $A C$ ist die Distanz, in welcher der gläserne Mittelpunkt die Wassertheile noch anziehet. Nun dann setzen wir in der Circumferenz $A A A$ eitel Wasser, selbes wird aller Ort angezogen. Je näher die Wassertheile dem Mittelpunkt kommen, je heftiger wird die anziehende Kraft, weil es uns die Erfahrung lehret, daß alle Kräfte, die auf eine Entfernung sich erstrecken, größer werden, mehr die Entfernung abnimmt; kleiner, je mehr dieselbe zunimmt.

Dieses nun vorausgesetzt, bilden wir uns ein eine Wasseroberfläche $C B D$. Diese berührt ein gläsernes parallelepipedum A in B . In einer sehr kleinen Entfernung von B nehmen wir 3 an der Oberfläche ruhende Wassertheile $a b c$. Alle 3. sind in der Activität = Sphäre des gläsernen Punktes G . a wird von ihm am meisten angezogen, b minder, c am mindesten. So wird mithin a in G , das c in c zu stehen kommen. Diese angezogenen Theile ziehen andere mit sich gemäß des Anhauges, so sie unter einander haben. Und also kommt eine krümmlichte solide Figur heraus.

Erscheinungen in denen Haarröhrgen aus Glas

§. 66.

Wenn man 4. gläserne Parallelepipeda auf die Oberfläche des Wassers setzt, doch so (Fig. 17.) daß $a b c d$ parallel mit $e f g h$, und die Entfernung von beyden $= d g = \frac{1}{2}$ Linie. Entgegen $A B C D$ zwar auch parallel mit $E F G H$ doch aber die Entfernung größer, nämlich $D G = 1$ Linie. So lehret die Erfahrung, daß das Wasser über den wagrechten Stand $L M$ in dem Zwischenraum $B D C G$, und $b d e g$ hinauf steigt, also, daß die Höhen sich verhalten verkehrt wie die Zwischenräume, so, daß das Wasser

Wasser in dem Zwischenraume *b d g e* doppelt so hoch steigt als in *D E G*.

§. 67.

Die Ursache dieser Wirkung werde ich erklären in den so genannten Haarröhrchen; auch in diesen steigt das Wasser über den wagrechten Stand, also, daß wenn wir mehrere Haarröhrchen nehmen von verschiedenen Durchmessern, die Höhe der flüssigen Materien sich verhalte verkehrt wie die Durchmesser der Haarröhrchen. Und dieses ist wiederum eine natürliche Folge der 2. Theile gegebenen Theorie.

Die 18. Fig. stellet vor ein Haarröhrchen *A B C D*, dessen runde Oeffnung *C D A B* in seinem Durchmesser $\frac{1}{2}$ Linie hat. Taucht man dieses Haarröhrchen in das Wasser, wird nicht nur die äußere, sondern auch die innere Fläche von den sich nähernden Wassertheilen benetzt. S. 42.

2. Das Wasser bäumet sich um die äußere Fläche des Haarröhrchens in Form einer runden Schanze eine Linie hoch auf S. 58.

3. Noch weit höher steigt das Wasser in die Höhe des Haarröhrchens über den wagrechten Stand.

Muschenbröck erzählt, daß das Wasser in einem Haarröhrchen, dessen Diameter der Dicke eines Haars gleich gewesen, in der ersten Stunde 11. Zoll, und nach Verlauf 14. Stunden 13. Zoll hoch gestiegen. In einem noch zärtern stieg das Wasser in der ersten Stunde 18. Zoll, und nach 24. Stunden 22. Zoll hinauf. In allen Haarröhrchen, deren Durchmesser sich nicht über 2. Linien beläuft, steigt das Wasser etliche Linien hoch, mehr, oder weniger, je größer, oder kleiner der Durchmesser ist.

§. 68.

Wir können ein Haarröhrchen betrachten als ein aus vielen gläsernen Zirkeln $C D$, a^2 , a^3 , a^4 , a^5 , bestehendes Wesen, welche, weil sie alle gleich, auch gleiche Kraft das Wasser anziehen besitzen. Nun sobald die Unterfläche des Haarröhrchen dem Wasser sich nähert, wird der unterste Zirkel die ihm nächste, in der innern Höhle correspondirende Wassertheile stärker an sich ziehen, als selbe mit dem übrigen Wasser verbunden sind (§. 58.) mithin müssen sie sich von diesen losreißen, und dem Gewalt der größern Kraft folgend, in die Höhle der ersten Zirkel hinauf steigen. Und weil der zweyte, dritte, vierte Zirkel gleiche anziehende Kraft besitzen, muß das Wasser in der Höhle des gläsernen Rohres beständig höher steigen.

§. 69.

Einwurf. Man sollte glauben, das Wasser müsse oben in die Höhe steigen, weil kein Zirkel in dem ganzen gläsernen Rohre ist, der nicht eben die nämliche Kraft besitzt, wie der unterste, zweyte, dritte, vierte u. d. mithin wenn ein Haarröhrchen von 20. 30. 40. Schuhe verfertigt wurde, müßte das Wasser 30. 40. 50. Schuhe in die Höhe steigen. Und dieß ist falsch, und der Erfahrung zuwider.

Erläuterung. Ich gestehe gar gerne, daß, wenn der fließende flüssige Körper nicht schwer wäre, und mit dem übrigen in dem Gefäß ruhenden Wasser nicht zusammen hange, er nothwendig höher und höher in dem gläsernen Haarrohr steigen müßte. Doch, weil alle Kräfte der Natur ihre Schranken, Ziel und Maaß haben, so wird auch die anziehende Kraft des Glases nicht unendlich, sondern endlich seyn. Nun, wenn es gewiß ist, daß einige Hindernisse

se sich äußern, die das Steigen des Wassers beschwerlich machen, wenn es auch zugleich gewiß ist, daß diese Hindernissen wachsen: so kann man leicht begreifen, daß, wenn die Zahl dieser Hindernissen so groß ist, als die anziehende Kraft des Glases, das Wasser unmöglich mehr steigen kann, weil es ein Gleichgewicht giebt zwischen der erhebenden und niederdrückenden Kraft. Dieß aber ist nicht zu wissen. Denn

1mo Die Wassertheile hangen unter sich zusammen, und diese verbindende Kraft widersteht sich der Absönderung der Wassertheile, weil dieser Effect schnurgerad seiner Wirkung entgegen gesetzt ist. Je größer die Quantität der von dem übrigen Wasser sich absöndernden Theile ist, je größer muß auch seyn der Widerstand der verbindenden Kraft. So wächst mithin dieser Widerstand mit der Proportion, mit welcher das Wasser in dem Haarrohr in die Höhe steigt.

2do. Das steigende Wasser ist schwer: die Schwere widerstrebt allezeit jenen Kräften, die einen Körper in die Höhe zu ziehen, zu ziehen, oder auf eine andere Weise zu bewegen sich bemühen.

Derohalben weil die Schwere allezeit proportionirt ist der Anzahl der Elemente, aus welchen ein Körper bestehet, so muß nothwendig die in der Höhle der gläsernen Röhre zu findende Wassersäule desto schwerer werden, je höher sie steigt: wird sie aber schwerer, so wächst auch der Widerstand, den die anziehende Kräfte des Glases leiden.

Fernere Erläuterung.

§. 70.

Die Wassersäule $BHCpqv$ (Fig. 19.) welche in dem
 1 2 Haarrohr

Haarrohr $F A B C$ hinauf steigt, können wir füglich in zween Theile austheilen, nämlich in das Wasserrohr $B p r c$, welches der innern Fläche des Glases am nächsten ist, und in den mittlern Wasser-Cylinder $q H$, welcher von dem Glase entfernter ist. Weil das hohle Wasserrohr $p B r C$ sehr dünn, haben wir aus dessen Schwere nicht Achtung zu geben, wohl aber auf den dickern Wasser-Cylinder $q H$.

Die anziehende Kraft der Glaszirkul erstreckt sich auf eine sehr kleine Entfernung (S. 59.) die wir durch die Linie $m n$ ausdrücken. Derohalben wird die anziehende Kraft der Glaspunkte sich nur erstrecken auf die ihnen nächste Wassertheile $p B r c$: nicht aber auf den mittlern Wasser-Cylinder $q H$.

Wenn dem also, warum steigt die mittlere Säule $q H$ mit den Wassertheilen $p B r C$ in die Höhe? dieses geschieht nicht aus Antrieb der anziehenden Kraft des Glases: nein, sondern weil die Theile des Cylinders $q H$ mit den angezogenen Theilen $p B r c$ zusammenhängen. S. 44.

Diese verbindende Kraft ist in denen Wassertheilchen so groß, daß an dem obersten hohlen Wasserring $p r$ ein Wasser-Cylinder hängen kann, dessen sammentliches Wasser einer mittelmäßigen Erde an Dicke und Größe gleicht S. 43.

Nun haben die fürtreffliche Männer Bulfinger und Weibrecht erfahren, daß alles jenes Wasser, welches sich in einem Haarrohr befindet, einem Wassertropfe gleiche, von dem wir weitläufiger S. 43. geredet.

So ist nun nicht hart zu errathen, warum das Wasser desto höher steigt, je kleiner der Durchmesser der Haarrohrchen ist, wie in Fig. 20. zu sehen. Je kleiner die innere Höhle ist, je länger

er geht es her, bis die steigende flüssige Materie die Größe und Schwere einer mittelmäßigen Erbs bekennt, und die Summa der Hindernissen das Gleichgewicht mit der anziehenden Kraft erreicht. Doch ist diese Ursach noch nicht hinlänglich.

Erste Anmerkung.

§. 71.

Ich behaupte keineswegs, daß in alle Haarröhrchen gleiche Quantität Wasser sich befinde, und allezeit nur ein Tropfen Wasser hineinsteigen müsse. Denn wenn dieses wäre, so müßten die mit einerley flüssigen Materien erfüllten Haarröhrchen jederzeit von gleichen körperlichen Inhalt seyn. Nun sind sie Cylinder, und wenn zwey Cylinder einander gleich seyn sollen: so müssen sie ihre Höhen umgekehrt wie ihre Grundfläche verhalten. Weil aber ihre Grundflächen Zirkul sind, und die Zirkul sich wie die Quadrat ihrer Durchmesser verhalten, so würden sich die Höhen der flüssigen Materien, in Haarröhrchen von verschiedener Weite, umgekehrt wie die Quadrate der diametrorum, dieser Haarröhrchen verhalten müssen. Es mußte also das Wasser viermal so hoch in ein Haarröhrchen hinaufsteigen, welches im Diameter nur halb so groß wäre, als ein anderes, wenn jederzeit ein Tropfen Wasser hineinsteigen sollte. Es lehret aber die Erfahrniß, daß das Wasser in einem Haarröhrchen nur noch einmal so hoch steht, wenn es im Diameter nur halb so weit ist, als ein anderes: und zweitens, daß in einem Haarrohr von größeren Diameter mehr Wasser zu finden, als in einem andern von kleineren Diameter.

Was ist wohl die Ursach, daß sich die Höhe einerley flüssiger Materie umgekehrt, wie die Diametri der Haarröhrchen verhalte? wir müssen auf die Lehre zurückkehren, die wir §. 63. gegeben.

geben. Das Wasser widersteht dem Hinauffsteigen nicht nur allein wegen seiner Schwere, sondern auch wegen des Zusammenhangs seiner Theilchen.

Verhinderte die Schwere allein das Hinauffsteigen, so müßte sich die Höhe des Wassers umgekehrt, als wie die Quadrat der diametrorum verhalten. Allein, weil desto mehr Wassertheilchen von einander getrennt werden müssen, je enger das Haarröhrchen ist, so widersteht das Wasser wegen des Zusammenhangs seiner Theile noch einmal so stark, wenn der Diameter des Haarröhrchen noch einmal so klein ist.

Es sey z. B. der Diameter des einen Haarröhrchen $A = 1$. der Diameter des andern $B = 2$. so verhält sich die Höhe des Wassers in dem Haarröhrchen A zu der Höhe in B , wenn wir allein auf die Schwere sehen, wie 4 zu 1. Sehen wir aber auf den Zusammenhang, auf die Zähigkeit des Wassers: so verhält sich die Höhe in A zu der Höhe in B wie 1 zu 2. Verbinden wir endlich beides mit einander, gleichwie es in der Natur jederzeit verbunden ist, so verhält sich die Höhe des Wassers im Haarröhrchen A zu der Höhe desselben im Haarröhrchen B wie 4 zu 2, das ist, wie 2 zu 1, und also umgekehrt, wie die Diametri der Haarröhrchen.

Zweite Anmerkung.

§. 72.

Gleichwie die flüssige Materie am Gewichte, so sind sie auch verschieden an Zusammenhang und Zähigkeit deren Theile. Die Erfahrniß lehret, daß die Zähigkeit gar nicht proportionirt sey dem Gewichte. Das Oel ist leichter als das Wasser, und dennoch hängen

gen seine Theile stärker zusam̃, und sind zähiger als die Wassertheile.

Derohalben, weil unter den Hindernissen, die sich dem Hinaufsteigen flüssiger Materien widersetzen, auch der Zusammenhang und Zähigkeit deren Theile ist, so folget, daß je größer diese, je kleiner wir die Höhe seyn. Mithin werden wir uns nicht zu verwundern haben, wenn zuweilen flüssige Materien, die leichter sind, nicht so hoch in den Haarröhrchen steigen, als die schwerere. Beispiele dieser Lehre haben wir genug.

Von der hohlen und convexen Ueberfläche flüssiger Materien.

§. 73.

Die Erfahrung lehret, daß, wenn Wasser in ein Geschirr, absonderlich in ein gläsernes geschüttet wird, die Oberfläche nicht dem Horizont parallel, sondern an dem Rande, wo es das Glas berührt, höher, und mithin concav sey.

Diese Wirkung ist eine Folge unserer Theorie.

Ein Geschirr von Glas $ABCD$ (Fig. 21. N. 1.) fülle ich mit Wasser bis an die Höhe xz : ein Glaspunkt y sey in einer sehr kleinen Entfernung von dem auf der Oberfläche liegenden Wassertheilchen abc : doch so, daß seine anziehende Kraft mehr in a als b , und und mehr in b als c wirke. (§. 59.) Der Wassertheil a wird sich von dem unter ihm liegenden Wasser absondern, und dem Glaspunkt y nähern. Der Wassertheil b wird sich zwar auch dem y nähern: doch nicht so sehr wie a . c wird fast in seiner alten Lage liegen bleiben. Diese angezogene Theile ziehen andere Wassertheile, welche am nächsten unter ihnen liegen, mit sich, und also wird allenthalben

an dem Stande des Geschirrs ein kleiner steiler Berg zu sehen seyn, welcher aus Wassertheilchen besteht, wie in der nämlichen (Fig. 21. N. 2.) zu sehen.

§. 74.

Anmerkung. Wahr ist es, der Glaspunkt x zieht die ~~Wassertheilchen~~ z an sich: doch diese Anziehung verhindert die Wirkung des Glaspunkts y nicht. Die Richtung der anziehenden ~~Wassertheilchen~~ z ist Horizontal: nicht aber von y : mithin sind diese zwei ~~Wassertheilchen~~ z einander nicht zuwider, denn beyde Richtungen machen einen ~~Winkel~~ 90° miteinander.

§. 75.

Wenn ein Gläschen ganz mit Wasser gefüllet wird, also es über den Rand erhoben steht: wird die Oberfläche Concav seyn. Weil die über den Rand stehende ~~Wassertheilchen~~ z von dem Luft, den sie unmittelbar berühren, abgezogen werden. (Fig. 22.) Diese ~~Wassertheilchen~~ z ziehen nach der Horizontalrichtung gegen die Mitte des Glases, wo sich das Wasser häufen, und mithin eine erhobene, oder ~~Wassertheilchen~~ z annehmen muß, bis endlich die über die Horizontale erhobene Wassersaule $bb\ ee$ schwerer wird, als die an ~~Wassertheilchen~~ z des Wassers ist. Geschieht dieß, so wird die mittlere ~~Wassertheilchen~~ z des wasserseitigen Wasser an allen Orten über den Rand hin ~~Wassertheilchen~~ z . Und dieses nennen wir das Ueberfließen.

§. 76.

Wenn ein hölzernes, gläsernes, oder aus einer andern Materie (das Metall ausgenommen) verfertigtes Geschirr mit Quecksilber gefüllet wird: sehen wir die Oberfläche allezeit in eine erhobene kugelförmige Figur sich krümmen.

ABCD sey ein gläsernes Geschirr (Fig. 23.) Die Oberfläche des Quecksilbers theilen wir in 3. Lagen auf *mc*, *nc*, *bc*. Die Quecksilbertheile *ors* werden stärker von den nächstgelegenen Merkurtheilen, als von den Glaspunkten angezogen, mithin müssen sie sich von diesen entfernen, und gegen die Mitte ziehen. Dieses kann nicht geschehen, ausgenommen die Oberfläche bekommt die erhobene, und convexe Figur.

§. 77.

Anmerkung. Die Erfahrung lehret, daß die Höhle, die zwischen dem Merkur, und Glas zeigt, nicht bis auf die Grundfläche reicht, welches doch in unserer Theorie geschehen müßte, indem alle dem Glas nächste Theile mehr von dem Quecksilber, als von Glaspunkten angezogen werden.

Dieser Beschwerniß abzuheffen, ist zu merken, daß die Quecksilbertheile *ors* zwar mit gleicher Kraft von den ihnen nächst zur Mitte liegenden Merkurpunkten angezogen werden, doch aber nicht auf gleiche Weise von dem Glas sich entfernen. *o* entfernt sich mehr als *r*. $r > s$. Wir können diese Entfernungen mit Linien ausdrücken. (Fig. 24.)

Warum entfernt sich *o* von dem Glas mehr als *r*? ober dem ist das Quecksilber-Küglein *o*, welches auf alle Seiten drückt, und sonderlich auf jene Seite seinen Druck äußert, wo einen mindern Widerstand giebt. Weil es dann einen mindern Widerstand in der mit Luft gefüllten Höhle giebt, müssen sich die Theile *r* dem Glas mehr nähern.

Gleiche Verwandniß hat es mit dem Theile *s*. Ober diesen liegen zwey Quecksilber-Küglein, welche ihren Druck auf alle Sei-

ten äußern, mithin muß dieses näher dem Glas kommen, als die oben *r* und *s*. Und also von den andern zu reden.

Wenn endlich die obern Quecksilberkügelein so viele sind, daß derer Schwere der anziehenden Kraft das Gleichgewicht halbet, so können sich die Merkurpunkte nicht mehr von dem Glas entfernen. Mithin muß das Quecksilber in einem 3. B. gläsernen Geschirr jener Figur behaupten, die wir (Fig. 23. N. 2.) vorstellen.

Anwendung.

Der von der anziehenden Kraft gegebenen Lehre auf den Reich der Thiere.

§. 78.

Schön, ja unvergleichlich schön und aller Bewunderung würdig ist die Maschine des Körpers eines Thieres. Denn eben diejenigen ordentlichen Bewegungsgesetze, dardurch das Weltgebäude seiner Dauer erhalten wird, eben diejenigen vortreflichen Maximen, welche machen, daß Schönheit, und Ordnung beständig die Oberhand hat, findet sich in dem menschlichen Körper. Wir treffen in unserem Eingeweide mehr Bewunderungswürdiges an, als in den tiefsten Gräften der Erde, und ein einziges Fäserchen eines Muskels, und Nerve ist künstlicher verfertigt, als alle Pyramiden der Aegyptier, und alle die prächtigen Denkmahle, welche die Ehrbegierde um den Schatten einer Unsterblichkeit zu erhaschen, hervorgebracht.

Ich gedenke nicht in diesem weitschichtigen Reiche mich lange aufzuhalten, indem ich in selben all zu unerfahren, und meine Kräfte nicht hinreichend sind, die Beschwernisse, welche in selben anzutreffen zu erörtern. Ich werde einzig und allein mit dieser Frage mich beschäftigen, ob meine Grundsätze von dem Anfang der flüssigen Materien

n an die soliden, und den Erscheinungen der Haarröhrchen in
Reiche der Thiere Statt und Platz finden.

Von der Ernährung des Thieres.

§. 79.

Nach der allgemeinen Lehre der jetzigen Leibärzte sind die
Milchgefäße gleichsam ein Geweb von ungemein zarten Fäserlein,
Haarröhrchen, welche in dem Mesenterio, oder jener Haut,
die Gedärme umwickelt, zu sehen, und ihre Oefnungen gegen die
Därme haben. Nun, daß in diese Milchgefäße der Chylus, oder
Milchsaft hineindringe, ist eine unter den Arzneyverständigen gewisse
Sache.

Daß aber dieser Milchsaft nicht aus angebohrner Leichtigkeit,
noch auch wegen der peristaltischen Bewegung der Gedärme in
Milchgefäße getrieben werde; ist wiederum gewiß, und zwar das
ist aus der Naturlehre: das Zweyte aber wegen wichtigen Gründen,
welche beyzubringen weder die Zeit, weder mein Vorhaben mit-
theilt. Unumstößliche Beweise dieses Satzes sind in der Physio-
logie des Herrn Professor Krüger.

Ich gestehe zwar gerne, daß die peristaltische Bewegung der
Därme etwas beptragen könne zu der Geschwindigkeit des in
Milchgefäße dringenden Milchsaftes: doch die wahre, und eine
Ursach des Hineindringens kann selbe unmöglich seyn.

§. 80.

Wir dürfen der wahren Ursach nicht viel nachforschen; es ist
bekannt, daß die Milchgefäße aus einem zärtesten Häutlein verfertigte
Röhrchen sind.

Eine Haut, wenn man sie auf die Oberfläche legt, sinkt endlich und endlich zu Boden, wenn sie g
Saft eingesogen.

Der Chylus hat fast gleiche Schwere mit d
dann die Milchgefäße aus zarten Häutlein bestehen,
schwererer Art, als der Milchsaft (S. 27. 28. & seq.)
von schwererer Art, so muß der Milchsaft an diese G
gen, ja gar in die Höhle dieser Haarröhrchen hinein
67. 68. 69.)

Diese Wirkung wird desto größer seyn, je K
dung der Milchgefäße, und je mehr die innere Hö
denn beydes trägt sehr vieles bey, daß mehrere Theile
kommen, und mithin die anziehende Kraft stärker we

§. 81.

Ich habe kurz vorher gesagt, daß die anzi
der Milchgefäße desto größer sey, je kleiner d
der Haarröhre ist.

Wie kann aber ein Haarröhrchen eine flüssig
ziehen, wenn selbe nicht versehen ist mit zwey Oeffnun
ja aus beständiger Erfahrniß, daß, wenn ein Ha
Glas auf einer Seite hermetisch geschlossen ist, kein
fers in die auf die flüssige Oberfläche passende Oeffnu
ge, weil der innere unbewegliche Luft mit seiner ganze
Wasser drückt, und also das Hinaufsteigen hindert.

Ich gestehe gar gerne, daß, wenn die Kapilla
nicht zwey Oeffnungen hätten, nicht der mindeste S
saftes in selbe würde dringen können. Die erste O

Anatomie lehret, ist gegen die Gedärme; und diese ist sehr klein: theils, damit die anziehende Kraft desto größer sey (§. 21. 22.) theils auch, damit nicht die größern Theile des Milchsaftes in selbe dringen, und eine Verstopfung der Milchgefäße verursachen möge. Die zweyte Oefnung ist gegen den Brustkanal (ductus thoracicus,) an welchen die Milchgefäße anschließen. Der Brustkanal hängt mit den Adern, diese aber mit den Schweißlöchern zusammen.

§. 82.

Auf diese Grundsätze fußt sich der Wachsthum, und Ernährung der Thiere. Der ganze menschliche Körper ist aus einer unbeschreiblichen Menge kleiner zarter Röhrchen zusammengesetzt; mithin ein rechtes Geweb von lauter Haarröhrchen.

Nun in diese Fäserchen wird der überaus flüssige Nahrungsaft hineingezogen, wenn auch kein anderer Trieb vorhanden wäre, und zu allen Punkten des Körpers hingeföhret.

Ich läugne nicht, daß zur fernern Bewegung des Nahrungsaftes auch andere Ursachen vieles beytragen. z. B. die Ventile, welche sonderlich in dem Brustkanale sich äußern, das Schlagen, und Klopfen der großen Pulsader, die ganz nahe daran liegt, und so weiter.

Aus allem dem folget, daß, wenn der Mensch keine Speis und Tranck genießt, kein Chylus, oder Nahrungsaft könne zubereitet werden, gehet aber der Nahrungsaft ab: so wird auch die Ernährung sein Ende haben, und mithin der Tod erfolgen. Also schließt die menschliche Vernunft.

Dem ungeacht haben wir widrige Beyspiele, aus welchen wir erlernen, daß es möglich ist, ohne Speis zu leben.

In die neuesten Augsburger Zeitungen von dem Jahre 1774.

M m 3

dem

Haarrohr $F A B C$ hinauf steigt, können wir füglich in zween Theile austheilen, nämlich in das Wasserrohr $B p r c$, welches der innern Fläche des Glases am nächsten ist, und in den mittlern Wasser-Cylinder $q H$, welcher von dem Glase entfernter ist. Weil das hohle Wasserrohr $p B r C$ sehr dünn, haben wir aus dessen Schwere nicht Achtung zu geben, wohl aber auf den dickern Wasser-Cylinder $q H$.

Die anziehende Kraft der Glaszirkul erstrecket sich auf eine sehr kleine Entfernung (S. 59.) die wir durch die Linie $m n$ ausdrücken. Derothalben wird die anziehende Kraft der Glaspunkte sich nur erstrecken auf die ihnen nächste Wassertheile $p B r c$: nicht aber auf den mittlern Wasser-Cylinder $q H$.

Wenn dem also, warum steigt die mittlere Säule $q H$ mit den Wassertheilen $p B r C$ in die Höhe? dieses geschieht nicht aus Antrieb der anziehenden Kraft des Glases: nein, sondern weil die Theile des Cylinders $q H$ mit den angezogenen Theilen $p B r c$ zusammenhängen. S. 44.

Diese verbindende Kraft ist in denen Wassertheilchen so groß, daß an dem obersten hohlen Wasserring $p r$ ein Wasser-Cylinder hängen kann, dessen sammentliches Wasser einer mittelmäßigen Erbs an Dicke und Größe gleicht S. 43.

Nun haben die fürtreffliche Männer Bulfinger und Weibrecht erfahren, daß alles jenes Wasser, welches sich in einem Haarrohr befindet, einem Wassertropfe gleiche, von dem wir weitläufiger S. 43. geredet.

So ist nun nicht hart zu errathen, warum das Wasser desto höher steigt, je kleiner der Durchmesser der Haarröhrchen ist, wie in Fig. 20. zu sehen. Je kleiner die innere Höhle ist, je länger

ger geht es her, bis die steigende flüssige Materie die Größe und Schwere einer mittelmäßigen Erbs bestimmet, und die Summa der Hindernissen das Gleichgewicht mit der anziehenden Kraft erreicht. Doch ist diese Ursach noch nicht hinlänglich.

Erste Anmerkung.

§. 71.

Ich behaupte keineswegs, daß in alle Haarröhrchen gleiche Quantität Wasser sich befinde, und allezeit nur ein Tropfen Wasser hineinsteigen müsse. Denn wenn dieses wäre, so müßten die mit einerley flüssigen Materien erfüllten Haarröhrchen jederzeit von gleichen körperlichen Inhalt seyn. Nun sind sie Cylinder, und wenn zwey Cylinder einander gleich seyn sollen: so müssen sie ihre Höhen umgekehrt wie ihre Grundfläche verhalten. Weil aber ihre Grundflächen Zirkul sind, und die Zirkul sich wie die Quadrat ihrer Durchmesser verhalten, so würden sich die Höhen der flüssigen Materien, in Haarröhrchen von verschiedener Weite, umgekehrt wie die Quadrate der diametrorum, dieser Haarröhrchen verhalten müssen. Es mußte also das Wasser viermal so hoch in ein Haarröhrchen hinaufsteigen, welches im Diameter nur halb so groß wäre, als ein anderes, wenn jederzeit ein Tropfen Wasser hineinsteigen sollte. Es lehret aber die Erfahrniß, daß das Wasser in einem Haarröhrchen nur noch einmal so hoch steht, wenn es im Diameter nur halb so weit ist, als ein anderes: und zweitens, daß in einem Haarrohr von größeren Diameter mehr Wasser zu finden, als in einem andern von kleineren Diameter.

Was ist wohl die Ursach, daß sich die Höhe einerley flüssiger Materie umgekehrt, wie die Diametri der Haarröhrchen verhalte? wir müssen auf die Lehre zurückkehren, die wir §. 63. gegeben.

geben. Das Wasser widersteht dem Hinauffsteigen nicht nur allein wegen seiner Schwere, sondern auch wegen des Zusammenhangs seiner Theilchen.

Verhinderte die Schwere allein das Hinauffsteigen, so müßte sich die Höhe des Wassers umgekehrt, als wie die Quadrat der diametrorum verhalten. Allein, weil desto mehr Wassertheilchen von einander getrennt werden müssen, je enger das Haarröhrchen ist, so widersteht das Wasser wegen des Zusammenhangs seiner Theile noch einmal so stark, wenn der Diameter des Haarröhrchen noch einmal so klein ist.

Es sey z. B. der Diameter des einen Haarröhrchen $A = 1$. der Diameter des andern $B = 2$. so verhält sich die Höhe des Wassers in dem Haarröhrchen A zu der Höhe in B , wenn wir allein auf die Schwere sehen, wie 4 zu 1. Sehen wir aber auf den Zusammenhang, auf die Zähigkeit des Wassers: so verhält sich die Höhe in A zu der Höhe in B wie 1 zu 2. Verbinden wir endlich beides mit einander, gleichwie es in der Natur jederzeit verbunden ist, so verhält sich die Höhe des Wassers im Haarröhrchen A zu der Höhe desselben im Haarröhrchen B wie 4 zu 2, das ist, wie 2 zu 1, und also umgekehrt, wie die Diametri der Haarröhrchen.

Zweite Anmerkung.

§. 72.

Gleichwie die flüssige Materie am Gewichte, so sind sie auch verschieden an Zusammenhang und Zähigkeit deren Theile. Die Erfahrniß lehret, daß die Zähigkeit gar nicht proportionirt sey dem Gewichte. Das Del ist leichter als das Wasser, und dennoch hängen

gen seine Theile stärker zusammen, und sind zähiger als die Wassertheile.

Derohalben, weil unter den Hindernissen, die sich dem Hinaufsteigen flüssiger Materien widerlegen, auch der Zusammenhang und Zähigkeit deren Theile ist, so folget, daß je größer diese, je kleiner wir die Höhe seyn. Mithin werden wir uns nicht zu verwundern haben, wenn zuweilen flüssige Materien, die leichter sind, nicht so hoch in den Haarröhrchen steigen, als die schwerere. Beispiele Dieser Lehre haben wir genug.

Von der hohlen und convergen Ueberfläche flüssiger Materien.

§. 73.

Die Erfahrung lehret, daß, wenn Wasser in ein Geschire, absonderlich in ein gläsernes geschüttet wird, die Oberfläche nicht den Horizont parallel, sondern an dem Rande, wo es das Glas berührt, höher, und mithin concav sey.

Diese Wirkung ist eine Folge unserer Theorie.

Ein Geschirre von Glas $ABCD$ (Fig. 21. N. 1.) fülle ich mit Wasser bis an die Höhe xz : ein Glaspunkt y sey in einer sehr kleinen Entfernung von den auf der Oberfläche liegenden Wassertheilen $a b c$: doch so, daß seine anziehende Kraft mehr in a als b , und und mehr in b als c wirke. (§. 59.) Der Wassertheil a wird sich von dem unter ihm liegenden Wasser absondern, und dem Glaspunkt y nähern. Der Wassertheil b wird sich zwar auch dem y nähern; doch nicht so sehr wie a . c wird fast in seiner alten Lage liegen bleiben. Diese angezogene Theile ziehen andere Wassertheile, welche am nächsten unter ihnen liegen, mit sich, und also wird allenthalben

an dem Stande des Geschirrs ein kleiner steiler Berg zu sehen seyn, welcher aus Wäßertheilchen bestehet, wie in der nämlichen (Fig. 21. N. 2.) zu ersehen.

§. 74.

Anmerkung. Wahr ist es, der Glaspunkt x zieht die Wäßertheile $a b c$ an sich: doch diese Anziehung verhindert die wirkende Kraft des Glaspunkts y nicht. Die Richtung der anziehenden Potenz x ist Horizontal: nicht aber von y : mithin sind diese zwei Potenzen einander nicht zuwider, denn beyde Richtungen machen einen Winkel miteinander.

§. 75.

Wenn ein Gläschen ganz mit Wäßer gefüllet wird, also daß selbes über den Rand erhoben steht: wird die Oberfläche Convex, und nicht Concav seyn. Weil die über den Rand stehende Wäßertheile minder von dem Luft, den sie unmittelbar berühren, als von dem übrigen Wäßer gezogen werden. (Fig. 22.) Diese Anziehung geschieht nach der Horizontalrichtung gegen die Mitte des Geschirrs, wo sich das Wäßer häufen, und mithin eine erhobene, oder convex Figur annehmen muß, bis endlich die über die Horizontalinie $a b b c$ erhobene Wäßersaule $b b e e$ schwerer wird, als die anziehende Kraft des Wäßers ist. Geschieht dieß, so wird die mittlere Säule das nebensitige Wäßer an allen Orten über den Rand hin ausdrücken. Und dieses nennen wir das Ueberfließen.

§. 76.

Wenn ein hölzernes, gläsernes, oder aus einer andern Materie (das Metall ausgenommen) verfertigtes Geschirr mit Quecksilber gefüllet wird: sehen wir die Oberfläche allezeit in eine erhobene convexe Figur sich krümmen.

$ABCD$ sey ein gläsernes Geschirr (Fig. 23.) Die Oberfläche des Quecksilbers theilen wir in 3. Lagen auf mc, nc, bc . Quecksilbertheile ors werden stärker von den nächstgelegenen Kurtheilen, als von den Glaspunkten angezogen, mithin müssen sich von diesen entfernen, und gegen die Mitte ziehen. Dieses kann nicht geschehen, ausgenommen die Oberfläche bekommt eine erhobene, und convexe Figur.

§. 77.

Anmerkung. Die Erfahrung lehret, daß die Hölle, die zwischen dem Merkur, und Glas zeigt, nicht bis auf die Grunde reicht, welches doch in unserer Theorie geschehen müßte, in- dem alle dem Glas nächste Theile mehr von dem Quecksilber, als von Glaspunkten angezogen werden.

Dieser Beschwerniß abzuheffen, ist zu merken, daß die Quecksilbertheile ors zwar mit gleicher Kraft von den ihnen nächst zur Mitte liegenden Merkurpunkten angezogen werden, doch aber nicht auf gleiche Weise von dem Glas sich entfernen. o entfernt sich mehr als r . $r > s$. Wir können diese Entfernungen mit Linien ausdrücken. (Fig. 24.)

Warum entfernt sich o von dem Glas mehr als r ? ober dem ist das Quecksilber-Küglein o , welches auf alle Seiten drückt, besonders auf jene Seite seinen Druck äußert, wo einen mindern Widerstand giebt. Weil es dann einen mindern Widerstand der mit Luft gefüllten Hölle giebt, müssen sich die Theile r dem Glas mehr nähern.

Gleiche Verwandniß hat es mit dem Theile s . Ober diesen liegen zwey Quecksilber-Küglein, welche ihren Druck auf alle Sei-

ten

ten

ten äußern, mithin muß dieses näher dem Glas kommen, als die *r* und *s*. Und also von den andern zu reden.

Wenn endlich die obern Quecksilberkügelein so viele sind, derer Schwere der anziehenden Kraft das Gleichgewicht halter können sich die Merkurpunkte nicht mehr von dem Glas entfernen. Mithin muß das Quecksilber in einem 3. B. gläsernen Gefäß in dieser Figur behaupten, die wir (Fig. 23. N. 2.) vorstellen.

Anwendung.

Der von der anziehenden Kraft gegebenen Lehre auf
Reich der Thiere.

§. 78.

Schön, ja unvergleichlich schön und aller Bewunderung würdig ist die Maschine des Körpers eines Thieres. Denn eben die göttlichen Bewegungsgesetze, dadurch das Weltgebäude seiner Dauer erhalten wird, eben diejenigen vortreflichen Maximen, welche machen, daß Schönheit, und Ordnung beständig die Hand hat, findet sich in dem menschlichen Körper. Wir treffen in unserem Eingeweide mehr Bewunderungswürdiges an, als in den besten Gräften der Erde, und ein einziges Fäserchen eines Muskels oder Nerve ist künstlicher verfertigt, als alle Pyramiden der Aegypten, alle die prächtigen Denkmäler, welche die Ehrbegierde um den Gedanken einer Unsterblichkeit zu erhaschen, hervorgebracht.

Ich gedenke nicht in diesem weitläufigen Reiche mich aufzuhalten, indem ich in selben all zu unerfahren, und meine Kenntnisse nicht hinreichend sind, die Beschränkungen, welche in selben anzutreffen zu erörtern. Ich werde einzig und allein mit dieser Frage beschäftigt, ob meine Grundsätze von dem Anfang der flüssigen
te

an die soliden, und den Erscheinungen der Haarröhrchen in
Reihe der Thiere Statt und Platz finden.

Von der Ernährung des Thieres.

§. 79.

Nach der allgemeinen Lehre der jetzigen Leibärzte sind die
Milchgefäße gleichsam ein Geweb von ungemein zarten Fäserlein,
Haarröhrchen, welche in dem Mesenterio, oder jener Haut,
die Gedärme umwickelt, zu sehen, und ihre Oefnungen gegen die
Därme haben. Nun, daß in diese Milchgefäße der Chylus, oder
Milchsaft hineindringe, ist eine unter den Arzneyverständigen gewisse
Sache.

Daß aber dieser Milchsaft nicht aus angebohrner Leichtigkeit,
noch auch wegen der peristaltischen Bewegung der Gedärme in
Milchgefäße getrieben werde; ist wiederum gewiß, und zwar das
kann aus der Naturlehre: das Zweyte aber wegen wichtigen Gründe,
welche bezubringen weder die Zeit, weder mein Vorhaben mit
bringt. Unumstößliche Beweise dieses Satzes sind in der Physiolo-
gie des Herrn Professor Krüger.

Ich gestehe zwar gerne, daß die peristaltische Bewegung der
Därme etwas beitragen könne zu der Geschwindigkeit des in
Milchgefäße dringenden Milchsaftes: doch die wahre, und einzige
Ursach des Hineindringens kann selbe unmöglich seyn.

§. 80.

Wir dürfen der wahren Ursach nicht viel nachforschen; es ist
klar, daß die Milchgefäße aus einem zärtesten Hautlein verfertigte
Haarröhrchen sind.

Eine Haut, wenn man sie auf die Oberfläche einer
 leget, sinkt endlich und endlich zu Boden, wenn sie genug von
 Saft eingefogen.

Der Chylus hat fast gleiche Schwere mit der Milch.
 dann die Milchgefäße aus zarten Häutlein bestehen, so sind
 von schwererer Art, als der Milchsaft (§. 27. 28. & seq.) Sind
 von schwererer Art, so muß der Milchsaft an diese Gefäße
 gen, ja gar in die Höhle dieser Haarröhrchen hineindringen
 (67. 68. 69.)

Diese Wirkung wird desto größer seyn, je kleiner die
 dung der Milchgefäße, und je mehr die innere Höhle benet
 denn beydes trägt sehr vieles bey, daß mehrere Theile zur Ber
 kommen, und mithin die anziehende Kraft stärker werde. (§. 21

§. 81.

Ich habe kurz vorher gesagt, daß die anziehende
 der Milchgefäße desto größer sey, je kleiner die Mündung
 der Haarröhre ist.

Wie kann aber ein Haarröhrchen eine flüssige Materie
 ziehen, wenn selbe nicht versehen ist mit zwey Oeffnungen? wir
 ja aus beständiger Erfahrung, daß, wenn ein Haarröhrchen
 Glas auf einer Seite hermetisch geschlossen ist, kein Tropfen
 fers in die auf die flüssige Oberfläche passende Oeffnung hinei
 ge, weil der innere unbewegliche Luft mit seiner ganzen Kraft
 Wasser drückt, und also das Hinaufsteigen hindert.

Ich gestehe gar gerne, daß, wenn die kapillaren Milch
 nicht zwey Oeffnungen hätten, nicht der mindeste Theil des
 saftes in selbe würde dringen können. Die erste Oeffnung,

atomie lehret, ist gegen die Gedärme; und diese ist sehr klein, damit die anziehende Kraft desto größer sey (§. 21. 22.) theils, damit nicht die gröbern Theile des Milchsaftes in selbe dringen, und eine Verstopfung der Milchgefäße verursachen möge. Die obere Oefnung ist gegen den Brustkanal (ductus thoracicus,) an welchen die Milchgefäße anschließen. Der Brustkanal hängt mit den Lymphgefäßen zusammen, diese aber mit den Schweißlöchern zusammen.

§. 82.

Auf diese Grundsätze fußt sich der Wachsthum, und Ernährung der Thiere. Der ganze menschliche Körper ist aus einer unbeschreiblichen Menge kleiner zarter Röhrchen zusammen gesetzt, worin ein rechtes Geweb von lauter Haarröhrchen.

Nun in diese Fäserchen wird der überaus flüssige Nahrungsaft hineingezogen, wenn auch kein anderer Trieb vorhanden wäre, zu allen Punkten des Körpers hingeföhret.

Ich läugne nicht, daß zur fernern Bewegung des Nahrungsaftes auch andere Ursachen vieles beytragen. z. B. die Ventile, welche sonderlich in dem Brustkanale sich äußern, das Schlagen, und Pulsen der großen Pulsader, die ganz nahe daran liegt, und so weiter.

Aus allem dem folget, daß, wenn der Mensch keine Speise trinkt, genießt, kein Chylus, oder Nahrungsaft könne zubereitet werden, gehet aber der Nahrungsaft ab: so wird auch die Ernährung sein Ende haben, und mithin der Tod erfolgen. Also schließt menschliche Vernunft.

Dem ungeacht haben wir widrige Beispiele, aus welchen wir erlernen, daß es möglich ist, ohne Speise zu leben.

In die neuesten Augsburger Zeitungen von dem Jahre 1774.

Von der Absönderung der flüssigen Materien.

§. 83.

Es ist rühmlich die Natur bewundern, aber noch viel rühmlicher dieselbe kennen zu lernen. Es ist die Natur der beste Chymist. Gewiß die Absönderung der flüssigen Materie von dem Blut, welche zur Erhaltung des Lebens so nothwendig, als nützlich ist, ist ein Meisterstück ihrer Geschicklichkeit. Der Speichel, der Schleim, die Galle, oder pancreatische Saft, das Fett, die Lympha, der Schweiß, der Urin, dieses alles sind Materien, welche von dem Blute sind abgesondert worden.

Dies alles zu bewerkstelligen, bedienet sie sich des einfachesten Mittels der Haarröhrchen. Mithin haben auch in dieser Materie unsere Grundsätze von den Haarröhrchen, und dem Anhang flüssiger Materien an die soliden Statt, und Platz.

§. 84.

Die Anatomiker lehren, daß, wo die Blutgefäße so klein werden, daß nur immer ein Blutkügelchen nach dem andern hindurch gehen kann, sehr zarte Nebengefäße befindlich sind, derer eine Oefnung in die kleinsten Pulsadern hinein gehet. Diese Gefäße sind demnach nicht geschikt, Blut zu führen. Indessen sind sie doch nicht umsonst vorhanden, sondern, da sich allerley Feuchtigkeiten bey dem Blute befinden, welcher subtiler sind, als die Blutkügelchen (sintemal diese den gröbsten Theil des Bluts ausmachen) so müssen dergleichen Feuchtigkeiten in solche zarte Nebengefäße hineindringen.

§. 85.

Diese Nebengefäße nennen wir **Drüsen**. Es ist mithin eine
Drüse

Drüse nichts anders, als ein Geweb von Haarröhrchen, welche die kleinsten Pulsadern an Härte übertreffen. Diese ziehen die flüssigen Materien von leichterer Art an sich, auf eben jene Weise, wie wir (S. 66.) gesagt.

Diesem zu Folge treibet die anziehende Kraft eine flüssige Materie zwar in die Drüse hinein, Daß aber eben diese flüssige Materie durch den Abführungsgang wieder heraus gehe, welches höchlich nöthig zur Erhaltung des Lebens ist, kann durch die anziehende Kraft nicht geschehen. Man versuche es nur, und nehme das aller kürzeste Haarröhrchen, so wird an dem andern Ende nichts von der flüssigen Materie heraus fließen, ob sie gleich in einem längern viel höher würde hinauf gestiegen seyn.

Wenn dem also, so muß eine Kraft hinzu kommen, welche stärker ist, als die anziehende Kraft dieser kleinen Gefäße. Diese Kraft ist der Trieb des beständig sich bewegenden Bluts, und zwar nicht die Vornehmste, viel minder die einzige, doch aber eine Nebenursach der Absonderung der flüssigen Materien von dem Blut.

§. 86.

Warum aber in dieser Drüse diese, in einer andern eine andere Feuchtigkeit von dem Blute abgesondert werde: warum eben in der Leber die Galle, in den Nieren der Urin, in dem Pankreas der paccireatische Saft, in den Speicheldrüsen der Speichel, und in andern Orten eine andere flüssige Materie von dem Blute abgesondert werde, ist eine Frage, in deren Entscheidung die Herren Medici nicht übereins kommen.

Wenn wahr ist, was Herr Professor Krüger behauptet nämlich, daß die Drüsen von ihrem ersten Ursprung an mit einer gewissen Gattung der flüssigen Materie benetzt sind; so kann ich

etwas

es faßen, warum z. B. in der Leber nur die Galle abgesondert
 de: denn sie ist von ihrem ersten Ursprung her mit einer Galle be-
 z. Gleichwie dann in einem mit Oel benehten Haarröhrchen das
 ißer nicht durchdringen kann, auf gleiche Weise kann auch z. B.
 Lympha in die zuvor schon mit Galle benehte Leberdrüsen nicht
 indringen. Ob der Grund dieser Explication nicht erdichtet sey
 ich den Herren Medicts zu beurtheilen über.

Von dem Ausdämpfen.

§. 87.

Sollte unser Körper ernähret werden können, so müßte er
 Haarröhrchen bestehen, in welchen sich eine flüssige Materie be-
 zt. Müßte er aus Haarröhrchen bestehen, in welchen sich eine
 iße Materie bewegen sollte, so war es ganz unvermeidlich, daß
 e harte Röhre ihre Eröfnungen hatte (§. 81.)

Nun diese Eröfnungen, derer viele tansend und tausend auf
 Oberhautlein (Epidermis) sind, nennen wir die *Schweißlö-*
er, und sind in der That nichts anders, als die zweyte Eröfnung
 Haarröhrchen, und ist derer Anzahl so groß, als die Menge der
 arröhrchen ist.

§. 88.

Eine Feuchtigkelt, welche einen größern Grad der Wärme
 it, als die Luft, und zu welcher die Luft freyen Zutritt hat, wird
 und nach in Dünste verwandelt, indem außer der Luft, der Wär-
 , und der Feuchtigkelt nichts anders zur Ausdünstung einer flüssi-
 Materie erfordert wird.

Nun, unser menschliche Körper ist gewiß wärmer, als die
 Luft,

Luft, die ihn umgiebt. Ist aber der Körper wärmer, so sind auch die in dem Körper befindliche Feuchtigkeiten wärmer, mithin ist es gar nicht zu verwundern, wenn sie durch die Schweißlöcher ausdunstet.

§. 89.

Daß die Menge dieser ausdunstenden Feuchtigkeiten sehr verschieden seyn, können wir an dem abnehmen, daß ein Hund die Spur seines Herrn auf eine sehr große Weite zu entdecken weiß: welches nicht schehen könnte, wenn nicht aus den Füßen ausgedunstete Feuchtigkeiten von der Erde angezogen, den Weg gleichsam bedeckten, dem Hund zu einem Wegweiser dienen.

Anwendung.

Auf das Reich der Pflanzen.

§. 90.

Die Thiere, und Pflanzen haben viele Aehnlichkeit mit einander. Ich betrachte in dem überaus ordentlichen, und künstlichen Bau der Pflanzen nur zweien Theile, welche zu meinen Vorhaben am meisten dienen: nämlich die Gasteröhren, und Bläschen.

Daß es in einer Pflanze ungemein viele, zarte, mit Nahrungsaft angefüllte Capillarröhren giebt, kann man in dem Saft eines Blattes mit Vergnügen sehen. Man lege das Blatt in Wasser, und laße es darin so lange liegen, bis es in die Verfäulung geräth. Nun, weil die übrigen Theile des Blattes zarter sind, die Röhre, aus welchen das Blatt besteht, werden sie auch ehe in die Verfäulung kommen. Wenn man dieses Blatt auf die Haut legt, und mit der andern darüber wegstreicht, so ziehet sich die Haut davon ab, und gehet zugleich mit der bläßigten Materie, sic

durch die Fäulniß in einen Schleim verwandelt hat, hinweg. Es bleibt also nichts mehr übrig, als die Röhre, derer einige überaus hart sind, und dennoch sind sie nur zusammengesetzte Röhre. Wie ungemein, ja fast unendlich zart werden die einfachen Haarröhrchen der Pflanze seyn.

§. 91.

Diesen Haarröhrchen hat die Pflanze, großen Theils sein Leben zu danken. Kommt das Wasser, mit welchem die Erde besäet ist, zu der Wurzel, so trifft es daselbst viele Capillarröhrre von schwererer Art an. Von diesen werden die Wassertheilchen stark angezogen, und kommen also von der Wurzel in den Stamm, von diesem in die Aeste, und Blätter.

§. 92.

Ich muß zwar gestehen, daß man zwischen dem Aussteigen der flüssigen Materien in einem engen gläsernen Rohr, das nur einige Elle hoch ist, und dem Aufsteigen des Saftes in einer Eiche, wenn man solches miteinander vergleicht, einigen Unterschied gewahr wird. Dieser einen Philosophen fast auf die Gedanken bringen sollte, daß diese beiden Wirkungen nicht von einer einzigen Ursache herrühren. Doch wenn man erstens betrachtet, daß die einfachen Röhre so zart sind, daß man sie kaum, auch mit dem besten Vergrößerungsglase sehen kann, und zweytens, wenn man erwäget, daß durch den hohlen Körper der Pflanze eine große Menge hohler, und mit dem Nahrungssaft erfüllter Bläschen zerstreuet sind, an welche neue Capillarröhrre anschließen, und den Saft mit neuer Kraft anziehen, wird meines Erachtens der Zweifel ziemlich gehoben seyn.

Daß aber eine Menge kleiner Bläschen in dem Körper der Pflanze vorhanden, läßt sich nicht zweifeln. Man schneide ein kleines

nes Stück von einer Citronen-Schaale ab, und betrachte es in einem Vergrößerungsglase: so wird man sehr viele Höhlen, darin sich der wohlriechende Saft befindet, entdecken.

§. 93.

Eben darum, weil der Saft in den Capillarröhren in Höhe steigt, müssen diese an der Oberfläche der Pflanze Einrichtungen haben, welche wir, wie in dem Leibe des Thieres, Schwämme nennen: durch diese duften die wässerigen Theile aus, die dicken entgegen, dichten und salzigen Theilchen, weil sie schwerer sind, bleiben zurück. Sie hangen zusammen, dehnen die Pflanze aus, und machen, daß sie nach der Länge, Breite und Dicke zunimmt, und helfen ihre Schwere vermehren.

§. 94.

Die Krankheiten, ja endlich der Tod der Pflanzen geschieht fast auf gleiche Art, wie in dem Menschen. In dem Körper des Menschen werden die wässerigen Theile beständig durch eine unmerkliche Ausdünstung abgeführt, die schwereren bleiben zurück hangen zusammen, und verursachen den Wachsthum und Ernährung des Körpers. Doch eben dieß, was die Ursach des Wachsthum und Ernährung ist, ist zugleich ein Mittel zu dessen unvermeidlichen Untergang. Es müssen sich nothwendig mit der Zeit so viele trübe Theilchen sammeln, welche die Fäserchen des menschlichen Körpers verstopfen, hart, und zu der Bewegung ungeschickt machen. Daher scheint es zu kommen, daß alte Leute so steif, und nicht sehr weiche Theile in ihnen zu Knochen werden. Es hören demnach die Bewegungen allgemach auf, und der Mensch stirbt ohne einen Schmerz zu fühlen. Dieses ist die natürlichste Art zu sterben, zugleich aber die seltenste, weil die meisten Menschen durch einen gewaltsamen Tod,

d, den sie sich selbst zugezogen haben, dahin gerissen werden, dasjenige Alter, welches sie natürlicher Weise hätten erhalten können, nicht erreichen.

Auch unter den Pflanzen sterben sehr viele eines, so zu re, , gewaltsamen Todes. Die Mörder der Pflanzen sind nebst ern Ursachen eine übertriebene Hitze, oder auch allzugroße Kälte. e macht, daß aus den Capillär Schweißlöcher mehrers von z Materie ausdünstet, als ihnen durch die Haarröhre der Wur, zugeführt: mithin müssen die Fäserchen der Pflanze schlapp wer-, , und verdorren: die allzugroße Kälte aber verursacht die Ge- tung des in den Capillarröhren, und hohlen Bläschen befindli- i Nahrungsafte. Mit einem Worte: beyde Ursachen zerstören ordentlich gebauten und organisirten Pflanzenkörper.

Anwendung

auf das Reich der Fossilien.

§. 95.

Zu dem Reich der Fossilien gehören Steine, Metall, und send andere Dinge. Ich werde mich in gegenwärtiger Materie ig und allein beschäftigen mit jenen Erscheinungen, welche uns die eisame, und um die ganze Naturlehre bestens verdiente Chemie decket.

Wir sehen die dicksten, und schweresten Metalle in einigen igen Materien in die kleinsten Theile auflösen. Wir sehen diese jehsten Theile mit der flüssigen Materie so vermischet, als wenn von leichterer Art, oder aufs wenigst von gleicher Schwere mit flüssigen Materie wären. Wir sehen die aufgelösten Theile als

Eine Haut, wenn man sie auf die Oberfläche einer Milch leget, sinkt endlich und endlich zu Boden, wenn sie genug von diesem Saft eingesogen.

Der Chylus hat fast gleiche Schwere mit der Milch. Wenn dann die Milchgefäße aus zarten Häutlein bestehen, so sind sie von schwererer Art, als der Milchsast (§. 27. 28. & seq.) Sind sie aber von schwererer Art, so muß der Milchsast an diese Gefäße sich hangen, ja gar in die Höhle dieser Haarröhrchen hineindringen (§. 64. 67. 68. 69.)

Diese Wirkung wird desto größer seyn, je kleiner die Mündung der Milchgefäße, und je mehr die innere Höhle benetzt ist; denn beydes trägt sehr vieles bey, daß mehrere Theile zur Berührung kommen, und mithin die anziehende Kraft stärker werde. (§. 21. 22.)

§. 81.

Ich habe kurz vorher gesagt, daß die anziehende Kraft der Milchgefäße desto größer sey, je kleiner die Mündung der Haarröhre ist.

Wie kann aber ein Haarröhrchen eine flüssige Materie anziehen, wenn selbe nicht versehen ist mit zwey Oeffnungen? wir wissen ja aus beständiger Erfahrung, daß, wenn ein Haarröhrchen aus Glas auf einer Seite hermetisch geschlossen ist, kein Tropfen Wasser in die auf die flüssige Oberfläche passende Oeffnung hinein dringt, weil der innere unbewegliche Luft mit seiner ganzen Kraft auf das Wasser drückt, und also das Hinaufsteigen hindert.

Ich gestehe gar gerne, daß, wenn die kapillaren Milchgefäße nicht zwey Oeffnungen hätten, nicht der mindeste Theil des Milchsastes in selbe würde dringen können. Die erste Oeffnung, wie die
Ana-

Anatomie lehret, ist gegen die Gedärme; und diese ist sehr klein: theils, damit die anziehende Kraft desto größer sey (§. 21. 22.) theils auch, damit nicht die gröbern Theile des Milchsaftes in selbe dringen, und eine Verstopfung der Milchgefäße verursachen möge. Die zweyte Oefnung ist gegen den Brustkanal (ductus thoracicus,) an welchen die Milchgefäße anschließen. Der Brustkanal hängt mit den Adern, diese aber mit den Schweißlöchern zusammen.

§. 82.

Auf diese Grundsätze fußt sich der Wachsthum, und Ernährung der Thiere. Der ganze menschliche Körper ist aus einer unbeschreiblichen Menge kleiner zarter Röhrchen zusammengesetzt; mithin ein rechtes Geweb von lauter Haarröhrchen.

Nun in diese Fäserchen wird der überaus flüssige Nahrungsaft hineingezogen, wenn auch kein anderer Trieb vorhanden wäre, und zu allen Punkten des Körpers hingeföhret.

Ich läugne nicht, daß zur fernern Bewegung des Nahrungsaftes auch andere Ursachen vieles beytragen. z. B. die Ventile, welche sonderlich in dem Brustkanale sich äußern, das Schlagen, und Klopfen der großen Pulsader, die ganz nahe daran liegt, und so weiter.

Aus allem dem folget, daß, wenn der Mensch keine Speis und Tranck genießt, kein Chylus, oder Nahrungsaft könne zubereitet werden, gehet aber der Nahrungsaft ab: so wird auch die Ernährung sein Ende haben, und mithin der Tod erfolgen. Also schließt die menschliche Vernunft.

Dem ungeacht haben wir widrige Beyspiele, aus welchen wir erlernen, daß es möglich ist, ohne Speis zu leben.

In die neuesten Augsbürger-Zeitungen von dem Jahre 1774.

M m 3

dem

dem 9. Februari erzehlen uns eine außerordentliche Krankheit einer 37 jährigen Weibsperson, welche sich in der Reichsstadt Rottweil befindet. Sie ist schon 3. Jahre krank. Die ersten zwey Jahr ihrer Krankheit hat sie keine andere Speis genommen, als geronnen Milch und Wasser. Ein ganzes Jahr hingegen, das letztere nämlich, genießt sie an Medicin, Speise oder Trank nicht das geringste und nimmt nicht einmal einen kalten Tropfen Wasser zu sich: hat dabey alle 3. Jahre hindurch, nach endlich eingezogenen Kundschaften nicht einen Augenblick Schlafes genossen. Sie redet verständlich, doch etwas still: höret, und sieht sehr gut; Fühlung aber hat sie keine andere, als mit den Händen, so sie noch bewegen kann, in dem der untere Leib keine Empfindlichkeit hat, und abgestorben scheint, doch dabey die natürliche Wärme behält. Man hat Proben gemacht, um zu erfahren, ob ihr Magen gar nichts von warmen Speisen gedulde. Man gab ihr etwas warme Suppenbrühe, oder etwas wenigens von einem lindgesottenem Ey. Sie mußte solches mit so grausamen Erbrechen wiederum von sich geben, daß man besorget, sie würde ihren Geist aufgeben. Diese Weibsperson lebt noch heut zu Tage schwächer. Diese bewunderungswürdige Umstände haben den Magistrat zu Rottweil bewogen, solche in öffentlichen Zeitungen bekannt zu machen.

Zu wünschen wäre es, daß diese Krankheit mit mehrern Umständen begleitet wäre. Uebrigens, wenn diese Weibsperson nichts, oder sehr wenig durch die natürlichen Ausgänge von sich begiebt, und dabey sehr wenig transpiriret, so können wir sagen, warum sie so lange Zeit das Leben ohne Essen und Trinken erhaltet. Die an der Patientinn noch merkliche Wärme ist ein Zeichen, daß sie beständig etwas wenigens ausdünste. Doch eben diese wenige, aber anhaltende Ausdünstung mag die Ursache seyn, warum diese Person von Tag zu Tag schwächer wird.

Von der Absönderung der flüssigen Materien.

§. 83.

Es ist rühmlich die Natur bewundern, aber noch viel rühmlicher dieselbe kennen zu lernen. Es ist die Natur der beste Chymist. Sie bewirkt die Absönderung der flüssigen Materie von dem Blut, welche zur Erhaltung des Lebens so nothwendig, als nützlich ist, ist ein Meisterstück ihrer Geschicklichkeit. Der Speichel, der Schleim, die Galle, der pancreatische Saft, das Fett, die Lympha, der Schweiß, der Urin, dieses alles sind Materien, welche von dem Blute sind abgesondert worden.

Dieses alles zu bewerkstelligen, bedienet sie sich des einfachsten Mittels der Haarröhrchen. Mithin haben auch in dieser Materie dieselbe Grundsätze von den Haarröhrchen, und dem Anhang flüssiger Materien an die soliden Statt, und Platz.

§. 84.

Die Anatomiker lehren, daß, wo die Blutgefäße so klein werden, daß nur immer ein Blutkügelchen nach dem andern hindurch gehen kann, sehr zarte Nebengefäße befindlich sind, derer eine Oefnung die kleinsten Pulsadern hinein gehet. Diese Gefäße sind demnach sehr geschickt, Blut zu führen. Indessen sind sie doch nicht umsonst vorhanden, sondern, da sich allerley Feuchtigkeiten bey dem Blute finden, welcher subtiler sind, als die Blutkügelchen (sintemal diese den größten Theil des Bluts ausmachen) so müssen dergleichen Feuchtigkeiten in solche zarte Nebengefäße hineindringen.

§. 85.

Diese Nebengefäße nennen wir **Drüsen**. Es ist mithin eine Drüse

Drüse nichts anders, als ein Geweb von Haarröhrchen, welche die kleinsten Pulsadern an Härte übertreffen. Diese ziehen die flüssigen Materien von leichterer Art an sich, auf eben jene Weise, wie wir (S. 66.) gesagt.

Diesem zu Folge treibet die anziehende Kraft eine flüssige Materie zwar in die Drüse hinein, Daß aber eben diese flüssige Materie durch den Abführungsgang wieder heraus gehe, welches höchst nöthig zur Erhaltung des Lebens ist, kann durch die anziehende Kraft nicht geschehen. Man versuche es nur, und nehme das allerfeinste Haarröhrchen, so wird an dem andern Ende nichts von der flüssigen Materie heraus fließen, ob sie gleich in einem längern viel höher würde hinauf gestiegen seyn.

Wenn dem also, so muß eine Kraft hinzu kommen, welche stärker ist, als die anziehende Kraft dieser kleinen Gefäße. Diese Kraft ist der Trieb des beständig sich bewegenden Bluts, und zwar nicht die Vornehmste, viel minder die einzige, doch aber eine Nebenursach der Absonderung der flüssigen Materien von dem Blute.

§. 86.

Warum aber in dieser Drüse diese, in einer andern eine andere Feuchtigkeit von dem Blute abgesondert werde: warum eben in der Leber die Galle, in den Nieren der Urin, in dem Pankreas der paccireatische Saft, in den Speicheldrüsen der Speichel, und an andern Orten eine andere flüssige Materie von dem Blute abgesondert werde, ist eine Frage, in deren Entscheidung die Herren Medici nicht übereins kommen.

Wenn wahr ist, was Herr Professor Krüger behauptet, nämlich, daß die Drüsen von ihrem ersten Ursprung an mit einer gewissen Gattung der flüssigen Materie benetzt sind; so kann ich

etwas

s saßen, warum z. B. in der Leber nur die Galle abgesondert
e: denn sie ist von ihrem ersten Ursprung her mit einer Galle be-
z. Gleichwie dann in einem mit Oel benehten Haarröhrchen das
fer nicht durchdringen kann, auf gleiche Weise kann auch z. B.
lympha in die zuvor schon mit Galle benehte Leberdrüsen nicht
ndringen. Ob der Grund dieser Explication nicht erdichtet sey
ich den Herren Medicis zu beurtheilen über.

Von dem Ausdampfen.

§. 87.

Sollte unser Körper ernährt werden können, so müßte er Haarröhrchen bestehen, in welchen sich eine flüssige Materie be-
 2. Müßte er aus Haarröhrchen bestehen, in welchen sich eine
 3. Materie bewegen sollte, so war es ganz unvermeidlich, daß
 4. harte Röhre ihre Eröffnungen hatte (§. 81.)

Nun diese Eröffnungen, derer viele tausend und tausend auf Oberhäutlein (Epidermis) sind, nennen wir die **Schweißlöcher**, und sind in der That nichts anders, als die zweyte Eröffnung **Haarrröhrchen**, und ist derer Anzahl so groß, als die Menge der **Haarrröhrchen** ist.

5. 88.

Eine Feuchtigkeit, welche einen größern Grad der Wärme hat, als die Luft, und zu welcher die Luft freyen Zutritt hat, wird und nach in Dünste verwandelt, indem außer der Luft, der Wärme und der Feuchtigkeit nichts anders zur Ausdünstung einer flüssigen Materie erfordert wird.

Nun, unser menschliche Körper ist gewiß wahrer, als die
 Luft,

Drüße nichts anders, als ein Geweb von Haarröhrchen, welche die Feinsten Pulsadern an Härte übertreffen. Diese ziehen die flüssigen Materien von leichterer Art an sich, auf eben jene Weise, wie wir (§. 66.) gesagt.

Diesem zu Folge treibet die anziehende Kraft eine flüssige Materie zwar in die Drüße hinein, Daß aber eben diese Flüssige Materie durch den Abführungsgang wieder heraus gehe, welches höchst nöthig zur Erhaltung des Lebens ist, kann durch die anziehende Kraft nicht geschehen. Man versuche es nur, und nehme das allerfeinsten Haarröhrchen, so wird an dem andern Ende nichts von der flüssigen Materie heraus fließen, ob sie gleich in einem längern viel höher würde hinauf gestiegen seyn.

Wenn dem also, so muß eine Kraft hinzu kommen, welche stärker ist, als die anziehende Kraft dieser kleinen Gefäße. Diese Kraft ist der Trieb des beständig sich bewegenden Bluts, und ist zwar nicht die Vornehmste, viel minder die einzige, doch aber eine Nebenursach der Absonderung der flüssigen Materien von dem Blut.

§. 86.

Warum aber in dieser Drüße diese, in einer andern eine andere Feuchtigkeit von dem Blute abgesondert werde: warum eben in der Leber die Galle, in den Nieren der Urin, in dem Pankreas der paccireatische Saft, in den Speicheldrüsen der Speichel, und an anderen Orten eine andere flüssige Materie von dem Blute abgesondert werde, ist eine Frage, in deren Entscheidung die Herren Medici nicht übereins kommen.

Wenn wahr ist, was Herr Professor Krüger behauptet nämlich, daß die Drüsen von ihrem ersten Ursprung an mit einer gewissen Gattung der flüssigen Materie besetzt sind; so kann ich in
etwas

was saßen, warum z. B. in der Leber nur die Galle abgesondert wird: denn sie ist von ihrem ersten Ursprung her mit einer Galle besetzt. Gleichwie dann in einem mit Oel benehten Haarröhrchen das Wasser nicht durchdringen kann, auf gleiche Weise kann auch z. B. Lympha in die zuvor schon mit Galle benehte Leberdrüsen nicht eindringen. Ob der Grund dieser Explication nicht erdichtet sey, lasse ich den Herren Medics zu beurtheilen über.

Von dem Ausdampfen.

§. 87.

Sollte unser Körper ernähret werden können, so müßte er aus Haarröhrchen bestehen, in welchen sich eine flüssige Materie besetzt. Müßte er aus Haarröhrchen bestehen, in welchen sich eine feste Materie bewegen sollte, so war es ganz unvermeidlich, daß diese harte Röhre ihre Eröffnungen hatte (§. 81.)

Nun diese Eröffnungen, derer viele tausend und tausend auf der Oberhaut (Epidermis) sind, nennen wir die Schweißlöcher, und sind in der That nichts anders, als die zweyte Eröffnung der Haarröhrchen, und ist derer Anzahl so groß, als die Menge der Haut ist.

§. 88.

Eine Feuchtigkeit, welche einen größern Grad der Wärme hat, als die Luft, und zu welcher die Luft freyen Zutritt hat, wird bald und nach in Dünste verwandelt, indem außer der Luft, der Wärme, und der Feuchtigkeit nichts anders zur Ausdünstung einer flüssigen Materie erfordert wird.

Nun, unser menschliche Körper ist gewiß wärmer, als die Luft,

Luft, die ihn umgiebt. Ist aber der Körper wärmer, so sind auch die in dem Körper befindliche Feuchtigkeiten wärmer, mithin ist sich gar nicht zu verwundern, wenn sie durch die Schweißlöcher ausdunsten.

§. 89.

Daß die Menge dieser ausdünstenden Feuchtigkeiten sehr groß sey, können wir an dem abnehmen, daß ein Hund die Spur seines Herrn auf eine sehr große Weite zu entdecken weiß: welches nicht geschehen könnte, wenn nicht aus den Füßen ausgedunstete Feuchtigkeiten von der Erde angezogen, den Weg gleichsam bedecketen, und dem Hund zu einem Wegweiser dienten.

Anwendung.

Auf das Reich der Pflanzen.

§. 90.

Die Thiere, und Pflanzen haben viele Aehnlichkeit miteinander. Ich betrachte in dem überaus ordentlichen, und künstlichen Bau der Pflanzen nur zween Theile, welche zu meinen Vorhaben am meisten dienen: nämlich die Saftrohren, und Bläschen.

Daß es in einer Pflanze ungemein viele, zarte, mit Nahrungsast angefüllte Capillärrohre giebt, kann man in dem Sceletum eines Blattes mit Vergnügen sehen. Man lege das Blat in das Wasser, und laße es darin so lange liegen, bis es in die Verfäulung geräth. Nun, weil die übrigen Theile des Blattes zarter sind, als die Rohre, aus welchen das Blat besteht, werden sie auch ehendaß in die Verfäulung kommen. Wenn man dieses Blat auf die Hand legt, und mit der andern darüber wegstreicht, so ziehet sich die äußere Haut davon ab, und gehet zugleich mit der bläßigten Materie, die sich

Es durch die Fäulniß in einen Schleim verwandelt hat, hinweg. Es bleibt also nichts mehr übrig, als die Röhre, deren einige überaus zart sind, und dennoch sind sie nur zusammengesetzte Röhre. Wie allgemein, ja fast unendlich zart werden die einfachen Haarröhren der Pflanze seyn.

§. 91.

Dieser Haarröhren hat die Pflanze, großen Theils sein Leben zu danken. Kommt das Wasser, mit welchem die Erde befeuchtet ist, zu der Wurzel, so trifft es daselbst viele Capillarröhre von schwächerer Art an. Von diesen werden die Wassertheilchen stark angezogen, und kommen also von der Wurzel in den Stamm, von diesem in die Aeste, und Blätter.

§. 92.

Ich muß zwar gestehen, daß man zwischen dem Aufsteigen der flüssigen Materien in einem engen gläsernen Rohr, das nur einige Linien hoch ist, und dem Aufsteigen des Saftes in einer Eiche, wenn man solches miteinander vergleicht, einigen Unterschied gewahr wird. Aber ein Philosophen fast auf die Gedanken bringen sollte, daß diese beiden Wirkungen nicht von einer einzigen Ursache herrühren. Doch wenn man erstens betrachtet, daß die einfachen Röhre so zart sind, daß man sie kaum, auch mit dem besten Vergrößerungsglase sehen kann, und zweitens, wenn man erwägt, daß durch den hohlen Körper der Pflanze eine große Menge hohler, und mit dem Nahrungsfaft erfüllter Bläschen zerstreuet sind, an welche neue Capillarröhre anschließen, und den Saft mit neuer Kraft anziehen, wird meines Erachtens der Zweifel ziemlich gehoben seyn.

Daß aber eine Menge kleiner Bläschen in dem Körper der Pflanzen vorhanden, läßt sich nicht zweifeln. Man schneide ein klei-

nes Stück von einer Citronen-Schaale ab, und betrachte es mit einem Vergrößerungsglase: so wird man sehr viele Höhlen, darinnen sich der wohlriechende Saft befindet, entdecken.

§. 93.

Eben darum, weil der Saft in den Capillarröhrchen in die Höhe steigt, müssen diese an der Oberfläche der Pflanze Eröffnungen haben, welche wir, wie in dem Leibe des Thieres, Schwweißlöcher nennen: durch diese duften die wässerigen Theile aus, die dicken entgegen, ölichten und salzigen Theilchen, weil sie schwerer sind, bleiben zurück. Sie hängen zusammen, dehnen die Pflanze aus, und machen, daß sie nach der Länge, Breite und Dichtigkeit zunimmt, und helfen ihre Schwere vermehren.

§. 94.

Die Krankheiten, ja endlich der Tod der Pflanzen geschieht fast auf gleiche Art, wie in dem Menschen. In dem Körper des Menschen werden die wässerigen Theile beständig durch eine unmerkliche Ausdünstung abgeführt, die schwereren bleiben zurück, hängen zusammen, und verursachen den Wachsthum und Ernährung des Körpers. Doch eben dieß, was die Ursach des Wachsthums, und Ernährung ist, ist zugleich ein Mittel zu dessen unvermeidlichen Untergang. Es müssen sich nothwendig mit der Zeit so viele irdische Theilchen sammeln, welche die Fäserchen des menschlichen Körpers verstopfen, hart, und zu der Bewegung ungeschickt machen. Daher scheint es zu kommen, daß alte Leute so steif, und nicht selten weiche Theile in ihnen zu Knochen werden. Es hören demnach die Bewegungen allgemach auf, und der Mensch stirbt ohne einen Schmerz zu fühlen. Dieses ist die natürlichste Art zu sterben, zugleich aber die seltenste, weil die meisten Menschen durch einen gewaltsamen Tod,

Wirkung. Die Theile dieser Körper bleiben unverändert. Man lege in das Scheidwasser verschiedene Metalle.

Wirkung. Alle werden in die zarteste Bestandtheile aufgelöst: das Gold allein bleibt unverlegt. Entgegen löset man in dem Scheidwasser gemeines Salz, oder Salmiak auf, so wird in diesem so genannten aqua regis auch das Gold in zarteste Theile aufgelöst werden.

Erklärung. Aus diesen Versuchen erlernen wir, erstens die dicksten und schweresten Körper in sichern flüssigen Materien, obwohl diese leichter sind, aufgelöst werden. Zweytens, daß alle flüssigen Materien tauglich sind alle Körper aufzulösen, sondern daß diese Gattung Metalls in dieser, jener Gattung in einer andern aufgelöst werde.

Was die erste Beschwerniß anbelanget, ist gewiß, daß, wenn die anziehende Kraft, mit welcher die Theile des aufzulösenden Körpers wirken in die Theile des auflösenden größer ist, als die anziehende Kraft, mit welcher die Theile des aufzulösenden Körpers unter einander verbunden sind, so werden die Theile des auflösenden Körpers mit größter Kraft in die Zwischenräume des auflösenden hineinfahren, die Verbindung zerreißen, und die einzelnen Theile des aufzulösenden Körpers aller Ort umgeben. Daß aber die anziehende Kraft, mit welcher z. B. die Theile des Silbers die Theile des Scheidwassers anziehen, größer ist, als jene Kraft, welche die Theile des Silbers verbindet, kann man mit freyen Augen, und noch besser mit Verglühungsgläser erfahren. Gewiß ist der Gewalt, mit welcher die Theile des Scheidwassers dem Silber zufahren, ist groß.

Die zweyte Beschwerniß ist ebenfalls von großer Wichtigkeit,

sehen Akademie del cimento genannt, eine metallene Kugel *A B* Wasser voll anfüllt, und mittels eines Schraubenwerks *C* stark zusammen drückt, treiben sich die gedrückte Wassertheilchen mit solcher Gewalt von einander, daß sie sogar durch die engsten Zwischenräume des dicken Erzes ausduften.

Tauche ich den Finger (Fig. 26.) in das Wasser, so wird Wassertropfen *a c* an dem Spitze des Fingers hangen bleiben, welches ein augenscheinliches Zeichen ist, daß die Wassertheilchen nicht nur an die Haut des Fingers sich hängen, sondern auch untereinander zusammen hangen.

Wenn in die berufene Maschine des Papin *A* die dicksten Stücke *B* gelegt, und auf selbe Wasser *C* geschüttet wird (Fig. 27.) Wenn man ferner die ganze Machin mit aller Zugehör wohl verschlossen die Stute *D* stellt das Wasser in Dünste verwandelt, welche so große zurücktreibende Kraft äußern, daß die Beine in kurzer Zeit in eine müßige Materie verändert, ja sogar das Erz, wenn nicht dick ist, zersprengt und zerrissen werde.

Die Natur zeigt uns in diesen Fällen verschiedene Wirkungen. Sind die Wirkungen verschieden: so muß auch eine Veränderung in dem Wasser vorausgegangen seyn. Nichts hat sich in dem Wasser geändert, ausgenommen die Entfernungen, welche Bestandtheile der Wassermaterie unter einander haben. Diese Entfernungen sind in dem ersten Falle sehr klein. In dem zweyten sind sie also beschaffen, wie es der natürliche Stand des Wassers erfordert. In dem dritten sind die Entfernungen weit größer, als in dem ersten und zweyten Falle.

Viertens. Nicht in einer jedweden Entfernung äußern die Mächte der Materie entweder gleiche anziehende, oder gleiche zurück-

stossende Kraft. Von der Wahrheit dieses Satzes haben wir ein Beispiel in dem ersten und letzten Fall. In dem ersten war die zurücktreibende Kraft zwar so groß, doch noch größer in dem letzten, in welchem uns die Erfahrung lehret, daß, wenn nicht das Erz selbst einen halben Zoll dick ist, selbes mit größter Gewalt zertrüffet werde.

Nun auf unsere Frage wiederum zurück zu kommen. Warum wird das Gold im Scheidwasser nicht aufgelöst, wohl aber das Silber? es ist möglich, daß die Bestandtheile des Goldes in jener Entfernung, welche sie unter einander haben, eine weit größere anziehende Kraft äußern, als in jener Entfernung, die das Gold vom Scheidwasser sondert, denn wer kann mit Grund behaupten, daß beyde Entfernungen gleich sind? vielmehr haben wir Ursache Herrn Leibniz zu behaupten, daß alles in der Welt ungleich.

Uebrigens, wenn ein Philosoph die Hauptsache bewiesen, kann er mit Recht seine Hauptgründe auf Nebenzufälle von gleicher Art, welche zu erforschen ihm die Natur nicht erlaubt, anwenden. Die mehrere Erkenntniß von allen dem, was wir geredet, wird geben das gelehrte Buch des scharfsinnigen Boskovich, welches den Titul führet, theoria virium.

Warum der aufgelöste Körper in der auflösenden leichtern Materie steige, ja vollkommen mit selber sich vermische?

§. 99.

Das Kupfer löset sich in dem Scheidwasser auf, die aufgelöste Theile steigen empor, und vermischen sich vollkommen mit dem

n Menstruo, wie aus der veränderten Farbe des Scheidwassers erschen.

Das Steigen geschieht auf folgende Weise. Wenn das kupfertheilchen H beyde Theile des Scheidwassers $F G$ berührt, d wegen der anziehenden Kraft nach den Directionen $H F$, $H G$ ehet, so muß es sich in der Diagonallinie $H C$ in die Höhe be-
gen, wenn anderst die zusammen gesetzte Bewegung größer ist, die Kraft, mit welcher die Theile des Scheidwassers $F G$ zu-
ammen hangen.

Daß aber die Kraft des Kupfertheilchen H Größer ist, ha-
sch kurz vorher S. 98. bewiesen. Zu dem hangen die Theile des
scheidwassers mit den Kupfertheilchen, als einem schweren Körper
er zusammen, als selbe unter sich zusammen hangen. S. 27. & seq.
z nun über dieß die Schwere des Kupfertheilchen ungemein ge-
z ist, indem ein jedes Menstruum den Körper in überaus zarte
eile sündert, so kann man fassen, daß diese ungemein kleine Dis-
nz der Schwere der Bewegung nicht merklich schaden könne.

Ferners betrachten wir das kleine Kupfertheilchen c , es wird
h den Directionen $c B$, $c A$, $c f$, $c g$ angezogen. Nun weil
e Kräfte gleich, und einander entgegen gesetzt sind, so muß die
stilul c ruhen. Gesezt aber, daß von unten ein anderer Kupfer-
i H hinein dringen wollte, so wird der Winkel $F c g$ größer,
der Winkel $A c B$. Nun wissen wir, daß die zusammengesetzte
wegung desto größer ist, je spitziger der Winkel ist, den die Kräfte
schließen, so wirkt mithin der Kupfertheil c stärker in die Höhe
h der Linie $c D$, als nach der Linie $c H$. Es steigt mithin wei-
hinauf, und das Theilchen H kömmt in dessen Stelle.

§. 100.

Sind aber die Kupfertheilchen einmal in dem Schmelzen erhoben, so können sie ungeachtet der größern Schwere nicht zu Boden sinken, weil die Kraft, welche die Theile des aufgelösten Kupfers mit den Theilen des auflösenden verbindet, größer ist, als die Differenz zwischen der größern Schwere des aufgelösten, und der mindern Schwere des auflösenden Körpers.

§. 101.

Dem ungeachtet können die aufgelösten Theile auf verschiedne Weise von der auflösenden Materie, von welcher sie aller Orten gegeben werden, los reißen, und zu Boden fallen.

Diese Wirkung nennen die Chemiker eine Präcipitation oder Niederschlag. Diese Wirkung ist eine natürliche Folge der Theorie. Wir wollen nur ein, und die andere Art der Präcipitation mit wenigen anführen.

Es geschieht erstens ein Niederschlag, wenn die aufgelösten Partikeln wachsen: denn wächst diese, so nimmt der Widerstand der Partikeln zu, welche sich den Ursachen widersetzen, die sich bemühen die aufgelösten Theile mit den Partikeln der auflösenden Materie vermischt zu erhalten. Wächst die aufgelösten Theile gemäß den hydrostatischen Regeln zu Boden. Daher geschieht, daß, wenn man in das Wasser, in welchem ein saures Salz aufgelöst worden, ein Alkalisches gießt, so wird das saure Salz zu Boden geschlagen. Warum? weil die alkalischen Salze an die sauren sich stärker hängen, als an das Wasser, weil beide Salze schwerer sind, als das Wasser, muß ein Niederschlag geschehen. Auf gleiche Weise kann man das Wa-

dem Menstruo, wie aus der veränderten Farbe des Scheidwassers zu sehen.

Das Steigen geschieht auf folgende Weise. Wenn das Kupfertheilchen H beyde Theile des Scheidwassers $F G$ berührt, und wegen der anziehenden Kraft nach den Directionen $H F$, $H G$ wirkt, so muß es sich in der Diagonallinie $H C$ in die Höhe bewegen, wenn anderst die zusammen gesetzte Bewegung größer ist, als die Kraft, mit welcher die Theile des Scheidwassers $F G$ zusammen hangen.

Daß aber die Kraft des Kupfertheilchen H Größer ist, habe ich kurz vorher S. 98. bewiesen. Zu dem hangen die Theile des Scheidwassers mit den Kupfertheilchen, als einem schweren Körper stärker zusammen, als selbe unter sich zusammen hangen. S. 27. & seq. Da nun über dieß die Schwere des Kupfertheilchen ungemein gering ist, indem ein jedes Menstruum den Körper in überaus zarte Theile sondert, so kann man fassen, daß diese ungemein kleine Differenz der Schwere der Bewegung nicht merklich schaden könne.

Ferners betrachten wir das kleine Kupfertheilchen c , es wird nach den Directionen $c B$, $c A$, $c f$, $c g$ angezogen. Nun weil diese Kräfte gleich, und einander entgegen gesetzt sind, so muß die Partikel c ruhen. Gesezt aber, daß von unten ein anderer Kupfertheil H hinein dringen wollte, so wird der Winkel $F c g$ größer, als der Winkel $A c B$. Nun wissen wir, daß die zusammengesetzte Bewegung desto größer ist, je spiziger der Winkel ist, den die Kräfte angeschlossen, so wirkt mithin der Kupfertheil c stärker in die Höhe nach der Linie $c D$, als nach der Linie $c H$. Es steigt mithin weiter hinauf, und das Theilchen H kommt in dessen Stelle.

§. 102.

Aus dem, was wir von der Präcipitation gemeldet, ist die Ursache folgender Wirkungen nicht hart zu errathen.

1. Man löse Silber im Scheidwasser auf, und lege in diese Solution ein Stückgen Kupfer hinein, sogleich wird das Scheidwasser anfangen das Kupfer aufzulösen, und eine himmelblaue Farbe bekommen, das Silber hingegen wird wie ein weißes Pulver auf dem Boden fallen.

2. In diese Kupfer-Solution lege man ein Stückgen Eisen, so wird das Scheidwasser das Eisen auflösen, die himmelblaue Farbe wird in eine Grasgrüne verändert, und das Kupfer wird sich präcipitiren.

3. In diese Eisen-Solution darf man nur Zink hineinwerfen, wenn man verlangt, daß sich das Eisen präcipitiren soll.

4. Will man endlich auch den Zink wieder haben, so hat man nur nöthig Krebssteine hinein zu werfen.

5. Wenn man die Solution der Krebssteine in der kalten Luft verrauchen läßt: so bekommt man die Crystalle des Salpeters wieder, daraus das Scheidwasser seinen Ursprung genommen.

§. 103.

Ich beschliesse diese kleine Abhandlung mit einem Versuch, den der unvergleichliche, und von der ganzen gelehrten Welt belohnte Chemiker Hermann Boerhaave gemacht.

Dieser Versuch ist ein kleiner Inhalt meiner Gedanken von dem Zusammenhang der Theile in den Körpern, und dem Anhang der flüssigen Materien an die Soliden. Ich gebe die Worte des Herrn von Boer-

erhaube, die er in Latein geschrieben, und operat. chem. p. 3. fossil. processu 185. zu lesen, auf unsere deutsche Mutter-Sprache.

Man nehme ein Stücklein bestens Silbers, und stecke selbes Salpetergeist. Alsogleich wird dessen ganzer äußere Umfang mit zehn Plättlein umgeben werden, welche aber bald von der Schwere des Geistes in die Höhe gehoben immer eines dem andern Platz nehmen. Hierauf wird der Umfang des Silbers Anfangs rauh werden, alsdann ungleich; der Geist sammt dem Glas wird warm werden, und einen stinkenden Rauch von sich duften.

Endlich wird das ganze Stücklein in fast unsichtbare Theilchen aufgelöst werden, und mit dem Geist sich vermischen, sofern Geist nicht zu schwach, oder zu wenig ist. Gießt man nun den Theil in ein destillirtes Regenwasser, so in einem reinen Glas behalten, hängt man an einem gläsernen hohlen Cylinder ein kleines polirtes Kupfers hinein, so wird sogleich von aussen an das Kupfer eine Aschenfarbe sich zeigen, welche wie ein Staub hin- und fällt, wenn das Kupfer erschüttert wird, und andern derley Partien Platz machen, welche sich an einander, wie eine Scheide, ansetzen werden.

Ja, wenn man mit einem Vergrößerungsglas das Wasser beschauet, wird man klar sehen, wie die Silbertheilchen mit dem des Salpeters mit Gewalt zu den Kupferplättlein hingezogen werden. So aber dieser Anhang aus dem Wasser in die Luft kömmt, wird gleich bey dessen Berührung das Salz dem Kupfer sich nähern, die Silbertheilchen aber von dem Salz abgesondert, werden das weitem um das Kupfer sich lagern, und weil immer neue nachkommen, die Figur einer Scheide vorstellen. Wobey zu beobachten, daß diese Auflösung und Anziehung so genau geschieht, daß der mindeste Theil des Silbers hinweg bleibt.

Woraus

§. 102.

Aus dem, was wir von der Präcipitation gemeldet, ist die Ursach folgender Wirkungen nicht hart zu errathen.

1. Man löse Silber im Scheidwasser auf, und lege in die Solution ein Stückgen Kupfer hinein, sogleich wird das Scheidwasser anfangen das Kupfer aufzulösen, und eine himmelblaue Farbe bekommen, das Silber hingegen wird wie ein weisses Pulver Boden fallen.

2. In diese Kupfer-Solution lege man ein Stückchen Eisen, so wird das Scheidwasser das Eisen auflösen, die himmelblaue Farbe wird in eine Grasgrüne verändert, und das Kupfer wird präcipitiren.

3. In diese Eisen-Solution darf man nur Zink hineinwerfen, wenn man verlangt, daß sich das Eisen präcipitiren soll.

4. Will man endlich auch den Zink wieder haben, so man nur nöthig Krebssteine hinein zu werfen.

5. Wenn man die Solution der Krebssteine in der kalten Luft verrauchen läßt: so bekommt man die Crystalle des Salpeters wieder, daraus das Scheidwasser seinen Ursprung genommen.

§. 103.

Ich beschliesse diese kleine Abhandlung mit einem Versuch den der unvergleichliche, und von der ganzen gelehrten Welt bekannt Chemiker Hermann Boerhaave gemacht.

Dieser Versuch ist ein kleiner Inhalt meiner Gedanken von dem Zusammenhang der Theile in den Körpern, und dem Anhang der flüssigen Materien an die Soliden. Ich gebe die Worte des Herrn von Boer

Verhaabe, die er in Latein geschrieben, und operat. chem. p. 3. in fossil. processu 185. zu lesen, auf unsere deutsche Mutter-Sprache.

Man nehme ein Stücklein bestens Silbers, und stecke selbes in Salpetergeist. Alsogleich wird dessen ganzer äußere Umfang mit kleinen Plättlein umgeben werden, welche aber bald von der Schwere des Geistes in die Höhe gehoben in:mer eines dem andern Platz machen. Hierauf wird der Umfang des Silbers Anfangs rauh werden, alsdann ungleich; der Geist sammt dem Glas wird warm werden, und einen stinkenden Rauch von sich duften.

Endlich wird das ganze Stücklein in fast unsichtbare Theilchen aufgelöst werden, und mit dem Geist sich vermischen, sofern der Geist nicht zu schwach, oder zu wenig ist. Gießt man nun den roten Theil in ein destillirtes Regenwasser, so in einem reinen Glas aufbehalten, hängt man an einem gläsernen hohlen Cylinder ein Stücklein polierten Kupfers hinein, so wird sogleich von aussen an dem Kupfer eine Aschenfarbe sich zeigen, welche wie ein Staub hinweg fällt, wenn das Kupfer erschüttert wird, und andern derley Partikeln Platz machen, welche sich an einander, wie eine Scheide, anlagern werden.

Ja, wenn man mit einem Vergrößerungsglas das Wasser beschauet, wird man klar sehen, wie die Silbertheilchen mit denen des Salpeters mit Gewalt zu den Kupferplättlein hingerissen werden. So aber dieser Anhang aus dem Wasser in die Luft kömmt, wird gleich bey dessen Berührung das Salz dem Kupfer sich nähern, die Silbertheilchen aber von dem Salz abgesondert, werden etwas weiters um das Kupfer sich lagern, und weil immer neue nachkömmen, die Figur einer Scheide vorstellen. Wobey zu beobachten, daß diese Auflösung und Anziehung so genau geschieht, daß nicht der mindeste Theil des Silbers hinweg bleibt.




Woraus

schon gereinigten Merkur öfters durch eine reine Leinwand, bis er nichts mehr von einer schwarzen Materie zurück läßt; alsdenn schütte ich selben in ein gläsernes Geschier *AB* (Fig. 31.) dessen Obertheil *A* ziemlich weitschichtig, der Untere herentgegen *B* in ein Capillarrohr zusammen gehet. Durch diese Capillarrohrnung läuft nur der gereinigte Merkur durch, der unreine bleibt zurück.

Die Zeit gestattet mir nicht, mehre Gedanken von dem Zusammenhang und Anhang der Körper auf andere Erscheinungen der Natur anzuwenden, z. B. auf das Feuerwesen, Electricität, und weiters. Doch werde ich mir alle Mühe geben, und jene wenigen

Stunden, die mir das Lehramt frey läßt, dieser nützlichen Arbeit opfern.









THE
SCHOOL
OF
THE
FUTURE







SECRET



A scatter plot showing the relationship between the number of hours per week spent on housework and the number of children in the household. The x-axis is labeled 'Number of children in household' and ranges from 0 to 10. The y-axis is labeled 'Hours per week' and ranges from 0 to 10. The data points show a positive correlation, with a cluster of points at low values and a few points at higher values.

Von der Nutzbarkeit
der
Wiesen,
und des
Heuwuchses.
von
H. Anton Grafen von Seefeld.



Von der Nutzbarkeit
der
Wiesen,
und des
Heuwuchses.
von
H. Anton Grafen von Seefeld.

Tägen mit dem Heuen mühsam herzugehen pflegt, daß manches Futter entweder auf der Wiesen halb verfaulet oder wenn es in den Heustadel geführt worden, im Stock erbittert, und verschlimmelt, wovon das Vieh nachmals krank, Lungenstichtig, oder sonst aufstößig wird.

Um von allen diesen etwas weislaufiger zu reden, werde von Zurichtung der Wiesen anfangen, mit deren Verbesserung fortfahren und mit dem klaren Beweise enden, daß es einem Landwirth sehr nützlich seye, auf Besorgung der Wiesen einen besondern Augenmerk zu nehmen, hingegen die jenen mit ihren Vorurtheilen sich so weit verfehlen, welche da glauben, man könne bey einem Landgut nicht Felder genug haben, folgsam alle Gründe umgerieffen, und dazu angewendet werden müssen, hingegen die wenigsten zu Wiesen und den so nothwendigen Heu bearbeiten lassen wollen. So mag gleich zum voraus gesetzt haben, daß der Ackerbau nicht ohne Vieh rousch bestellet werden kann, indeme aus diesen das zum Feldbau benöthigte Vieh unterhalten, und ernähret werden muß. Eine Wiese ist auch fast gar keiner Arbeit benöthiget, wenn man nur allein dieselbe beobachtet, daß das gras zur rechten Zeit abgemähet wird, seine Düre erlange, und so viel möglich nur trocken nacher Haus gebracht werde; da hingegen die Aecker etlichmal gepflüget, besäet, und gedget, auch hundert Gefährlichkeiten überlassen werden müssen, ehe man deren Früchte in Sicherheit bringen kann, nicht zu gedenken, daß die Wiesen der Auszehndung nicht unterworfen seye; die fetten Wiesen weder Ungewitter noch irgend einen Mißwuchs, wie die Fruchtfelder befürchten (außer sie werden durch Ueberschwemmung des Wassers untauglich gemacht) sondern allzeit gute Fütterung, und Heu geben, dessen Ueberfluß der Landwirth mit gutem Nutzen verkaufen, und seine Zinsung mehrer, als doppelt davon haben kann. Wesentwegen die Wiesen von den alten Lateinern nicht ohne Wahrheit prata quasi pa-

rata genennet werden, weil der Nutzen, den man davon bekömmt, chertig da, und leicht zu erlangen ist.

Es werden aber die Wiesen auf verschiedene Arten eingetheilt, zwar erstlich den Grund nach, giebt es trockne, und feuchte Wiesen, darunter die ersteren gesundes und besseres Gras für das Vieh haben, inzwischen aber öfters, so es seyn kann, mit denen nachdabey gelegenen Brünnen, Bächlein, und dergleichen, gewässert werden, oder aber in Ermangelung dessen mit dem Thau und Regen lieb nehmen müssen. Die Wiesen liegen entweder in Thälern, oder in der Ebene. Im ersten Falle müssen Gräben und Furchen nöthwendiger Weise gemacht werden, das überflüssige Wasser abzuweisen, damit das Gras nicht verderbe, welches gar leicht geschehen kann, besonders wenn sie durch solche Bäche, die einen sandigten Grund haben, überschwemmet werden. Im anderen Falle aber ist es keine Gräben vonnöthen, indeme das Wasser ohnehin gemächlich abfließt, und nur destomehr das Gras zum Wachsthum antreibt, alsam die beste Art der Wiesen seyn, das beste Gras tragen, welches gleich zeitig wird, und gut zu dörren ist. Zu den feuchten Wiesen können auch auf gewisse Art die morastigen, und sumpfigen gezählet werden, welche man billig für die schlechtesten halten kann, Erwägung sie saures, und grobes Futter bringen, welches das Vieh nicht gerne zu freßen pflegt; es giebt auch alte, und verdorrte Wiesen, welche dick mit Moß bewachsen; wie man ihnen aber zu Hilf kommen könne, soll noch weiters gezeigt werden. Endlich giebt es auch zwey oder dreymädige Wiesen, welche ohnstrittig die besten, und nützbaresten sind; gleichwie nun die Wiesen angezeigter Art verschieden seyn, so ist auch das Heu und Gras, so darauf wächst, wohl zu unterscheiden, maßen einiges grob, schilficht, und ungeschmackt ist, welches meistens an großen fließenden Bächen, oder Ufern, oder auch sonst in morastig und sumpfigen Orten,

Tägen mit dem Heuen mühsam herzugehen pflegt, daß manches Futter entweder auf der Wiesen halb verfaulet oder wenn es in dem Heustadel geführt worden, im Stock erbittert, und verschimmelt, wovon das Vieh nachmals krank, Lungensüchtig, oder sonst aufröthig wird.


Um von allern diesen etwas weitaufziger zu reden, werde von Zurichtung der Wiesen anfangen, mit deren Verbesserung fortfahren, und mit dem klaren Beweise enden, daß es einem Landwirth sehr nützlich seye, auf Besorgung der Wiesen einen besondern Augenmerk zu nehmen, hingegen die jenen mit ihren Vorurtheilen sich sehr weit verfehlen, welche da glauben, man könne bey einem Landgut nicht Felder genug haben, folgsam alle Gründe umgerieffen, und dazu angewendet werden müssen, hingegen die wenigsten zu Wiesen, und den so nothwendigen Heu bearbeiten lassen wollen. So will gleich zum voraus gesetzt haben, daß der Ackerbau nicht ohne Viehwuchs bestellet werden kann, indeme aus diesen das zum Feldbau benöthigte Vieh unterhalten, und ernähret werden muß. Eine Wiese ist auch fast gar keiner Arbeit benöthiget, wenn man nur allein dieselbe beobachtet, daß das Gras zur rechten Zeit abgemähet wird, seine Dürrer erlange, und so viel möglich nur trocken nacher Haus gebracht werde; da hingegen die Aecker etlichmal gepflüget, besäet, und gebet, auch hundert Gefährlichkeiten überlassen werden müssen, ehe man deren Früchte in Sicherheit bringen kann, nicht zu gedenken, daß die Wiesen der Auszehndung nicht unterworfen seye; die fetten Wiesen weder Ungewitter noch irgend einen Miswuchs, wie die Fruchtfelder befürchten (außer sie werden durch Ueberschwemmung des Wassers untauglich gemacht) sondern alzeit gute Fütterung, und Heu geben, dessen Ueberfluß der Landwirth mit gutem Nutzen verkaufen, und seine Zinsung mehrer, als doppelt davon haben kann. Wesentwegen die Wiesen von den alten Lateinern nicht ohne Wahrheit *prata quali*
pa-

paras genannt werden, weil der Nutzen, den man davon bekommt, gleichförmig da, und leicht zu erlangen ist.

Es werden aber die Wiesen auf verschiedene Arten eingetheilt, und zwar erstlich den Grund nach, giebt es trockne, und feuchte Wiesen, darunter die ersteren gesundes und besseres Gras für das Vieh haben, inzwischen aber öfters, so es seyn kann, mit denen nahe dabey gelegenen Brünnen, Bächlein, und dergleichen, gewässert werden, oder aber in Ermangelung dessen mit dem Thau und Regen anlieb nehmen müssen. Die Wiesen liegen entweder in Thälern, oder in der Ebene. Im ersten Falle müssen Gräben und Furchen notwendiger Weise gemacht werden, das überflüssige Wasser abzuleiten, damit das Gras nicht verderbe, welches gar leicht geschehen kann, besonders wenn sie durch solche Bäche, die einen sandigten Grund haben, überschwemmet werden. Im anderen Falle aber ist es keine Gräben vonnöthen, indeme das Wasser ohnehin gemächlich abfließt, und nur destomehr das Gras zum Wachsthum antreibt, welchem die beste Art der Wiesen seyn, das beste Gras tragen, welches gleich zeitig wird, und gut zu dörren ist. Zu den feuchten Wiesen können auch auf gewisse Art die morastigen, und sumpfigen gezählet werden, welche man billig für die schlechtesten halten kann, in Erwägung sie saures, und grobes Futter bringen, welches das Vieh nicht gerne zu freßen pflegt; es giebt auch alte, und verdorrte Wiesen, welche dick mit Moß bewachsen; wie man ihnen aber zu Hilf kommen könne, soll noch weiters gezeigt werden. Endlich giebt es auch zwey oder dreymächtige Wiesen, welche ohnstrittig die besten, und nuzbaresten sind; gleichwie nun die Wiesen angezeigter maßen unterschiedlich seyn, so ist auch das Heu und Gras, so darauf wächst, wohl zu unterscheiden, maßen einiges grob, schilficht, und ungeschmackt ist, welches meistens an großen fließenden Bächen, oder Ufern, oder auch sonst in morastig-und sumpfigten Orten,

zu welchen noch mehrers befördern würde, wenn man die angelegte Wiesen, wässern, und befeuchten könnte.

Es mögen aber die Wiesen aus Feldern, oder dürrten Heyden zubereitet werden, so will in beeden Fällen vonnöthen seyn, daß man alle Steine, Strauche, Büsche, Baumlein, Disteln, Dornhecken, Bromberstauden, Binzen und derley mit samt den Wurzeln so viel möglich ansclauben, und austräumen laße, wenn man anders etwas nutzbares haben will, und dieses muß so oft geschehen, als man ackert, wenn etwas dergleichen gefunden wird.

Wenn nun diese Arbeit vorbedeuteter maßen verrichtet worden, kann man sich zum säen anschicken, und den Grund mit Klee saamen bestreuen lassen, jedoch daß man den besten, kleinsten, und zeitigsten erwähle, welchen man nach belieben mit Haaber vermischen kan, angesehen der Haaber deswegen für gut gehalten wird, weil er, indeme er ehe in die Höhe kommt, in der Sonnenhitze dem Gras einen Schatten macht, und mit seiner Frucht zur Zeit der Zeitigung den halben Unkosten bezahlet, die Zeit des säens ist der Frühling, in welchem man solches lieber bey trocknen, als feuchten Wetter zu verrichten pfleget, wiewohl man am allerbesten thut, wenn man auf eine solche Zeit wartet, welche Hofnung zu einen herannahenden Regen machet, anerwogen hierdurch des Tunnets Hitzigkeit gekühlt, und des Saamens Aufgehen befördert wird. Nächst dem Kleesaamen aber, welcher unstrittig der beste, und für das Viehe der nützlichste ist, hat man auch noch verschiedene andere Kräuter, welche gemeiniglich auf neu angelegte Wiesen gesäet werden, als Wicken, Schmalzkraut, Wildkörbel, groß und klein Steinklee, und viele andere mehr, welche dem Viehe eine herrliche Nahrung geben, und das Heu ungemein gut machen. Wer es vermag, der nehme auch kleine Stücklein gestossenen Salpeter einer Erbsen groß, und war zu einem Maß, welches eine Fucharte ausmachet, 10.  vermenget

• get solchen unter eine andere Erde, welche nicht steinicht ist, und säet
• wie man sonst die ordinari Frucht auszusäen pfleget, streuet gleich
• darauf Heublumen, und läßt es also stehen, durch welches erprobte
• Mittel das schönste Klee gras wächst, und alles saure Gras, und
• Moos von Grund vertrieben wird, so, daß fast keine weitere Düng-
• oder Wässerung vonnöthen seyn wird.

Gleichwie aber alle diese obbesagte Kräuter dem Viehe un-
• gemein nützlich, und vortrüglich sind, also giebt es in Gegentheile
• auch andere, die demselben vielmehr schaden, und vor welchen sich ein
• verständiger Landwirth in alle Wege, und nach Möglichkeit hüten
• solle. Als nemlich den sogenannten Hundsahn, Münz, und An-
• mann, so die rechte wilde Camillen ist, weisse Zeitlosen, dessen Blu-
• men und Wurzel das Vieh tödlich krank machen kan; desgleichen
• Wasserpfeffer, Flöhkraut, sammentliche Disteln, Wolfsmilch, und
• andere mehr, welche insgesamt die Wiesen mehr verderben, als gut
• machen.

Zur Vereitung und nützlicher Anrichtung der Wiesen gehört
• sühnehmlich die Düngung und Wässerung, als welche zu dem Ende
• geschehen muß, damit das Erdreich desto saftiger und kräftiger wer-
• de, mithin das Gras desto häufiger und kräftiger wachsen könne.
• Dann gleichwie man denen Wiesen bey kalten Winterfrösten mit
• dem Düng, als mit einer Wärmung zu Hilf kommen muß, ab-
• sonderlich an jenen Orten, wo wenig Gras und kalter Grund ist;
• also muß man im Gegentheil dieselben bey trockenen und heißen
• Sommertagen mit der Wässerung erlaben. Man hat zwar, wo ein
• temperierter, grasreicher, saftiger, und guter Grund ist, weder eines
• noch das andere leicht vonnöthen, in Erwägung aber die Witterung
• sowohl, als die Erde nicht allezeit nach unsern Wunsch gerichtet ist,
• als müssen wir diesen Abgang mit unsrer Mühe und Arbeit zuweilen
• ersetzen. Es wird die Düngung gemeiniglich im Hornung, oder

Merz, wenn der Mond zunimmt, vorgenommen, obwohl einiget im December dazu bestimmen, weil die Feuchtigkeit des Wetters und der Fungets Fettigkeit desto leichter einsenket. Meines Erachtens aber, wenn der Dung zu fruhe auf die Felder und Wiesen kommt, und öfter eingebracht ausstehen muß, ehe er ausgearbeitet wird, so nimmt es demselben hierdurch die mehreste Kraft, und das salzichte Wesen, welches die Wiesen fett, und gut machen solle.

Die Dungung selbst bestehet gemeiniglich in Viehmist, Pferd- und Schweinsmist, welches man den Winter hindurch liegen läßt. Damit es wohl abliege, friere und mähr werde, mit welchem man alsdenn bey schon angeregter Zeit den Wiesgrund wohl damit bestreuet, und aus einander zettelt. Nicht besser aber können solche neu angehende Wiesen fruchtbar gemacht werden, als wenn man etwas gut zerriebenes Erdreich unter den Mist vermenget, weilen solche Vermischung den Wachsthum des Grases ungemein befördert. Je frischer und neuer der Mist ist (wenn er nur wohl verfaulen und kein langes Stroh darunter ist) je besser und dicker setzt sich das Gras an, der Schaafmist ist zu solchen neu angelegten Wiesen der beste, weilen er auch der häufigste. Die Wiesen werden entweder öfters, oder weniger gedunget, welches man an dem Boden erkennen kann, denn je älter die Wiesen sind, je öfter muß man ihnen mit der Dungung zu Hilfe kommen, inzwischen sollen die höchsten Theile der Wiesen allezeit am stärksten bedunget werden, damit der Saft davon entweder von sich selbst, oder durch folgenden Regen in die mindern Theile ablaufe.

Es werden aber die Wiesen nicht allein durch die Dungung sondern auch durch die Wässerung und Nässe fruchtbar gemacht. Gestalten dieselbe das Heugras merklich vermehret, selbiges auch desto leichter und frecher wachsen macht. Es haben zwar nicht alle Wiesen der Wässerung vonnöthen, absonderlich diejenige, welche bergigt,

gicht, und von der Höhe abhängig liegen, angesehen diese von ordinari Regen genug befeuchtet werden, und sind also viel zu bedungen, weil alsdenn das Regenwasser die Kraft, und Saft davon auch in die Tiefe führen wird, desgleichen bedürfen auch jene Wiesen keiner Wässerung, welche ohnehin Clee reich, gute Weid haben, denn wo diese zu viel gewässert wurden, zöge das Gras verderben und verfaulen.

Was aber die Art der Wässerung anbelangt, muß die Georathheit des Orts das meiste darbey thun, weßwegen diejenigen Wiesen dazu am besten sind, welche ganz eben, allermassen sich in selben das Wasser schon von ihm selbst hin und wieder austheilet, es die ganze Ebne durchgezogen hat, wo aber dieses nicht geschieht, müssen Wasser-Furchen gemacht werden, weil, da die kene Bitterung gar zu lang anhältet, nothwendiger Weise die Wiesen befeuchtet werden sollen: wobey aber dieses wohl zu beachten ist, daß man keine Wiesen unter Wasser setzen, oder erschwemmen solle, wenn man große Kälte zu befürchten hätte, welches den Wiesen ungemein schädlich seyn würde, wenn das Eis zu stark, und dick eine geraume Zeit darauf stehen bleiben sollte. Die Zeit der Wässerung ist gemeiniglich, wenn das Laub von den Bäumen abgefallen, wiewohl es auch bey gelinden Wetter im Jänner, oder Hornung, und zu andern Zeiten geschehen mag, auch da die Beschaffenheit des Grund und Bodens wohl zu beobachten ist.

Der Unterschied des Wassers ist ebenfalls nicht außer Acht lassen, dann entweder entspringen dieselbe aus einem sandichten, oder aus einem morastigen und schlammichten Boden. Erstere geben mehr Kühlung, als Nahrung, zweyte aber sind fetter, wärmer und nährhafter. weßwegen da diese zugleich auch die Fruchtbarkeit mittheilen, selbe auch den erstern weit vorzuziehen sind. Ferners

ners sind die Wässer kalt und warm. Gene entspringen aus hohen Gebürgen, und werden durch die Schneewässer vermehrt, aber kommen aus Brunnquellen, oder Bächlein; die gar kalte Wässer soll man vor dem Märzmonath nicht gebrauchen, biß von den Sonnenstralen besser erwärmt werden: die warmen kann man auch im Sommer auf die mit großen und langen bekleideten Wiesen laufen lassen, und zwar von acht zu acht, zu zehn Tagen, nachdem das trockne Wetter anhält, oder ni

Wenn nun auf solche Weise die Wiesen sattfam gemacht und getränkt worden, muß man den Zugang des Wassers derumhin stönnen, angesehen der Ueberfluß des Wassers den kein Nuß ist, weßentwegen man auch, wenn sumpfsichte und rastichte Pfützen auf den Wiesen vorhanden, man dieselbige sonderbare hierzu gemachte Grubben, Furchen oder Gräben, möglich abführen soll.

Zur Bereitung und Anrichtung der Wiesen gehöret anders, wie schon gesagt, daß alle Disteln, Dornhecken, und nichtswürdige Etauden ausgerissen werden, dergleichen solte die von denen Scherthausen wohl gereinigt seyn. Nachdem das Vieh den neuen Wiesen, wo der Grund noch weich ist, schon Schaden thut, und den Boden löchericht ungleich macht, hin das Gras mit Sammt den Wurzeln herausziehet, so muß der Landwirth dahin bedacht seyn, daß solches in dergleichen neuen nicht hinein gelassen werde, was aber die alte und trockne anlangt, kann man das Vieh nach Michaeli wohl in selbe treiben, angesehen dem Grund nicht allein mit dem Dung, sondern auch das noch nachkommende Gras, welches nehin den Winter hindurch verfaulen mußte, dem Viehe zum Nutzen kommt, wenn nur keine Schweine, noch Gänse, noch solche Hühner und dergleichen Geflügel hinein gelassen werden, weil

I das umwählen der erstern, als die Federn der letztern sehr dünn sind. Sollen also so viel möglich derley Wiesen eingestrichen und verwahrt werden, oder doch wenigstens die Viehe trifft ihn verbothen seyn.

Weil auch dem Heuwuchs viele Sachen schädlich sind, will dieselben auch kürzlich durchgehen.

Nebst dem Moos, welches die Wiesen oft zu überziehen set, und wie schon gesagt, großen Schaden verursachet, ist der Maulwurf ein sehr schädliches Ungeziefer, welcher mit seiner Minierarbeit eine gleiche, schöne und geebnete Wiesen voller Bergen und Thäler macht, je fruchtbarer auch, und besser der Grund ist, je mehr er demselben nach. Diesen schädlichen Thieren vorzukommen werden unterschiedliche Mittel gebraucht, einigen Menge todte Krebsen hienunter unter dem Kies, und verstopfen damit ihre Gänge, anmachen Schlingen von Pferdhaaren, dieselbe damit zu fangen, oder man erum andere ebenen die Maulwürfs-Hauffen Gang gleich, und warten sie, da dann des Morgens bey Aufgang, oder des Abends Untergang der Sonne, absonderlich wenn es regnen will, und die Erde locker ist, der Maulwurf Luft suchet, die Erde wieder aufzuwerfen trachtet, wo man dann denselben, wenn man Acht hat, sie gar wohl erwarten und erschlagen kann; die kleinen werden auch auf solche Art viel ehender als die Männlein gefasst, weil diese erstern Gang oben nach der Fläche, diese zweyte tiefer in Boden arbeiten, und sich vergraben. Der Wind muß dieser Arbeit wohl beobachtet werden, indeme der Maulwurf ein feines Nase hat, und durch den Geruch gar leicht wiederum gefangen wird. Einige schütten auch Wasser in die Löcher, damit das Thier heraus laufen sollen, und man sie hernach todt fassen kann. Meines Erachtens ist das beste Mittel sie zu vertreiben Bäschlein von grünen Hanf, welche man in eine Grube that,

und

und sie allda verfaulen läßt, welches einen solchen Gestank in daß die all dort herum sich aufhaltende Maulwürfe entweder ziehen, oder verrecken müssen: angezündet Schweinsmist ihm ein gleiches.

Um nunmehr von der Heu-Ernde etwas weniger zu müssen ich selbe in zwey Theile eintheilen: nemlich in die Zeit, dann in die Art, und Weise Heu zu machen, und endlich durch den erwünschten Nutzen der Wiesen zu genießen. Die Zeit, wessend, wird das Heumachen meistens mitten im Junio, an manchen Orten gar erst im Julio angesetzt, absonderlich auf rigen Wiesen, und denen die anfließenden Bässern liegen, ahen es nichts ungewöhnliches, daß derley auch nach der Sonnen durch die auslaufende Wassergänge überschwemmet, und verwendet, weßentwegen ein Landwirth wohl acht haben solle, daß wenn man gar zu lang mit dem Heu wartet, mehrer Schaden Nutzen heraus komme. Man will auch sagen, und behaupten die Abmähung in Neulicht, oder im zunehmenden Monde geschehen solle, weil in selben das Heu besser ausgiebt, und nicht so schwindet, auch das Gruemet desto dicker und besser hernach wolle. Dieses Heu soll auch dem Vieh viel amuthiger und lie vorkommen, demselben besser ersprießen, und den Kühen die vermehren. Dieses alles laße ich aber einem verständigen Land zu seiner selbst eigenen Einsicht, und Erfahrung übrig. Indessen ist richtig, gewieß, und der Erfahrung gemäß, daß wenn das zu spät gemacht wird, und das Gras all zu zeitig worden, seinen besten Saft und Kraft verlohren hat, es eine gar schlechte terung abgebe, auch zu nichts besseres nütze, als daß man e Vieh unterstreue.

Das äußerliche Gewitter soll desgleichen wohl beobachtet den, gestalten nichts verdrüsslicher ist, als wenn man das Heu in

Better einführt, nichts zu melden von der Gefahr, welche daraus entstehen kann, dann es nichts verwunderliches, daß das naße Heu, wenn es aufeinander auf dem Boden lieget, sich entzündet, und Feuer regnen kann. Wenn es also geschehe, daß es etwann aus Noth nacher eingebracht worden wäre, so muß man wohl besorget seyn, alles auseinander zu streuen, und einige Tage wohl austrocknen lassen, ehe man selbes in einem Stock aufrichten läßt, das Gras solle, viel möglich in der Frühe, da der Thau noch darauf liegt, abgemähet werden, gestalten es sich sodann viel leichter umleget, als wann es von der Trockne des Wetters zähe der Sense nachgiebt, und als nicht so lang, und von der Erde weg, glatt abgemähet werden kann.

Das abgemähete Gras soll, so fern es anderst die Witterung zuläßt, unter 2. oder 3. Tagen nicht eingeführet werden, damit es wohl dörre, zu diesem Ende sollen dann mittelmäßige Schobern gemacht werden, damit, wenn es auch in den Schobern also beneket wird, so kann doch der Regen den ganzen Haufen nicht gleich durchdringen, und selbst leicht wieder geholfen werden, wenn man denselben nach wieder herankommenden Sonnenschein wiederum auseinander streuet, und also austrocknen läßt. Bis hiehero hab ich von der ersten Art des Alt-Heues gehandelt, nachdeme aber die guten Wiesen wenigstens zweymal gemähet werden können, und solches andere Gras das Gruemet genennet wird; als will von demselben auch etwas wenigens anführen. Dieses Gruemet wird nach der ersten Heueinführung gemacht, denn sobald dasselbige nacher Haus gebracht worden, bereitet man die guten Wiesen zum Gruemet, welches auf diese Weise geschieht, wie oben von dem Heu geredet worden; nemlich ist nun dahin zu sehen, daß man bey dürrer, und hitzigen Better, welches die Graswurzeln sehr verdorret, die Wiesen mit müssamer Wässerung erquicket, damit die Wurzel hievon erfrischt,

N r

desto

desto stärker, häufiger, und eher wiederum angetrieben werden, mithin das Gruemet desto kräftiger, und dicker nachwachsen könne. Das auf diese weise gepflegte Gruemet kann von Egidy bis Michael und gleich dem Heu behandelt werden; ist übrigens bey diesen mehr auf eine gute Witterung, als auf des Mondeszeichen zu sehen.

Das eingeführte Gruemet solle an keinem dumpfsichten Ort, sondern an einem lüftigen in die Höhe geleget werden, man soll es auch, so viel möglich nicht leicht den Pferden zum Futter geben, angesehen sie mehr matt, als kräftig werden, und wenn sie stark Arbeiten müssen, übermäßig davon zu schwitzen pflegen. Im übrigen kann es für die Kühe, Schaaf und Ziegen, auch für die jungen Füllen, und Kälber gar wohl gebrauchen, ob es gleich nicht so gar übrig da ist, maßen sie sodenn dasselbe desto eher freßen, auch das Melckvieh desto mehr Milch davon zu bekommen pflegt.


Gleichwie in keiner Sache genug ist, etwas erworben zu haben, wenn dasselbe nicht gebührllich unterhalten wird; also ist es auch noch nöthig, nachdeme ich von der Abmähung des Heues sowohl, als des Gruemets gehandelt habe, daß ich auch etwas weniges noch mehr de, wie das eingebrachte mit Nutzen, und ohne Schaden zu bewahren seye.

Wenn das Heu bey schönen, und trocknen Wetter eingebracht worden, ist fast das Allergedenklichste bereits geschehen, nachgehends soll man es an ein lüftig, und temperirtes Ort legen, damit die Luft recht durchstreichen, mithin das eingebrachte Heu durch die gar zu genaue Zusammstopfung nicht verfaulen noch verderben möge, durch welches Mittel es ein leichtes seyn wird, das Heu länger als ein Jahr gut zu erhalten, damit man auf das andere Jahr einen guten Vorrath habe, falls der Sommer gar zu trocken, oder die Wiesen von der Ueberschwemmung des Wassers, und vielen Güssen
noth-

northleiden sollten, gleichwie solches auf vielfältige Weise geschehen kann, zu geschweigen, daß ein abgelegenes Heu viel kräftigere Nahrung giebt.

Es wird dann das Heu entweder in eigene hierzu gebaute Städel, und Scheuren, oder aber auf solche Bdden, welche über denen Ställen sind, gebracht; im ersten Falle ist weiters nichts zu beobachten, als daß die Städel vor Einbringung des Heues wohl durchgegangen, und alles wohl ausgebessert werde, damit kein Regen nicht hineinschlagen könne. Im anderten Falle aber ist sehr Vortheilhaft, wenn man vorher den Boden ober denen Ställen mit durren Stroe wohl überstreuet, und sodann das Heu darauf streuet, hernach obenher mit Stroe wiederum zugedecket, allermassen hierdurch nicht allein das Heu von allen Dunst, der sich von den Viehställen über sich hinauf ziehet, rein erhalten wird, sondern es ziehet auch das Stroe selbst solchen Dunst an sich, das er das Heu nicht verderben, und solches von der Fäulung bewahret werden kann.

Aus all obangezeigten wird sich wohl der klare Beweis nehmen lassen, wie sehr in einer wohleingerichteten Landwirthschaft auf die Wiesen, und den Heuwuchs zu sehen seye.



Entdeckung
des
Seleniten,
in der Kabbabar

von

Dr. Johann Georg Models,
russisch-Kaiserl. Hofraths, der Kaiserl. Akademie
der Wissenschaften, und des Collegii Medici, wie auch
der freien Oeconomischen Gesellschaft in St. Petersburg, der gelehr-
ten Gesellschaft zu Harlem, und der Chur-Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften Mitglied.





In meiner Untersuchung des Persischen Salzes schon, absonderlich aber in der Untersuchung der Corallina, die dem XIV. Theil der Harlemischen Verhandlungen 1773. verleiht ist, habe ich durch Versuche gezeigt: daß die meiste Substanz dieser sogenannten Corallina, oder Muscus Corallin. eine feine kalkartige Erde sey. Da ich schon so viele Jahre diese in so vielen Örtern befindliche Erde, als einen besondern Urstoff angesehen habe, war es nicht zu verwundern, daß ich endlich im letzten Paragr. der erwähnten Schrift, in die Worte ausgebrochen: „Woher kommt denn nun diese Kalkartige Erde, oder wo sollen wir ihren Urstoff suchen, und ihren Ursprung herleiten? oder ist diese Erde vielleicht gar der Grund aller alcalischen Salze? oder giebt vielleicht gar das Salz den Stoff zum Kalk her?“, dieses waren freylich noch Folgen des bey Untersuchung des Persischen Salzes, als eines natürlichen Kali, bey mir eingewurzelten und wenigstens mir scheinbaren Sages; Dem ich mir vorstellte, es könnte eine feine alcalische Erde in dem Salze befindlich seyn, die sowohl die Eigenschaften des flüchtigen, als fixen

ihren Alkali abgeben könnte: zumal da wir heut zu Tage versichert sind, daß die Natur auch einen in Crystallen sich zeigenden Salzmias ohne Feuers-Hülfe, und wie es wahrscheinlich ist, bloß durch Veränderung des alcalischen Theils zeuget. Als auch daß dessen gröbste Erd-Theilchen, vielleicht der Urstoff der Kalkartigen Erden wäre; zumal da man fast in allen vegetabilischen Aschen, Kalkartige Erde antrifft.

§. 2.

Die wiederholte Untersuchung der Uva ursi, China, und anderer adstringirenden, oder sogenannten robotirenden Dinge, davon ich in meinem zweyten Schreiben an einen Freund, wegen der Besserscheyssischen Tropffen (Tinctura Tonica Best. Lamothe dict.) gehandelt habe, nebst denen Versuchen, die ich mit Thon, und Alaun-Erde, zu verschiedenen Zeiten vorgenommen habe, bestärkten mich in meiner Muthmaßung, daß diese alcalische Grund-Erde des Salzes, der Stoff zu vielen andern Salz-Arten, sowohl als Stein- und Erdgeschlechtern abgeben könne.

§. 3.

Und was mußte ich denken, da ein erfahrener Marggraf mir zeigte, daß ein solches feines alcalisches Wesen, so gar in den Weinstrauben enthalten sey, und sich mit der Zeit, aus dem Wein, in den Weinstein, mit einer noch gröbbern Kalk-Erde abscheide, ja noch gar in demselben eine Selenitische, Gypsartige Natur annehme, welches im 32. Theil der Schwedischen Gelehrten Abhandlungen 1765 von dem Herrn Røhnius gründlich gezeigt worden, und Gaubius in seinen Adversariis, den Seleniten auch im Meerwasser angetroffen. In mineralischen Wässern solchen zu finden, habe ich selbst Erfahrung davon.

§. 4.

§. 4.

Diejenige Wahrnehmung aber, die ich hier mitzutheilen gehen bin vom Seleniten, einer Gypsartigen Kalk-Erde in Rhabarbar, wird mir vielleicht bey manchem Leser den Vorwurf machen, wie es komme, daß, da ich schon so viele Jahre dieser Waare umgegangen, dennoch solches nicht eher wahrgenommen habe? und ich muß bekennen, daß ich diese weisse Fleckgen nicht ein, sondern gar vielmal sowohl mit bloßen Augen, als durch Microscop betrachtet habe, niemals aber darauf gefallen sey, daß er sogenannten, und von jedermann davor gehaltenen besten Rhabarbar, ein häufiger Selenit stecken könnte. Allein die bereits im §. erwähnten Wahrnehmungen vom Salinischen Wesen, in roborisirenden und adstringirenden Dingen, hatten mich sicher und unachtsam gemacht. Und wo sind nicht meistens die besten Entdeckungen, anders durch einen Zufall gemacht worden.

§. 5.

Eben da meine Gedanken sowohl Chymischer Ursachen halber, als auch da mir für mein körperliche Umstände der Cremor Tartari besonders angerathen worden, geschah es, daß eben in der hiesigen Ober-Apotheck, eine Parthey feine Rhabarbar gestoßen wurde, (von zu einer Arzney etwas von diesem Pulver ganz allein mit reißendem Wasser angerührt, und eben in ein Glas abgegossen werden sollte), sagte ich, der Gefell wahrnahm, wie sich eine grobe weisse sandartige Materie schon unter dieser Zeit im Mörsel zu Boden gesetzt hatte. Der Mensch erschrock, und dachte, wo kommt der weisse Sand hieher? sollte wohl gar muthwilliger Weise, währenddem Stosswelcher hinzugeschüttet, und dafür eben so viel am Gewicht, von Rhabarbar entwendet worden seyn? diesen Zweiffel klagte er mir, ließ mir von diesem Sandartigen Pulver geben. Da ich aber

wie schon gedacht, eben den Cremor Tartari und dessen Seleniten in Gedanken hatte, fiel bey mir, so bald ich das Pulver in die Hand bekam, der Verdacht von Sand hinweg. Ich that etwas davon, in ein feines wohl polirtes Agathnes Mörselgen, wo es sich ohne sonderliche Mühe, noch weniger das Mörselgen anzugreifen, zu feinem Pulver zerreiben ließ. Durch das Microscop betrachtet, hatten die Theilgen dieses Pulvers freylich verschiedene Figuren und Gestalten; allein, sie waren ja währendem stoßen schon zerrieben. Ich hielt sie aber doch vors erste nur noch für eine Kalkartige Erde bis folgende Versuche mich eines andern belehrten.

§. 6.

Ich ließ 4. Pfund feine Rhabarbar, woraus eben das Extractum aquosum trituro ando sollte verfertigt werden, etwas feiner als eben zum trituriren nöthig war, stoßen, und wie sich gehört, schwemmen; dadurch erhielt ich, nachdem man das auf dem Boden sich gesetzte weisse Pulver noch vielmal mit reinem Wasser ab- und aufgewaschen, und endlich gelind getrocknet hatte, 6. Unzen am Gewicht solcher bereits beschriebenen, im Wasser unauflöslicher Erde.

§. 7.

Sechs Drachmen dieser, in vorhergehendem §. erwähnten Erde, wurden in einem neuen Tiegelschen mit Kohlenstaub vermischt, gehörig cementirt, und nach Verlauf einer Stunde mit etwas starkem Feuer calcinirt: da man dann während der Calcination einen wackeligen Schwefel-Geruch wahrnahm: nachdem die Masse aber erkalt, in warmen Wasser aufgelöst und filtrirt auch darauf mit Aceto destillato versucht worden war, erhielt ich, unter gewöhnlichem faulen Eyergeruch, ein wahres Magister. Sulphuris,

§. 8.

§. 8.

Drey Drachmen dieser Selenitischen Erde mit neun Drachmen reinem Alcalischen Weinstein-Salz, in einem gläsernen Gefäß mit sechs Unzen reinem Wasser digerirt, und bis zum Kochen gebracht, hernach so heiß abgegossen und filtrirt, gaben nach gehöriger gelinder Abdunstung, die Crystallen von einem reinen Tartaro vitriolato.

§. 9.

Gleiche in §. 8. gemessnte Portion dieser Selenitischen Erde, mit eben der in erwehntem §. angezeigten Quantität Alkali mineralis oder Salis sodae behandelt, gab ein Sal mirabile.

§. 10.

Eine Unze dieses Selenits, in einem reinen Tiegelschen, allmählich erhizen und erglühen, sodann eine halbe Stunde wohl zugedeckt stehen lassen, wog nach geschehener Erkaltung, die ganze übrige Masse nicht mehr, als 2. Drachm. und 7. Gran, war locker, weißlich, und Raskartig, lösete sich in acido vitrioli wenig, hingegen in acido nitri und salis ganz rein, ohne einigen Bodensatz, auf.

§. 11.

Da ich nun auf den Verdacht gerathen war, daß je älter die Rhabarbara sey, je mehr Selenit sich in selbiger erzeugte, (denn ich hatte angemerkt, das mit der Zeit, sich immer mehr weißse Crystallen erzeugten, und sehen ließen) und mir eben ein etliche Jahre lang bey mir gelegenes ungewöhnlich feines Stückchen Rhabarbara in die Hände kam, welches ganz weiß angeflogen war, und am Gewicht $2\frac{1}{2}$ Unze und 1. Drachma wog, machte ich auch damit die Probe, ließ es stoßen und schwämmen, und erhielt davon 1. Unze Selenit

lenit, (ohne dasjenige subtile oder fein gestoßene zu rechnen, |
möglich von der Rhabarbara rein zu scheiden ist) welches aus
dem vorher in §. 6. gemeldten, zu verstehen ist.

§. 12.

Ich erinnerte mich bey dieser Gelegenheit einer andern
gehörigen Erfahrung; als vor einigen Jahren, auf Befehl des
merz-Collegii, eine aus China zur Probe gesandte Quantität
genannter Stein-Rhabarbara, welche dunkelbraun, hart, fest
schwehr nach den äußerlichen Ansehen war, mit einem Wort
schlechte Sorte Rhabarbara, verbrannt wurde, die zurückgebl
Asche aber, ungewöhnlich weis und kalkartig ausfah, so san
Aufseher etwas von dieser Asche, zur Curiosität an die Ober-
thecke. Diese Asche war am Geschmack wenig alcalinisch, wie
folgende Versuche zeigen.

§. 13.

Sechs Unzen dieser jetztgedachten Asche, wurden durch
gießung heißen Wassers, zu verschiedenen malen ausgelaugt.
sänglich, beym ersten Zugießten, zeigte sich die Asche Gypsartig
abgegoßene und filtrirte liquor sahe etwas gelblicht aus, sch
wenig alcalinisch, efferveszirte auch wenig mit acidis, und gal
geschehener Ausdünstung in allem 24. gran eines trockenen
schen Salzes, so aber in länglichte Crystallchen angeschloßen

§. 14.

Das acidum vitrioli lösete sehr wenig auf, und setze
sehnliche kleine Crystallchen ab.

§. 15.

In acido Nitri und Salis hingegen lösete sich diese Asch

ohne einiges Nachbleibsel rein auf: die Solutiones bleiben hell und Wassertlar. Allein nach gescheneher gelinden Abdunstung zeigte kaum eine Spur fester und wahrer Crystalle; so daß wenig verstablisches Alkali zugegen seyn mußte; es war meistens wie eine Gallert, und nachdem es in stärkerer Wärme völlig getrocknet worden, weiß und ohne besondere Figur.

§. 16.

Ich halte es für eine Pflicht von mir, bey dieser Gelegenheit des Wortes Moscovische Rhabarbara zu erwähnen. Es ist eine kannte Sache, daß man in den meisten alten Materiis Medicis: sogenannte Moscovische, d. i. über Rußland aus China gebrachte Rhabarbara für die schlechteste ausgegeben. Nun hat zwar der k. und niemals genug gelobte Professor und Dr. Johann Georg Melin, nachdem er von Petersburg in sein Vaterland nach Tübingen zurück gekommen war, bey dem Antritt seines Professorats, in einer vortreflichen Dissertatation unter dem Titel Rhabarbarum officinale No. 1752. der Welt eine richtigere und genauere Beschreibung dieser Pflanze nicht allein, sondern insbesondere der Güte und des Vorzugs, den die über Rußland gebrachte Rhabarbara vor allen andern verdient, mitgetheilet; so wie man auch in des vortreflichen Apothekers zweyter Auflage seiner materia medica 1767. Frankfurt an der Oder, eine von dem seel. Archiater von Fischer, mitgetheilten Nachricht, wie man in und durch Rußland mit der Rhabarbara umgehe, findet. Man kann dieser um so mehr glauben zustellen, weil selbst die Einrichtung und Veranstaltung des Transports der Rhabarbara zur selben Zeit, meistens von dem seel. Archiater von Fischer abhienge: und ich muß der Wahrheit zur Steuer sagen, daß nach dieser Zeit, die guten Anstalten, zur Auslese und Erhaltung dieser Waare, gewiß mehr verbessert, als vernachlässiget worden:

den: ja man hat aus obigem bereits gesehen, daß man, um kein schlechte Rhabarbara von hieraus in andere Länder kommen zu lassen, die schlechte allhier selbst zernichte und verbrenne.

§. 17.

Nun war ich also wohl von der Gegenwart des Selenits der Rhabarbara überzeugt; ob solcher aber in aller Rhabarbara gleich bey der Ausgrabung der Wurzeln schon vorhanden, (woran ich noch zweifle), oder erst mit der Zeit, durch die Gegenwart der kassichten Erde entstehe und sich erzeuge, ist eine Frage, die ich mit keiner Gewißheit beantworten kann; indem hierzu noch gar viele und sichere Nachrichten, und in der Nähe angestellte Versuche fehlen, die aber vielleicht noch zu erhalten sind. Jedoch wolte ich einen Versuch machen, mit einer Parthie hier zu Petersburg gewachsenen Rhabarbara vera palmata. Ein Stück so im Diameter gegen 3-Zoll dick war, eben so wie die wahre Rhabarbara, (welche noch frisch) etwas stärker roch, ob sie gleich vor einem Jahr ausgegraben worden, gut sapirte, und vielleicht von den meisten für sogenannte Orientalische oder Chinesische Rhabarbar angesehen werden konnte; zeigte sowohl durchs Microscop, als den bloßen Augen, viele solche weisse, für salinisch gehaltene Theilchen, jedoch nachdem etwas davon gestoßen, und hernach wie ich §. S. 5. 6. gemeldet habe, geschlemmt wurde, wolte sich doch keine Spur vom Seleniten finden lassen: Absetzte und vermischte sich alles rein mit Wasser, und ob man wohl eine weißlichte Erde schwimmen sahe, so war sie doch zu leicht, als daß man sie, von der Rhabarbara hätte scheiden können.

§. 18.

Nun entsteht natürlicher Weise die Frage, wo dann erstlich die viele kassartige Erde herkomme? und ob solche als ein Selenit zu kinnen erzeuget, oder gleichsam mit der Pflanze selbst zeitig werde?

§. 19.

Was die Gegenwart einer Kalkerde in den Gewächsen, und dar in einem mehr als in dem andern anbelangt, so ist wohl daran kein Zweifel. Dann wann wir alle vegetabilische Aschen genau untersuchen, so werden wir fast in allen was kalkartiges finden, zumal nachdem sie stärker oder schwächer in Feuer behandelt worden. Ich muß bekennen, daß bey Lesung auswärtiger Beschreibungen von Russischen Pottasche, wo man selbige eines Beysatzes von vielem beschuldigt, ich öfters gedacht, es möchte wohl diese Entstehung Kalkwesens guten Theils auch eine Wirkung des starken Feuers seyn. Woher dann aber diese Kalkerde ihren ersten Ursprung nehme, dient eine genauere Prüfung. Hierüber will ich hier meine Gedanken mittheilen, bitte aber sie unterdeßen als bloße Muthmaßungen aufzusehen, zu deren Beyfall ich niemand bereden will.

§. 20.

Ich habe mich gleich im Anfang dieser Schrift selbst beschuldigt, daß ich schon lange sehr geneigt gewesen, die Salzerde als den Grund der Kalkerde anzusehen, und daher schien es mir natürlich, daß alcalische oder Laugen-Salze überall, besonders aber in den Gewächsen zugegen seyn könnten. (*) Meine Vorstellung davon ist, die ich solche hier und dar in meinen Schriften blicken lassen, diese: Ich glaube nemlich, daß das gemeine Salz ganz zerstöhrt, und aus
 sei

(*) Das ein wirkliches alkalisches oder Laugensalz, vor Eindöhrung der Pflanzen oder Gewächse in ihnen vorhanden sey, ist jetzt eine bekannte und fast allgemein angenommene Meinung, nachdem uns der berühmte Wargen den Weg gezeigt hat, solches zu finden. Es verdient aber hier absonderlich diejenige nützliche Abhandlung, des Hrn. Dr. und Stadtphysici Brunnwieser, in Kellheim nachgelesen zu werden, die in VII. Bandt der Churfürstlich-Bairischen Akademie-Schriften zu finden

seinem Wesen gesetzt werden könne, und daß es erstlich sein *alkalisch* Wesen, so eigentlich das *alkali minerale* ist, absetze. Dieses hernach durch viele andere Canäle, Wege und Umstände, wo es immer mehr und mehr, seine noch etwas grobe und kalkartige ablegt, reiner und feiner, und dem vegetabilischen *Alkali* immer eher. Dann allem Vermuthen nach, besteht der Unterschied zwischen diesen beyden *Alcalien*, in der Subtilität ihrer Erden: so wie selbst an den vegetabilischen Laugen-Salzen einen Unterschied, in sehung der gröbern und subtilern Erde findet. Die abgesonderte in Gewächsen gebliebene kalkartige Erde, wird nun nach der Natur und Beschaffenheit der Gewächse, ihnen entweder mehr angethan, und verändert, oder in ihrer Art gröber zurück gelassen.

§. 21.

Allein, nun ist die schwereste Frage noch zu beantworten; nemlich, wo kommt das *acidum vitrioli* her, so den Selen in der Rhabarbara darstellt? daß dieses eine Frage sey, die ebenen Ausspruch als *ex tripode dictum*, so leicht erkennen und annehmen wird. sieht ein jeder leicht selbst ein.

Des großen Hallers Ausspruch:

In das Innre der Natur, dringt kein erschaffener Geist
wird wohl in seinem Werth bleiben; ich werde mich wenigstens
rühmen, daß ich der Natur ihre Geheimnisse abgelauert habe:
erlaube man mir Muthmaßungen vorzutragen, ohne, wie ich
erinnert, sie jemandem aufzudringen.

§. 22.

Alle Chymisten, die sich auf physicalische Gründe berufen,
behaupten zu, daß man alle dreyerley mineralische Säuren in Form
Ge

stalt eines salis medii, in verschiedenen Gewächsen antreffe, jedoch
 die Spuhren vom gemeinen Salze am häufigsten vorkommen.
 sey nun ein Fehler von mir oder nicht, so will ich es doch lieber hier
 einmal bekennen, daß ich zwar meine erste Meinung, die ich bey-
 e vor 40. Jahren in Commercio litterar. Norimb. geäußert
 e, nemlich daß das acidum salis wohl das allgemeine Saure
 möchte, in so weit widerrufen, indem ich angenommen, es könnte
 hl dasjenige Saure oder acidum, so man das allgemeine oder ei-
 ihm ähnliches seyn, weil es sich meistens unter dieser Gestalt ent-
 fet, wie z. E. daß es mit einem reinen alcalischen Weinstein-Salze
 n tartarum vitriolatum darstellt. Allein ob das acidum salis
 die Salz-Säure nicht durch verschiedene Umstände und Wege,
 em es einige ihm eigene oder specifische Theile, die es eigentlich
 Salz-Sauren machen, wieder ablegen, andere annehmen, und
 also in seiner Art und Natur verändern könne, daran habe ich
 niemals gezweifelt; welches auch heute zu Tag, viele der neuern
 omisten zugeben. Und wo anders sollte man wohl den Ursprung
 verschiedenen Salze und ihres acidi suchen, als in der Verän-
 ung und Verwandlung während der Circulation in den besondern
 eigenen Gefäßen der Gewächse? warum giebt das Eichenholz,
 andere sogenannte adstringentia, Spuhren einer vitriolischen
 ure? andere Gewächse einen Salpeter? die meisten aber salzartige
 uhren von sich? dieses ist eigentlich der Grund, worauf sich meine
 ihmahung gründet. Erstlich daß ich glaube, das Salz gebe den
 wächsen die kalkartige Erde; diese wenn sie mit der Zeit mehr sub-
 irt und das gröbere abgesetzt, oder auflöslicher worden, und vie-
 t einen Zuwachs einer Säure erhalten, wird zum mineralischen
 li, wie Gaubius ein Pfeffer angetroffen. (*) Geht aber diese
 ränderung weiter, so, daß alle grobe kalkartige Erde abgeschieden
 T t wird,

(*) Adversar. var. argum. de Pipere.

wird, so stellt es endlich das vegetabilische alcali vor, wie am Weizenstein zu sehen ist. (*)

§. 23.

Wenn ich nun also annehme, daß das gemeine Salz in den Gewächsen sich völlig zerstören und verändern laße, so scheint es auch natürlich zu seyn, daß Salz-Säuren auch eine andere Natur und Eigenschaft annehmen können? ich bin schon lange von der Meinung entfernt, daß alle natürliche Verrichtungen sowohl im Zusammenhange, als in der Zerstörung natürlicher Körper, Chymischer weise, oder wohl gar, durch des Feuers Gewalt, geschehen müssen. Man

(*) Ich kann hier nicht mit Stillschweigen diejenigen Anmerkungen, die ich eben, da meine Schrift bereits dem Druck übergeben war, in des vorerwähnten Mineralogen Cronstedts Versuch einer neuen Mineralogie 2c. Copenhagen No. 1765. auf der 28. Seite unter dem §. 21. finde, hier einzurücken. Diese Sache scheint zwar ein Gegensatz von meiner Meinung zu seyn, in so fern es scheint, als glaubte man, daß aus Kalksalz entstehen könne; da ich im Gegentheil den Kalk vom Salz herzuleiten suchte. Ich würde mich vielleicht dieser Meinung beigefügt haben; wo mir nicht erstl. im Wege stünde, daß ich glaubte, das Salz sey eher, als Kalk gewesen, und in solcher Menge, daß es mit dem Kalk keine Vergleichung komme; von Kalk, nimmt man auch wahr, daß solcher theilweise, folglich nach und nach entstehe; vieler andern Bedenken hier zu schweigen. Die Anmerkung verdient aber ganz hier beigesetzt zu werden, mit der geneigte Leser selbst sein Urtheil darüber fällen kann. Anmerk. „ad „ 21. Vielleicht giebt es Kalksteine, die die Koch-Salz-Säure in verschiedenen Verhältniß enthalten, die uns bisher unbekannt sind. Es ist fast unglaufl., wie vielen aufgelösten Kalk das See-Wasser enthält. Eben aus diesem Kalk erhalten die mit Schalen versehenen Thiere die Materie zum Bau ihrer Schalen. Es kann seyn, daß sich die Natur einen Weg, aus dem Kalk mineralisches Laugen-Salze zu erzeugen, vorbehalten habe, und daß also wohl der Kalk, als die Kochsalz-Säure zu dem Ende im Wasser vorhanden, daß sich beide nach und nach zur Erzeugung des Koch-Salzes vereinigen sol-

läre und beweise uns nur die besondern Wirkungen der anziehenden und aneignenden Kräfte in den Gewächsen. Wie kommt es, daß auf einer Stelle gesunde und tödtliche Pflanzen wachsen? sollte man dieses nicht in der besondern Eigenschaft sowohl der Grund-Materie der Gewächse selbst, als auch in den besondern Einsaugungs-, Absonderung-, und Ausdünstungs-Gefäßen suchen? sollten dann auf solcher Art nicht selbst die Säuren und Salze sich verändern können?

§. 24.

So lange nun die Salinische Erde in Gewächsen ihre Natur noch nicht gänzlich abgelegt und verändert hat, so lange wird solche von wäſrigen menstruis noch aufgelöst, wie bereits von der China, und andern adstringirenden Dingen gezeigt worden: hat solche aber durch Zeit und Umstände ihre Salzartigkeit völlig abgelegt, so kann sie, Kalkartiger Natur gemäß, die allgemeine Luftsaure, die selbst in den Stiptischen Pflanzen zugegen ist, anziehen, sich damit zum Selenit, mit Beyhülfe der äußerlich umgebenden Luft, und dann enthaltenen Säure verwandeln: dann die S. II. gemeldte Erfahrung bestätigt, daß die Rhabarbara um so mehr Selenit erzeuge, je älter sie wird. Wie dann dieses auch selbst dadurch bestätigt wird, daß die feine trockene, und im trockenen verwahrte, und aufbehaltene Rhabarbara, immer am Gewicht etwas zunimmt.

§. 25.

Wahr ist es, man findet fast bey allen Schriftstellern die von der materia medica geschrieben haben, daß sie der Rhabarbara eine besondere, und ich möchte fast sagen, entgegen gesetzte Wirkung, nemlich laxirende und nachdem adstringirende, oder wie sie sagen roborirende Kraft zuschreiben. Jedoch ist es hier auch öfters, daß man hören muß; die Rhabarbara wäre Hæmorrhoidarius nicht zuträglich,

BENEDICTI STATTLERI

Professoris Theologicæ Ingolstadii.

SOLUTIO

PROBLEMATIS

ACADEMICI:

**I quibus viribus exceptio illa a legibus
hydrostatices oriatur, quam fieri observamus in aqua
quiescente, in vase non semper ad libellam, sed ad super-
ficiem concavam sæpe numero, se
componente.**

3.) Si aqua eisdem materiis. metallis nimirum, vitro, lapidi &c. exigua unius guttulæ quantitate imponitur in plano, non servat guttulæ figuram sphaericam, sed diffluit, idque multo magis, si jam prius talium solidorum corporum superficies aqua humectatæ fuerint. Quodsi vero sebo, vel alia materia pingui, obducas superficiem talis solidi, aquæ guttula, quin diffluat. sub forma sphaerica consistet.

4.) Mercurii guttulæ in plano metallico similiter diffundunt, non item in vitreo, vel alio non metallico. Oportet metalli superficiem tam in huius, quam secundæ, observationis hypothese esse prorsus mundam ab omni muco vel alia foede leviori, atque etiam omnis humectatio metallorum prioris halitum caveri debet. Quin ipsum quoque mercurium transmissione per corium ab omni fœce prius purgatum convenit.

§. 2.

In proplemate preposito solius quidem primæ observationis (§. præc.) ratio sufficiens exquiritur: attamen ipsa observationum analogia innuit, communem quandam omnium esse rationem, nec primam ex sufficiente ratione explicari posse, nisi etiam ceterarum explicatio addatur. In singulis enim exceptio quædam a communi lege Hydrostatices occurrat, que exigit, ut fluida tamdiu, ubi sine obice possunt, versus terræ centrum descendant, donec superficiei summæ partes omnes sub eadem libella consistant: atqui seu cavam in vitæ superficiem, seu guttulas sphaericas in plano, efforment fluida, recedunt ab illa communi lege. Occurrent vero in decursu Dissertationis huius multo plura experimenta, in quibus omnibus similis exceptio ab illa Hydrostatica intervenit, quæ
proin

in omnia communem causam similesque explicatus sup-
nunt.

§. 3.

Offendam vero, exceptionis illius communis a gene-
i lege Hydrostatices (de qua §. præc.) communem ratio-
nem proximam sufficientem esse vires cohæſionis tum com-
mes omnium corporum, tum fluidis proprias; quæ ipsæ
hæſionis vires a viribus attrahentibus itidem omnium cor-
porum communibus, ceu ab ulteriore ratione sufficiente, de-
nuntentur. Quem in finem oportebit 1.) explicare ipsam
naturam & existentiam virium cohæſionis juxta, atque virium
attrahentium, 2.) definire leges actionum utrarumvis virium
attrahentium, 3.) derivare ex his explicationem, præcipuorum
phenomenorum cohæſionis corporum tam firmorum, quam
fluidorum, atque inter ista speciatim evolvere ex eisdem le-
gis rationem proximam sufficientem phenomenon §. 1.
actorum: id quod totidem paragraphis præstabo.

II. De Natura Cohæſionis & virium attracti- varum eam determinantium.

§. 4.

Per vim motricem ego intelligo rationem sufficientem
motus absoluti, per quam se movent elementa cujusque cor-
poris sub certa celeritate & directione, quamdiu non obstat aliud
corpus ipsis quoad statum motus dissimile, in linea directio-
nis motus ipsorum collocatum; & per quam vim agunt in
corpora ipsam in omni incurſu & occurſu tamdiu, donec simili-

II II

tudo

tudo quoad statum motus in utroque existat. *Vis ipsa substantialis* & constans, certa vero *celeritas & directio accidentalis* haberi debet; quia variabilis est. Unde id, quod in ratione motus variabile est, & celeritati ac directioni respondet, *determinationem ad motum* sub certa celeritate ac directione appello.

§. 5.

Per *vim inertiae* intelligo vim, qua corpora quiescentia, aut tardius mota, reagent in alia in se motu celeriore incurrentia. ac tantundem de ratione seu determinatione (§. præc.) motus absoluti destruunt in his, quantum ab illis recipiunt, donec ope æqualis actionis & reactionis oriatur utrinque similis status motus.

§. 6.

Utraque hæc vis, quatenus in eo consentit, quoad corpora alia ab eo loco pellat, aut ad quem proprium eius subjectum tendit, aut in quo idem actu locatum est, communione *vis repulsiva* appellari potest: quatenus enim inest in corpore motu, repellit alia quiescentia, aut tardius mota, & loco, ad quem actu directione sua tendit: quatenus vero inest in quiescentibus, aut tardius motis, repellit alia in se motu celeriore incurrentia a loco, in quo eius subjectum actu est.

§. 7.

Per *vim attractivam* designo vim, qua diversa quacunque elementa corporum mutua transeunte actione in se invicem, aut unum in altero, producat determinationes ad motum

n mutui accessus, five directioni versus se tendenti, respondentes (§. 4.)

Non isthic disputo de realitate harum virium. Tametsi enim hæc mihi certissima sit, atque ea, quæ in se haud agunt invicem, perinde atque respectu sui invicem non existentia haberi debere existimem: nihilominus, sicui lubeat causam omnium motuum in Deo solo reponere, nihil id toti huic disquisitioni obstabit. Quod enim nos de virium istarum actionibus, determinationibus, mutationibusque dicemus, in istiusmodi hypothese de voluntatis divinæ omnia moventis legibus ac variis determinationibus intelligere oportebit.

§. 8.

Vis motrix, quæ sub certa qualibet celeritatis & directione determinatione corpori inest, magis motui in partem oppositam resistit, quam in quiescente sola vis inertiae resistat motui eius, five æqualis celeritatis. Experientia istud quidem obviat a posteriori. Sic ut globum secundum certam directionem procurentem retrorsum pellas per viam contrariam pari celeritate, dupla vi opus est, quam opus sit ad eundem in quiescentem æquali celeritate propellendum. Pariter nassam prægrandem e fune suspensam moveas motu oscillationis quocunque, modica vis sufficiet: ut econtra eandem contra vim gravitatis acceleratricem recta sursum attollas eadem celeritate, multo major vis adhibenda erit. *A priori* vero est; quod primo vis motrix contraria æquali actione defendenda, ac tum primum nova actione vis inertiae superanda est, cum corpus in statu motus absoluti actu constitutum sursum in oppositas partes repellendum est,

§. 9.

Cohærere partes corporum quælibet dicuntur, dum se mutuo (sensu iudice) contingentes separationi mutuae magis, quam vi inertiae sola consueverunt, resistunt.

§. 10.

Quoniam ergo motui aliud non resistit nisi vis inertiae, aut vis motrix: idcirco I. *Corporum partes quælibet mutuo coherentes VI MOTRICE sub determinationibus ad partem oppositam directis ad motum contrarium tendunt. (§. 4.)*

II. *Corporum partes quælibet coherentes vi sua motrice tendunt ad motus oppositos æquales, quamdiu quiescant: secus enim prævalente alterutra vi oriretur motus communis secundum directionem excedentis.*

III. *Corporum partes quælibet coherentes perpetuo in se invicem æqualiter agunt, & reagunt, hoc ipso, quod sibi continuo viribus motricibus æqualibus mutuo occurrant (§. 4.)*

§. 11.

Vim motricem, qua partes corporum quælibet aliis coherentes, ad contactum istarum nitantur, & separationi resistunt (§. præc. I.) *vim cohaesionis* appello. Unde, *causam cohaesionis corporeae ejusque virium causam* inquirimus, *causam efficientem* quaerimus, *quæ continuo in elementis ac quibusvis partibus corporum contiguas determinationes ad motus contrarios & æquales producat, quamdiu illæ coherant, & tantas, quantis coherant, seu quantis separationi resistunt observantur (§. præc. II.)*

* Causa

causa cohaesionis apertam analogiam habet cum causa gravitatis corporum partialium idem aliquod totale corpus, e. g. tellurem, in hoc mundo componentium, eo solum discrimine, quod gravitas non tantum in contacta, sed etiam in maiore distantia, vim suam exerat, qua & versus commune centrum nititur, & separationi ab eodem resistit. Quoniam ergo hodie vix non pro certo constat, gravitatem aut a viribus realibus attractivis existere, aut ab ipsius Dei actione immediata repetendam esse, praëdicata sententia videri poterit, cohaesionem quoque corporum ab eadem causa proficisci. Interim tum clara propositi problematis solutio, tum ipsa gravitatis lex a cohaesionis lege multum dissimilis, distinctam causae cohaesionis explicationem a nobis postulat.

§. 12.

Observationes obviae ostendunt, cohaesionem mutuam esse proprietatem generalem & omnibus corporibus, cunctisque illorum partibus communem. Corpora omnia aut firma sunt, aut fluida. I. *Firmorum* corporum partes omnes inter se ter cohaerere perspicuum est. De *mollibus* itidem id matum est, e. g. de cera, argilla &c. II. De *fluidis* exin-
atet, quod omnes materiae fluidae sensibiles id proprium ant, ut earum partes minimae sibi similibus, dum lente di ex vase incipiunt, guttularum satis sensibilibus specie e marginem vasis aliquamdiu ita adhaereant, ut non nisi cadere vi gravitatis suae incipiant, cum jam major ipsa-
portio, guttulæ magnitudinem superans, extra marginem unere inceperit. Cohæsiō itaque illarum mutua vim gra-
is superat, atque adeo & vi inertiae major est (§§. 8.9.)

Est autem quævis ejusmodi guttula visibilis hand dubie jam ex multis millibus partium materiæ homogeneis composita; atque adeo necesse est, vim cohæſionis earundem gravitatis multarum millium id genus partium simul sumptæ cœquari. Deinde guttulæ homogeneæ omnium fluidorum, cum primis sibi contiguæ sunt, confluunt continuo.

De *æere & igne* fortassis dubites, an suis quoque partibus cohæreant. At constat, ærem subinde etiam aqua magis viscosum se præbere, difficilius ex ampullis arctioris officii prodire, & in minimas particulas dispesci a trudente sursum aqua, ut in horologiis aquatieis observare est. Constat, eundem vasorum asperitatibus ita adhærere, ut sursum trudi ab infuso graviore fluido se non sinat, sed in ampullis vitreis tum primum se in bullularum specie ad totum marginem prodât, cum coctione super igne proxime ebullire aqua incipit, aut hæc sub recipiente vacuo collocatur. In ipsa *flamma* notabilis cohæſio partium observatur, cum pars illius motu quocunque æris agitur, partesque aliæ aliarum motum consequuntur.

III. *Adhærent quoque fluida firmis, & firma fluidis.* Laminam marmoream, ex libella in æquilibrio cum pondere aliquo suspensam, subtus ad contactum admota primum, ac dein rursus submota aqua, ex æquilibrio deorsum dimovebit, eritque additione aliqua ponderis opus, ut in æquilibrio adversus cohæſionem illam retineatur. Idem in alio quovis corpore solido, quod aqua gravius est, experiri, uti & si alia quæcunque fluida adhibeas, quæ nec a corpore solido secundum gravitatem specificam multum supereatur, nec ipsa illud superent. De mollibus, e. g. de cera, pice, argilla molli &c. id ipsum aliquin notissimum est.

IV. Maxima autem esse cohæſio obſervatur in minimis
iculis materiarum primigeniarum, ſeu porro irrefolubilium,
quibus omnia iſtius mundi corpora componi ex chemiæ
yſi probatiſſima perſpicimus. Cum enim illæ particulæ
ûgeniæ æris, aquæ, terræ &c. haud dubie ulterius ex
licioribus elementis innummeris adhuc componantur, nec
in vi ulla creata unquam in hæc reſolvi poſſint, necesse
in eiſdem partes illas componentes iplaque elementa,
omma cohærere.

ſequæ obſtat univerſalitati huius proprietatis corporum, co-
hæſionis mutuæ videlicet, quod corpora firma, prius
diviſa, ac deinde ſecundum planas ſuperficies ſibi mu-
tuo appoſita non ſemper ad ſenſum ſtatim cohæreant.
Nam 1.) ſi cohæſio eſt admodum exigua (ob leves vi-
delicet contactus, cum non niſi in contactu locum ha-
beat, §. 9.) propter pondus ſolidi, quo vincitur fa-
cillime, percipi eadem ſenſu non poteſt. Videmus
vero, omnia corpora leves in pulveres redacta con-
tinuo ſolidis adhærere. 2.) Sæpenumero corpora pla-
na, quæ ſe proxime contingere videntur, ſeſe vel om-
nino non, vel pauciſſimis in punctis contingunt: prius
contingere poteſt vel ob ærem ubivis interpoſitum
vel ob adhærentes fordes heterogeneous; alterum ob
aſperitatem ſuperficierum, quibus corpora ſe tangunt,
quam microſcopia abunde detegunt in maxime etiam
politis ſuperficiebus: unica enim prominens particula in
ſuperficie politiſſima innumeras alias impedire a contactu
poteſt. Remotis contra impedimentis hiſce, & contactu
frequentiore procurato, cohæſionem etiam in firmis
corporibus mutuam obtinere brobant experimenta ſe-
quen-

quentia: *a*) globuli plumbei ex bombardâ ejectione lapidem (nisi hic in pulverem aëre permixtum comminatur) aut in lignum, utrique firmiter cohererenti & globuli ex argilla sicca: *b*) metalla, cum tornantur cœlo fortiter adhærent, nisi sufficiens olei copia interpunguntur: *c*) ferrum candens solo ictu mallei cum alio candente cohesionem obtinet: *d*) plumbi segmenti recentia, nulloque mucro infecta, sola appensione sua fortiter coherent.

** Quoniam itaque cohesio generalis quædam omnis materiei & ipsis minimis ejus partibus communis proprietas est, causam quoque illius generalem & omnibus materiei partibus communem existere oportet; quam porro præsens inquirimus.

§. 13.

Cohæſionis causa efficiens nec ipse contactus, nec figura partium coherentium, in corporibus esse possunt.. Cohæſio enim in actione tota consistit, quæ partes coherentes & alios motus contrarios tendunt, & separationi vi majore quam solus inertiae resistunt (§§. 9. 10.). Atqui contactus juxta æque figura omnis omni virtute activa carent. Figuræ quoque solidæ seu extensæ, ipsæmet jam firmam partium suarum, omne extensum componentium, cohesionem supponunt; neque vis motui resistens, huncque reactione sua destruens (§. 10.) ex sola ipsa compositione partium omni simili determinatione motus plane carentium existere aut nasci potest.

§. 14.

Quoniam tamen nulla cohesio sine contactu sensibili existit

et universe; ideo patet, *contactum esse conditionem, sine
vis cohæſionem efficiens exerere actionem non possit.*

§. 15.

*Cohæſio evidenter non oritur a causa corporea quacun-
que elementis in quovis corpore cohærentibus extrinseca. Vel
id genus causa essent alia elementa corporea prorsus
indifferentia, suo incurſu ac pressione elementa unius corporis
indifferentia in contrarias partes versus se invicem; vel causa
essent corpuscula quædam jam extensa atque ex elemen-
tis simplicibus ipsamet quoque jam firmiter cohærentibus com-
posita & composita? Non primum; quia id genus elementa
indifferentia etiam ipsa simul partibus corporeis cohærentibus co-
hererent ob vires suas motrices ad motus e diametro oppo-
site determinatas, quibus divulsioni mutue item vi majore
vis inertiae resisterent (§. 9.). Unde de his ipsis
elementis quaestio redibit, a qua causa ipsamet vires suas
motrices sortiantur, ac proinde petitione principii id genus
quaestio laborabit. Non alterum: quia pariter de illis ipsis
elementis redibit eadem modo proposita quaestio; unde vi-
detur ipsa elementa, ex quibus jam extensa illa corpuscula
simpliciter componuntur, vim cohæſionis suae, in primigeniis
ipsius particulis summe firmam ac stabilem (§. 12. IV.)
habere. Quoniam ergo inter duo prædicta medium non
intercedit; sequitur, cohæſionem evidenter a causa corporea
extrinseca oriri non posse.*

*Ex generali theoremate, ejusque absolutissima demonstrati-
one, ingulantur prorsus omnes hypotheser, quæ cohæſio-
nem corporum a materia quacunque fluida, seu ætherea,
seu aere seu alia quavis, partes firmorum corporum*

comprimente, repetunt. Cohæsiō nimirum ipsis elementis corporum simplicissimis jam compepetit, & ea cohærere inter se debent, id est, determinationibus ad motus oppositos versus se invicem con-
 niti, ut irresolubiles particulas primigenias conficere queant (§. 12. IV.). Jam vero in quacunque causa extrinseca ad mundum corporeum pertinente, si ab ea elementa prædicta ejusmodi determinationes virium motricium oppositas recipiant, cohæsiōni proprias, profecto jam prævie determinationes similes inesse debent. Quodsi ergo illa rursus meris elementis extrinsecus prementibus constet; redit haud dubie de his ipsis quæstio: unde id genus determinationes motus oppositas ipsa fortiantur, & quidem, quomodo easdem licet actione & reactione contraria identidem destruantur, continuo novas recuperent. Si vero causa illa extrinseca non in *elementis* a se invicem solutis consistere ponatur, sed in *corpusculis* jam extensis, materialibus, & compositis; infuida materia eam constitui oportet, de qua sola constat, quod pressionem, quam a naturali gravitate in quavis a terræ centro altitudine habet in omnem undique partem æquali vi propagare possit, atque adeo corpus solidum sibi innatans undique ex omni parte versus sui medium æquavj comprimere. Attamen cum omnis materia, ut cunque subtilibus particulis extensis constans, ac fluida, jam solidam firmitatem particularum suarum specificarum supponat, id est, firmissimam cohæsiōnem elementorum, ex quibus illæ singillatim componuntur, evidens est, principium rursus peti, nisi isthæc ipsa cohæsiō per aliam demum causam explicetur, quæ sit ab omni
 seu

sen elementorum, seu corpusculorum quorumcunque, extrinseca pressione diversa. Imo nec illud quoque concipi potest, quo pacto particulæ jam extensæ & firmæ, & figuris e. g. sphaericis præditæ, elementa simplicia prævie adhuc soluta, & necdum coherentiæ, salvis, quæ observantur, interstitiis, ita undique comprimere possint, ut ex omni parte cohereant æqualiter, nec versus interstitia identidem elabantur. Unde demonstratione ista ad omnem usque evidentiam mihi evinci plane illud videtur, videlicet cohesionem corporum ab extrinseca quacunque pressione oriri nullatenus posse, perinde quidem, uti nec gravitas ob similem prorsus rationem a pressione id genus existere ullo pacto potest, postquam demonstrationibus Newtonianis semel evictum est, illam generalem omnium corporum ac ipsis omnibus elementis simplicibus communem proprietatem esse, qua elementis singula ad omnia alia visu mutuo nitantur.

De ære quidem constat, ab eo duo corpora jam ante firma, & planis marginibus sibi mutuo accurate congruentia, si omnis alius ær intermedius excludatur, vi magna admodum posse comprimi, uti fieri scimus in hemisphaeriis Magdeburgicis, in cylindris secundum bases lævigatas invicem conjunctis &c. At vero id genus compressio nunquam non corpora comprimenda jam prius firma suisque partibus aliunde firmissime coherentiæ supponit, ut locum ipsa habere possit. Profecto enim, si cylindris solidis substitutum æquale ac figura simile volumen aqueum nobis imaginemur; istud, licet pari vi undique ab ære circumscito prematur, nul-

lo tamen pacto ea firmitate, qua marmora solent, cohæreret. Taceo, aërem ex aliis capitibus evidenter pro cohæsionis causa non quadrare; uti *quod* etiam in vacuo Boyleano eadem sit cohæsiō solidorum; *quod* pressio aëris in bases cylindricas 25. linearum Parisiensium vix æquet 50. libras; cum tamen filum aureum, cuius diameter unam adæquat lineam, 600. libras sustentet etiam in vacuo Boylei, antequam abrumpatur.

*** *Materiam ætheream* longe etiam aëre ineptiorem cohæsionis causam fore, multis argumentis probari possit. Sed sufficiat præter evidentiam demonstrationis generalis ante propositæ, *primo* quod aëre longe illam leviores esse debere multa quidem evincant, *deinde* quod poros omnium solidorum æque ac fluidorum corporum libere pervadendo more fluidi perfectissimi pressione sua in omnem partem æqualiter propagata æque particulas solidorum corporum, ab aliquo nexu non devinctas, divellere posita in interstitiis deberet, atque glacies aquea ab interlabente æthere dissolvitur: *denique* cohæsiō semper magnitudine sua non tam contactus magnitudinem proportionem sequi deberet, quam superficiei, in quam pressio perpendicularis materiæ æthereæ exereretur: atqui contrarium experimur; siquidem si duo æqualibus segmentis resectis sibi mutuo apprimantur, superficies, in quam seu æther, seu aër, pressionem extrinsecam perpendicularem exerere poterunt, semper æqualis erit circulo maximo æqualis sphaeræ, quamdiu segmenta resecta hemisphaerio minora erunt; & tamen cohæsiō pro magnitudine contactus inæqualis erit, & major, si majoribus

ribus reſectis ſegmentis globi ſecundam circulos majores ſe contingant.

§. 16.

Quoniam cauſſa efficiens cohæſionem elementorum, æ quarumvis partium corporis ad alias, non eſt extra omnia elementa vel partes cohærentes, ſuperest, ut ea ſit *vel* in elementis ipsis cohærentibus, *vel* in partibus jam extenſis corporeis inter ſe cohærentibus, *vel* extra omnem mundum corporeum in ipſe Deo. In partibus jam extenſis qua talibus in ſe illa haud poteſt; quia cohæſionem, id eſt, determinationes ad motus oppoſitos æquales, (§. 9. 10.) actione ſua efficiere debet: atqui vis activa efficiens non ineſt partibus jam compoſitis qua talibus, nec ſola compoſitione naſci poteſt, ſed ineſt ſolis ſubſtantiis ſimplicibus. Itaque *cauſſa ſeu vis efficiens cohæſionem aut in ipsis elementis ſimplicibus quarumvis partium corporis cohærentium ineſſe debet, aut ab ipſo Deo repeti debet.*

§. 17.

Si cauſſa ſeu vis efficiens cohæſionem in ipsis elementis partium quarumvis corporearum actu cohærentium ineſt, (§. præc.) alterutrum fieri debet ex duobus, nimirum *vel* actione tranſeunte elementum unum in altero ſibi continguo determinationem motus verſus ſe directi quovis momento de novo producere debet, ac viciffim; *vel* quodvis elementum implex actione immanente continuo in ſe ipſo de novo producere debet ſimilem determinationem motus verſus alterum continguum directi, hoc ipſo, quod determinationes iſtæ recta oppoſitæ in duobus cohærentibus quibusvis elementis conti-

qua actione & reactione virium motricium identidem destruantur. (§. 10. III.) Jam vero actio immanens, cen vere vitalis, nec supponi profecto debet in elementis mere corporeis; nec concipi omnino potest, quo pacto elementa ad hanc actionem præcise a contactu physico, tanquam a conditione physica sibi prorsus extranea, determinantur, nisi actio transeunteu determinans ac natura prior nihilominus in elemento contiguo admittatur. Ergo, *siquidem causa seu vis efficiens coactionem in elementis ipsis partium corporearum coherens, quarumvis reponatur, tenendum prorsus quod elementa ad sensum contigua actione mutua transeunte coactionem mutuam, id est, determinationes ad motus æquales oppositas* (§§. 9. 10. II.) *efficiant.*

* Illustris L. B. Wolfius quidem ab id genus actione vitali elementorum corporeorum, se ipsa mutantium quoad celeritatem & directionem virium suarum motricium, minime abhorret, cum Leibnitio supponens, unam quamlibet mutationem posteriorem a priore tanquam a ratione sufficiente determinari, omniaque elementa in mundo vi harmoniæ cujusdam præstabilitæ inter se in motibus omnibus moveri, quos in hoc mundo observamus. At enim nec in mente quidem nostra atque corpore talem vigere harmoniam, satis certum hodie habetur, indicaboque in scheda clausa, cui nomen meum inscripsi, quibus argumentis eam pro falsa haberi merito supponam.

§. 18.

Vim, qua diversa elementa corporum quæcunque actione mutua transeunte in se invicem, aut unum in altero, determinat.

minationes motus ad accessum mutuum directas producant, & attractivam §. 7. appellavi. Quodsi ergo causa seu visiciens cohaesionem in ipsis elementis contiguis mutua actio transeunte agentibus reponenda sit secundum dicta; §. præc. p. savis attractiva mutua elementorum in contactu coherentem causa efficiens cohaesionis erit, & universe per dicta §. 16. *Elementa singula corporum universe vi attractiva prædita censenda sunt, quæ cohaesionem mutuam efficiat* (liquidem hæc generalis & omnium corporeorum elementorum communis proprietas est per §. 12.) *aut cohaesio omnis ab ipso o, seu ente quodam incorporeo, mundum omnem actione sua vadente, repetenda necessario erit.*

Jam quidem cuique liberum erit eligere ex his duobus alterutrum, quod velit; Philosophum tamen decet, haud plus uspiam affirmative asserere, quam quod probare possit. Tamen si vero mihi certum sit, vires activas reipsa in corporum elementis existere, ac necessario admittendas esse; nisi mundum corporeum mere idealem, aut omnis realis nexus expertem contra omnem sanam rationem admittere quis velit: tamen ad propositum præsens minime necessarium existimo, istarum virium realitatem operosius demonstrare. Sufficiet semel id unum monuisse, quoties deinceps nomine vis attractivæ usus sum, veram quidem vim elementis omnibus corporeis natura insitam a me intelligi; liberum tamen cuique relinqui, ut per leges, quibus determinari actiones virium istiusmodi deinceps uberius ostendam, non nisi eas leges intelligat, quas Deus ipse sibi in dirigenda cohaesione corporum pro suæ sapientiæ arbitrio constituerit.

§. 19.

Vis attractiva, quæ cohæſionem efficit, genere quidem eadem est cum vi attractiva generalem gravitatem determinante (ſiquidem hæc exiſtat;) attamen agendi lege differt, agitque iſta validius. Quod genere eadem ſit utraque, ex ſimilitudine effectuum patet; cum utraque communis ſit omnium corporum & elementorum proprietas, ac determinationes ad motus æceſſus mutui in duobus elementis ſeſe attrahentibus producat. Quod autem agendi lege differant, ex eo maniſeſtum eſt, quod gravitatio minimorum corpusculorum mutua (& a fortiori ſingulorum elementorum) etiam vicinorum, leviffima ſit, ſequæ ad cujuſque corpusculi gravitationem terreſtrem, qua terram verſus in hujus ſuperficie gravitat, proxime habeat ut ſemidiameter corpusculi ad ſemidiametrum terræ, ob legem gravitationis generalem, qua conſtat, quod particule materiæ intra ſphæram homogeneam, aut in ejus ſuperficie collocatæ, gravitent in illam in ratione directa diſtantiarum a centro; adeoque vi omnium maxima, cum ſunt in ipſa ſuperficie. Vide Newtoni Princ. Math. Phil. Nat. l. 1. prop. 73. Eſt vero ipſa gravitatio ejusmodi corpusculorum verſus centrum terræ experientia teſto proſecto minima: quanto ergo minor erit mutua eorum gravitatio verſus ſe invicem. At contra omnis cohæſionis vis major eſt terreſtri multorum millium inſenſibilium particularum gravitate etiam in fluidis, (§. 12. l.) quæ tamen leviffime cohærent; multoque major adhuc in corporibus firmis; maxima vero omnium in ipſis elementis particulas primigenias materiæ omnis componentibus, & tanta, ut nulla vi naturali poſſit unquam ſuperari, (§. cit. IV.) Ergo &c. &c.

§. 20.

§. 20.

Itaque pro distinguenda vi attractiva, cohæſionem efficiente, ab ea, quæ gravitatem generalem omnium corporum mutuam determinat, illam deinceps *vim attractivam specialem*, hanc *generalem*, appellabo.

§. 21.

Vis attractiva specialis non in contactu absoluto seu metaphyſico agit, sed solum in contactu ſenſibili seu phyſico, id est, reipſa in diſtantiâ quadam inſenſibili. Suppono enim, impenetrabilitatem corporum ſecundum recepta jam principia à vi repulſiva, (§. 6.) prope ipſum contactum metaphyſicum ſeu ſtrictè talem agente, oriri; ac proin, cum repulſio & attractio ſint effectus e diametro contrarii, ab eadem vi in eodem loco, ac ſubiecto eodem, uno tempore exiſtere haud poſſe. Itaque illud neceſſario concludendum, videlicet, cum vi repulſiva & attractiva in eodem elemento quoad ſubſtantiam non differant (ambæ enim non niſi determinationes ad motum accidentaliter ſolum, id eſt, directione, diverſas producant; §§. 6. 7.) eandem vim elementarum prope contactum metaphyſicum repellere, in contactu contra phyſico, ſeu in diſtantiâ quidem jam aliqua, ſed prorsus inſenſibili, attrahere, & adeo in primo impenetrabilitatem, in altero cohæſionem, omnibus elementis corporum communem, efficere.

§. 22.

Jam viſ repulſiva, quam attractiva ſpecialis, ſphaeram aliquam aſſivitatſ ad inſenſibile ſpatium extenſam habent. Primum ex reſtitutione elatiſtica poſt compreſſionem maniſeſtum

est, quæ motu accelerato fit. Unde si ponas, in ipso proxime contactu metaphysico vim omnem comprimentem elidi a vi repulsiva, impenetrabilitatem determinande; post compressionem elisam, ac cessante vi comprimente, vis ad rem repulsivam restituere figuram non poterit, nisi actione repellente aliquamdiu continuata. Cum ergo particulæ, quæ compressione ad contactum metaphysicum proxime pervenere, mox a prima repulsionis actione motum recessus concipiant; nisi vis repulsiva actionem suam in distantiam quamdam (insensibilem quidem & minimam) extendere ac continuare possit, adeoque nisi sphaeram aliquam activitatis habeat; unica actione repulsionem omnem absolvet, proindeque restitutio motu accelerato haud fiet; imo necesse erit ad figuræ pristinae restitutionem simpliciter faciendam, ut vis repulsiva, in solo contactu metaphysico agens, contra legem continuitatis producat una simplici actione vim motricem recessus intensam, & toti restitutioni figuræ sufficientem; quorum prius contra experientiam, alterum contra receptum principium est.

Alterum ex resistantia patet, qua corpora omnia tensioni resistunt. Nisi enim sphaera activitatis in vi attractiva speciali, cohesionem determinante, ad aliquod (insensibile nimirum rursus ac prorsus minutissimum) spatium extendatur, in quacunque tensione corporum, qua actu e. g. chorda ad longius spatium extenditur, aut fieri abruptio nexus deberet, aut mox sub tensionis initium cohesio vi summa sibi propria resistere tensioni deberet. Atqui contrarium experimur, neque in omni tensione nexus abruptio consequitur, nec initio statim summa, sed minima potius, resistantia sentitur, quæ deinceps cum vi tendente crescit, atque ante abruptionem summa est. Cum ergo etiam tensione aliqua acta
facta

sta adhuc cohæſio perduret, & quidem cum maiore vi retens ulteriori tenſioni; neceſſe eſt, ut vis attractiva, quæ la cohæſionem determinat, in elementa etiam iam aliquo que diſtantiâ agat, adeoque ſphæram activitatis aliquo uſe proteſam habeat.

Non eſt, cur conceptus præpoſterus actionis in diſtans hic intervenientis nos perterrefaciat. Actio in diſtans non niſi illa dicitur, cum agens agit in ſubjectum remotum, quin agat in aliud intermedium actu præſens & eiufdem effectus ex æquo capax. Certe hæc ſola eſſe impoſſibilis & experientiæ contraria vere probatur. Altera illa in hoc theoremate aſſerta tam parum heteroclitici quid habet, quam actio in contiguo loco; quippe in quo agens tam parum eſt locatum, quam in paullo remotiore.

- Ceterum, tametiſi lex, ſub qua gradus actionis creſcunt tam in vi repulſiva, quam attractiva ſpeciali, intra ſphæram cuiuslibet, accurate definiri nullo pacto poſſit; ſequentia tamen utriusque adjuncta extra controverſiam accerta eſſe videntur. Nimirum. 1.) *Non poteſt eſſe æqualis gradus ac celeritas actionum in omni puncto intra ſphæram activitatis vi repulſivæ, ſed maximam oportet eſſe actionem proxime contactum metaphyſicum, quæ ſcilicet omni vi incurrenti & comprimenti quantumlibet magnæ in hoc mundo poſſibili extinguentæ par ſit; deinceps vero in reſeſſu a contactu illo ſemper minorem; donec in certo quodam diſtantiæ inſenſibilis termino vi repulſivæ actio penitus evaneſcat, eique ſuccedat actio attractiva.* Niſi enim ſaltem proxime contactum actio vi repulſivæ eſſe maxima ponatur; non ſufficiet omni

celeritati in hoc mundo possibili salva impenetrabilitate extinguendæ: si vero iam in distantia insensibili, in qua vis repulsiva agere incipit, huius actio esse maxima aut ubique maximæ illi æqualis, esse ponatur; vinci ea nunquam posset. nec compressio ulla elastica haberet locum.

2.) *Sed neque mox sub initium sphaeræ suæ vis attractivæ specialis actio statim maxima esse potest, sed tum quidem minima, ac maior semper in progressu; quin tamen unquam ad summam & insuperabilem magnitudinem perveniat.* Minor in principio, seu in confiniis sphaeræ evanescentis vis repulsivæ, esse debet; quia corpora, uti comprimuntur, sic tenduntur facilius in principio quam deinceps: nunquam vero maxima fieri potest, aut tanta, quanta est vis repulsivæ prope contactum metaphysicum; quia secus nulla nexus & cohesionis abruptio unquam possibilis foret, tam parum scilicet quam penetratio corporum mutua. 3.) *Longius maiore quadam in ratione inde a primo initio sphaeræ suæ crescere debet utriusque vis, repulsivæ, & attractivæ specialis, actio (illa quidem versus contactum progrediendo, hæc in regressu maiore a contactu) quam actio vis attractivæ generalis gravificæ (§. 19.) crescit imminuta distantia gravium, nempe plus quam in ratione quadrata auctæ distantiae a communi limite: secus enim, cum neutra ex illis duabus sphaeris, imo ne utraque quidem simul sumpta, ad sensibilem ullo pacto distantiam extendatur, intra tam exiguum spatium tanto excessu superare utraque actionem vis attractivæ generalis gravificæ nequaquam posset; quantum e. g. cohesio, & multo amplius repulsio impenetrabilitatem determinans, reipsa superare omnem vim gravitatis minimarum particu-*

icularum cohærentium observatur. 4.) *Postquam actio vis attractivæ specialis summæ magnitudinis suæ terminum in certa quadam insensibili distantia attigit, simili quadam in ratione minui eam rursus usque ad certum gradum, ac demum decrements eiusdem deinceps legi inversæ quadratæ distantie, quæ vi attractivæ generali gravificæ propria est, conformari oportet: quia constat, ut modo dictum, gravitatem simplicium elementorum, aut corpusculorum minimorum, versus se invicem enormiter cohæsione eorundem mutua minorem esse. Vide dicta §. 18.*

§. 23.

Punctum distantie a contactu metaphysico cuiusvis elementi corporei, in quo terminatur sphaera activitatis vis repulsivæ, atque in quo evanescente illius actione succedit ac incipit sphaera & actio vis attractivæ specialis, *limes cohæsionis*, aut *repulsionis*, vocatur; quia in illo puncto posita elementa respectu sui mutus nec attrahunt invicem, nec repellunt sensibiliter, sed præcise quiescerent, nisi ob vim motricem iam aliunde ex attractione vel repulsionem mutua, aut etiam ex actione extranea, iam conceptam intra alteram, repulsionis videlicet, aut attractionis, sphaeram inde abriperentur. Sit nempe in Figura I. hic adiecta linea quædam incertæ longitudinis AH ; cui ad perpendicularum insistat alia AC . concipiatur curva quædam legitima $CSLDEF$, F a recta quidem CA continenti ductu recedens, rectamque AH in loco L , ipsi A admodum vicino secans, atque post maximum ab hac recessum in D rursus versus eandem reverti, ac tandem desinere in cruce EF , quod rectæ AKF ita continuo appropinquet, ut lineæ

normales, rectæ AF ex illa parte applicatæ, nempe HE &c. decreſcant deinceps verſus F in ratione inverſa drata diſtantiarum AG , AH . 2.) Sit AL diſtantia; ad ſphæra activitatis viſ repulſivæ cuiuſque elementi in catt terminetur, & erit punctum L limes cohæſionis, in ſi reſpectu elementi prioris in A locati aliud elementum cunq̃ue ponatur cum priore homogeneum, neque attral nec repellent ſe invicem, ſed niſi aliunde ad motum det nata ſint, reſpective quieſcent. Quodſi elementum in L tum motu aliunde quocunq̃ue modo concepto feratur ex L ſus A , ambo elementa ſe repellere incipient ita, ut lineæ normales ad lineam AL creſcant verſus A in certa rati prout creſcit viſ repulſivæ actio, donec prope ipſum conta A fiat maxima, id eſt, tanta, ut par ſit ſummæ in hoc m per vires naturales poſſibili vi extingundæ, & omni per tioni elementorum impediendæ. 3.) Ubiquunq̃ue inter L liſtetur motus incurrentis elementi, extincta iam eiſ cele e. g. in R ibidem per vim repellentem retrorſum denu tur verſus B , & celeritate quidem ab R uſque in L iam cepta etiam ultra L intra ſphæram viſ attractivæ ſpecia pietur; donec iſtius contraria reſactione continua demu in B viſ prior ex repulſione concepta deſtruatur: quo ruruſ attractum redibit verſus L , ac denuo concepto i quodam ultra L rapietur verſus A , repelletur ruruſ, atq̃ oſcillabit aliquamdiu circa L ; donec omniſ deniq̃ue mot ceſſive deſtruatur &c. 4.) Quoniam tamen per §. 21. n. 2. viſ attractivæ ſpecialiſ actio nunquam ſummam ma dinem attingit, quantam attingit actio viſ repulſivæ: ic quoties viſ repulſivæ actio maior ſit propter viciniore cellum ad contactum (ex compreſſione e. g. ortum), qu a vi attractivæ ſpecialiſ tota actione deſtrui poſſit intra

omnem sphaeram, toties divulsio nexus, imo subinde explosio violenta dabitur, maior, minorve, pro maiore vel minore excessu vis repulsivæ supra totam actionem vis attractivæ; qui ipse excessus pendebit a prævia vis comprimentis, vel urgentis contactum versus, magnitudine. 5.) Vis quæcunque ad elementorum in *A* & *L*, existentium divulsionem tendens, si maior fuerit tota actione vis attractivæ specialis simul sumpta per integram sphaeram suæ activitatis e. g. *L. G.* (cuius itidem incrementi ac decrementi rationem expriment lineæ normales *BD*, *GI* &c.) nexum solvet, ac deinceps motui versus non obfistet alia vis quam vis inertiae elementi divulsi & attractiva generalis gravifica elementi in *A* positi, cuius tamen activitatis sphaera quoque, ceu non infinita utique, denique ipsa terminabitur in aliquo puncto *F*.

§. II. De legibus Cohæsionis corporeæ in hoc mundo.

Constat, vires repulsivas, inertiae iuxta, ac motrices, & vires attractivas generales gravificas in paribus distantis, constanter eam servare legem, ut sint in ratione materiae; ex quo sequitur, eas in omnibus corporum elementis homogeneas esse, & æquales in singulis. Atqui hoc ipsum disquisitionem de lege virium cohæsionis, & vis attractivæ specialis cohæsionem determinantis (§. 17.), summe involutam reddit, quod cohæsio corporum nequaquam rationem materiae sequi videatur; nec corpora pro densitatis ratione firma, mollia, aut fluida sint, sed potius e. g. mercurius densissimus sit summe fluidus, modicissimeque suis partibus cohæreat; adamas contra, plus duplo quam ferrum rarior, firmitate cohæsionis partium suarum ferrum longe exuperet. Inde factum, ut non nulli
hete.

heterogeneitatem elementorum simplicium in diversis corporibus suspicati fuerint, alii plures alternantes cohæſionis & repulſionis limites in diversis a contactu metaphyſico distantis confinxerint, alii inexplicabiles adhuc attractionis leges in cohæſione corporum determinanda existimarint; quæcumque certæ ac definitæ illæ in determinanda gravitate generali post summi viri Newtoni inventa illustra videri possint. Equidem postulati instar ultro mihi concedi peto, & vero ultro mihi concedendum arbitror ab omnibus æquis rerum arbitris, nec heterogeneitatem elementorum, nec multiplicatos cohæſionis limites, nec inæqualiter a contactu metaphyſico distantes, in istis, vel cogitatione concipiendos esse, si absque involutissimis id genus hypothesibus, salva tam homogeneitate elementorum, quam simplicitate limitis, omnia cohæſionum phænomena satis nitide & ex ratione prorsus sufficiente explicari queant. Atque istud iam exequi propositum mihi est.

§. 24.

In inquirenda lege virium cohæſionis ad gravitatem specificam (seu densitatem materiæ) non integri voluminis, sed minimarum in sua specie particularum cuiusque corporis attendendum est. Enimvero si elementa singula in cuiusvis corporis integro volumine æquabiliter disposita forent ita, ut singula a singulis circum undique pro ratione limitum cohæſionis (§. præc.) cuiusvis corporis elementis propria æqualiter distarent, ex sola diversa densitate & gravitate sub æquali integro volumine diversis corporibus competente, de ratione virium cohæſionis æquali, vel inæquali, statui mox posset. Quæ enim diversæ densitatis essent, ea cohæſionis limites magis minusve a contactu prædicto remotos haberent pro densitatis ratione: quæ vero densitate æqualia forent, inter ista ea viribus ipsis ele-

mentaribus attractivis harumque actionis magnitudine præ-
 re aliis certo statuenda essent, ad quarum partes sectioni-
 æqualium superficierum dissecandas vis maior requireretur.
 e demum & densitate, & cohæisionis viribus simul differ-
 ; ea simul quoque & cohæisionis limitum a contactu distan-
 & viribus ipsis elementorum attractivis inter se differre cen-
 la forent. At vero constat tum ex microscopiorum usu &
 rvationibus, tum ex experimentis infra §. 46. recensendis,
 aenta in quovis corpore minime æquabiliter sed ita, esse
 ibuta, ut modo alicubi densius in singulares firmas parti-
 s sint constipata, modo inter has ipsas particulas densiores
 male congruentes nec omne claudentes spatium figuras in-
 itia, nunc maiora, nunc minora, relinquant, & quidem
 vario discrimine, ut non raro sub æquali volumine den-
 s particulæ specificæ ob interstitiorum magnitudinem, &
 consecutam paucitatem suam, minus ponderent, volumen-
 integrum minus densum constituent, quam in alterius cor-
 s æquali volumine particulæ minus densæ, sed minoribus
 irectis interstitiis magis inter se constipatæ, & maiore nu-
 o consertæ. Jam vero cohæisionis magnitudo in singulis
 iculis specificis quærenda est, eo quod corpora utique non
 mole, sed quoad singulas particulas cohæreant, seu firma,
 fluida sint; ita, ut magnitudo cohæisionis, respectively in di-
 is speciebus corporum obtinens, a singularum partium im-
 iate cohærentium densitate & contactus totius magnitudine
 ndeat; siquidem vires ipsæ elementares homogeneæ, &
 lices cohæisionis limites, ac æque distantes in omnibus ele-
 tis, sint. Ergo utique in lege virium cohæisionis inqui-
 s non ad totum volumen, sed ad partes singulas minimas
 ificas harumque densitatem attendendum.

§. 24.

● Supposita æqualitate virium specialium attractivarum in omnibus corporum elementis, uti & simplicitate & homogeneitate limitum cohæſionis, quo maior est superficies, quæ particulæ minimæ specificæ, seu eiusdem, seu diverſi corporis, mutuæ cohæſionis sphæram contingunt; & quo maior simul earundem sub æquali illius sphære contactu densitas, seu gravitas specifica, eo maior orit singularum inter se cohæſio & vis cohæſionis: hoc est. (quoniam sphæra cohæſionis in contactu sensibili incipit.) *vis cohæſionis supposita elementorum homogeneitate quoad legem virium attractivarum specialium est in ratione composita magnitudinis contactus sensibilis, quo singulæ particulæ cohæſionis mutuæ sphæram attingunt, & gravitatis, seu densitatis, specificæ particularum earundem singulatim.*

* Quoniam contactus metaphysicus ob summam reactionem virium repulsivarum in sua sphæra, cuilibet vi utcunque magnæ extinguendæ parem, aut nunquam, aut vix unquam datur; & cohæſio alioquin non nisi in contactu sensibili locum proprie habet: idcirco quoties *contactum* nomino, semper contactum sphære cohæſionis a me intelligi admoneo, qui *contactus physicus* recte vocari potest.

§. 25.

I. Itaque supposita particularum minimarum specificarum singularum æquali gravitate specifica & figuræ similitudine maior erit vis cohæſionis in partibus crassioribus quam subtilioribus: quia suppositis similibus figuris contactus physicus extensive maior erit in illis, quam in istis.

§. 26.

**II. Supposita æqualitate contactus physici (§. 24. not.)
 er vel minor erit vis cohæſionis pro ratione gravitatis ſpe-
 i particularum ſe contingentium.**

§. 27.

**III. Fieri poteſt, ut defectus gravitatis ſpecificæ particu-
 m ratione virium cohæſionis compenſetur per magnitudi-
 contactus physici tum ob figuram contactui aptiorem, tum
 affinitatem particularum ſe contingentium (§. 25.) Et viciffim
 poteſt, ut vis cohæſionis ſtante ſat magna gravitate ſpe-
 i particularum minuatür ob contactus illius exilitatem tum
 me figuræ e. g. ſphæricæ, tum ratione ſubtilitatis particu-
 m.**

Itaque ex his legibus genericis iam omnis corporum cohæſio dijudicanda erit. Prius tamen generalis illa corporum diviſio in firma, mollia, & fluida, ceu a diverſa cohæſione pendens unice, rite conſtituenda & explicanda eſt, ac tum demum primo cohæſio fluidorum, deinde fluidorum cum firmis, ac denique ipſa mollium ac firmorum cohæſio ad præſatas generales leges examinanda.

§. 28.

**Corpus fluidum eſt congeries vel aggregatum particu-
 m minimarum, ſingillatim haud ſenſibilem, quarum lenis
 odum cohæſio mutua a pondere maſſulæ earundem ad ſum-
 a piſo æqualis iam ſuperatur. Ubi paullo quidem, ſed mo-
 exceſſu, maior cohæſio partium quam in fluidis eſt, cor-**

pus molle dicitur. Demum a valida satis particularum cohesione, quæ non nisi a maiore aliqua vi aut pondere vinci queat, *corpus firmum* appellatur.

- * Fœcundissimam hanc *fluidi* definitionem recte ex guttularum fluidarum lapsu & phænomenis deduxit Eximius ille inter Germanos Philosophiæ melioris promotor Cl. Hambergerus. Videmus (inquit §. 110. Elem. Phys.) omnia fluida, quæ ex vasis guttatim effundi possunt, hanc servare legem, ut minore quantitate extra oras vasis delata non cadant, tametsi sint gravia. Ut igitur quædam vi retineantur necesse est, quæ nil nisi cohesio particularum fluidarum inter se & cum vase esse potest. Cum igitur cohesio sit actio pæque ac gravitas (nisi ad motum intellige sub actionis nomine per §. 9.) possunt inter se comparari, id est, una per alteram (ceum mensuram) determinari, & in hoc casu vi experientiæ pondus harum particularum fluidarum minus est cohesione (singularum partium). Si vas paullo magis inclinetur, ut quantitas particularum extra oras vasis augeatur, cum numero particularum crescit proportionate pondus, & tunc cedit guttula ex pondere: ergo tunc pondus est maius cohesione. Ut igitur gradus cohesionis in fluidis secundum pondus determinari queat, ipsum pondus, tanquam quantum, quod infinite variare potest, prius est determinandum. Commode vero in corporibus homogeneis, qualia sunt fluida, ubi pondera crescunt uti magnitudines, pondus secundum magnitudinem certam determinatur; ergo, quia experimenta monstrant, si quantitas fluidi ipsum excedat, vel saltem pîso æqualis fiat, pondus maius esse cohesione, secundum eandem mag-

magnitudinem pondus, & huic æqualis cohæſio determinari debebat.

§. 29.

I. Itaque fluida univerſe aut particulis ſpecificè levioribus, aut certe ſubtilioribus, atque figura ad contactum quemque minus apta, hoc eſt, ſphærica, præditis, conſtare deſt (§. 25.), aut demum illorum particulæ ſecundum ſe tam bene figuræ quam denſitatis ad firmam cohæſionem aptæ aliis corpusculis ſphæricis ac parum denſis interpolari ubique debent.

In caſu ultimo fluiditas non erit a materia propria, ſed ab aliena materia participata; qualis eſt aquæ ab igne æthereo fluentis,

§. 30.

II. Firma corpora ex adverſo aut particulis ſpecie gravioribus, aut certe craſſioribus, atque figura contactui maiori commoda præditis particulis, e. g. pentagonis, conſtare deſt.

§. 31.

III. Mollia pro diverſo cohæſionis gradu medium in modis omnibus particularum ſuarum affectionibus ſervare deſt.

§. 32.

Experientia enimvero his principiis in eiſdem fluidis & in his homogeneis corporibus admodum conformis eſt. 1.) Æther (ſiquis detur; de pro nihil iſthic diſquiro, etſi illum exiſtere

stere pro certo habeam) fluidorum omnium fluidissimum, enim-
vero & exilissimis, & specie levissimis, particulis, & verissimil-
ime sphaericis, constat. *Exilitas* ex libero eius per omnes
omnino aliorum corporum poros fluxu patet: *levitas* summa
in eo necessaria est tum ne pressioni gravificæ vi omnia dissol-
vat, tum ne nimis valida cohesio ipsa liberum eius per om-
nes arctissimos canales fluxum impediat: quod si etiam orbes
planetarios impleret; profecto levitas summa illi detur neces-
se est, ut ne motum planetarum nimis quam sensibili impedimentum
retardet: *figura sphaerica* demum ex ordinatissima semperque
homogenea lucis reflexione evidenter infertur.

2.) *Aër* ætheri levitate particularum proximus est; &
vero levissimæ item cohesioni.

3.) *Aqua*, aëre certo saltem plusquam septingentis
gravior, tantundem spectata sola hoc gravitate superari ab aëre
cohesioni tenuitate! id est, fluiditate debet. Sed & summa
exilitate partium præ ipso aëre pollet; quod inde patet, quod
multorum corporum exiliores poros transeat, quos aër perva-
dere nequit, puta ligni, chartæ oleo imprægnatæ &c. At
aqua, ut paullo ante dictum, insignem illum fluiditatis sibi con-
suetæ gradum ab interfluente æthere igneo habet; quo per tri-
gus elapso sat fortiter in glacie illius particulæ coheret: quod
& indicium est, illius particulas non sphaericis sed valde po-
lygonis figuris pollere.

4.) *Spiritus salini*, & *sulfurei*, partim aqua, partim
subtilissimis salium, & sulfurum, variorum particulis constant;
ex quibus sulfureæ quidem aqueis multo leviores sunt., atque
etiam exiliores; salinæ vero utut graviores, attamen item mul-
to exiliores. *Exilitas* utriusque generis particularum ex potenti
vi,

quam in solvendis densissimis metallis exerunt, facile præstari posset, si operæ pretium ferret. Quamquam particulæ e commixtæ fluiditatem ferme ab aqua circumfluxæ participant.

5.) *Olea* ex particulis terreis, aqueis, aëreis, & igneis, fluida valde heterogenea, componuntur, atque adeo eorum varia visciditas ex diversitate pendet, qua particulæ particulis gravitate heterogeneis adhærent; de quo mox §. sequente dicendi locus.

6.) *Mercurius* fluidorum omnium gravissimum, imo & poribus omnibus firmis, solè excepto auro: gravior, attamen, ut infra §. 46. constabit, potius ratione totius voluminis, quam quoad minimas particulas singillatim, saltem metallica gravitate specifica superat; cum quoad istas singillatim sumere omnibus istis levior reipsa sit. Deinde exilitate partium aquam superat multoties, atque verisimillime etiam figuram ad contactum inhabilitate. Exilitas partium licet tam gravior ex summa earundem in mediocri igne volatilitate, sphaerica proxime figura exinde infertur, quod vix unquam nisi extremo borealium regionum frigore per artificium etiam ex æro huc usque visus sit congelari. Alii cum Chemicis præstantissimis existimarunt, graves mercurii particulas omnes speciem involucro quodam rarissimo involvi, quod cum tenui collisione conciliet insignem illum fluiditatis gradum. Nihilominus mercurium cohæsione partium suarum aquam multoties præterare ex eo evidens est, quod minimæ quæque sensibiles mercurii guttulæ sphaericæ in aqua semper descendant, ac in cohæsionem aquæ pondere suo etiam solum respectivo præterant; cum tamen, si mercurius ex vase metallico effundatur, ad vasis oras ita sibi cohærere observetur, ut non nisi pro-

prominentes guttæ satis notabiles pondere suo absoluto cohesionem illam superent. Unde quod facilius etiam quam ipsa aqua diffluere nobis videatur, non minoris, quam in aqua inest, cohesionis in mercurio indicium est, sed gravitatis maioris mercurii effectus.

7.) *Corpora firma* omnia vulgo vel gravioribus promotione cohesionis particulis constant, uti terræ, falia, fultum, & metallica, vel, si qua ex eis, notabiliter sub toto volumine aliis leviora, fortius tamen ceteris quoad suas particulas cohereant (uti adamas, cuius cohesio omnium, quod scimus, corporum maxima, & tamen gravitas gravitatem aquæ non multo amplius quam triplo excedit) aut figuras particularum contactui maiori accommodas ex variis indiciis, uti ex crystallo lorum omnium (quarum nobilior quædam species adamas est) nativis figuris polygonis, colligimus; aut minorem corporum firmitatem licet graviorum cohesionem, uti auri, plumbi &c. a maiore exilitate partium (§. 25.), licet figuris cetera firmioribus præditarum, cum fundamento repetimus, imo subinde etiam ab heterogeneis, magis levium particularum comminatione, e. g. a sulfure metallico in plumbo, auro, argento, &c. fenicarum in stanno &c. &c.

§. 33.

Particulæ quæcunque homogeneæ spectata sola magnitudine contactus ut plurimum magis coherere debent, quam heterogeneæ. Cuiuscunque enim figuræ particulas assumas; quamdiu homogeneis homogeneas coniunges, tota magnitudine contactus, quanti demum pro superficierum ratione capaces singulæ seorsim sunt, se mutuo contingent una alteram. Unde, unico casu excepto, quo videlicet duas heterogeneas, præcisè
con-

rexitate & concavitate eiusdem plane figuræ dissimiles, nas, e. g. si sphæram solidam concavæ sphærulæ ceu in- cro apte congruenti immittam concipias; aut si polygonam iculam in aliam similis & proxime æqualis, sed cavæ figu- insertam ponas; in ceteris omnibus casibus ab his diversis quam augeri, bene tamen minui magnitudo contactus po- : in heterogeneis se contingentibus respectu eius contactus, is eadem seorsim particulæ cum aliis sibi figura & mag- dine homogeneis particulis capaces sunt. Aut enim sphæ- : sunt particularum figuræ; & nec sphæricas, nec polyedras : particulas plus quam in puncto contingere possunt: aut lem polyedræ sunt, ac planis superficiebus terminatæ; & : heterogeneas sphæricas, aut minoribus planis terminatas, lem minus, nimirum illas tantum in puncto, has secundum ia minora, aliquando etiam secundum æqualia, contingere, non augere contactum in aliis heterogeneis etiam polyedris hnt, etsi istæ maioribus etiam quam ipsæ superficiebus pla- terminentur; siquidem quoad excessum superficiei unius tactus haud dari poterit. Ergo &c. &c.

asum hoc theoremate indicatum, quo solo duæ heteroge- næ particulæ, etiam æque densæ, vi solius contactus magis cohærere possunt, quam duæ homogeneæ, ca- sum involucris, vel vaginæ, recte appellare possumus, eoque nomine deinceps utar ad significandum illum. Chemici veteres eum in coniunctione alcalicorum cum acidis evenire, sed mere coniecturis ducti, existima- runt.

§. 34.

I^a *Supposita æqualitate virium attractivarum specialium*
 Et a a in

in omnibus corporum elementis, ac simplicitate limitum cohesionis (§. 22. & seq.), solo casu involucris excepto (§. 1. not.) particulae homogeneae corporum quorumcunque speciei firmiter inter se mutuo cohaerere debent, quam heterogeneis vioribus. Cum enim vis tota cohaesionis particularum ut singillatim sit in ratione composita magnitudinis contactus gravitatis specificae earundem (§. 24), inter homogeneas particulas magnitudo contactus semper (casu illo excepto) maior, aut saltem aequalis sit, atque inter duas heterogeneas (§. praec.) idcirco ratione contactus minor inter homogeneas quam inter heterogeneas esse cohaesio non potest. Quod ergo gravitas homogenearum maior sit, eae ratione gravius maioris mutuo ita magis cohaerebunt, ut per contactum excessus cohaesionis respectu heterogeneae contingentis leviter compensari nullo pacto possit, Ergo &c.

§. 35.

II. In eadem hypothese (§. praec.) particulae homogeneae corporum quorumcunque aliis aequae gravibus, sed figurarum rogeneis (excepto rursus casu involucris) itidem minus vel minus, aut aliquando aequaliter, sed nunquam magis cohaerere poterunt, quam homogeneis. Cum enim ratione gravitatis cohaesionis semper aequalis esset per hypothesein; per §. 3. nui quidem potest ratione possibilis minoris contactus ob similitudinem figurae; imo & aliquando ob aequalem contactum etiam inter dissimiles figuras possibilem aequalis esse (ut superficies triangulae quadratae applicetur); aut augeri nunquam poterit, ob nunquam possibilem inter heterogeneas contactum maiorem, quam is inter homogeneas esse solet.

§. 36.

§. 36.

III. *In eadem hypothefi §. 34. particulae homogeneae corporum quorumcunque aliis heterogeneis gravioribus nunc magis, nunc aequaliter, nunc etiam minus cohaerere possunt, quam inter se cohaereant; magis quidem, si contactus par sit, aequaliter, si reciprocet cum gravitate (§. 24.), minus, si plus ab aequalitate quam pro ratione reciproca gravitas deficiat inter heterogeneas quam homogeneas.*

§. 37.

IV. *Particulae leviores sphaericae gravioribus heterogeneis quibuscunque semper magis quam homogeneis cohaerebunt: quia ob illarum figuram sphaericam contactus semper erit respectu utrarumvis aequalis, atque adeo cohaesionis magnitudo gravitatis rationem sequetur.*

§. 38.

V. *Particulae leviores gravioribus licet sphaericis raro magis cohaerebunt, quam cohaerent inter se, nisi etiam ipsae sint sphaericae, aut saltem prae sphaericae, aut nisi excessus gravitatis in istis sit valde eximius: quia sphaericas licet graviores tamen non nisi in puncto contingere possunt: unde, nisi & ipsae sphaericae sint, nec excessus gravitatis ille valde eximius facile ratio contactus earum cum homogeneis vincet rationem reciprocae gravitatis heterogenearum sphaearicarum.*

§. 39.

Ex regulis huc usque datis omnis tum fluidorum inter se, tum solidorum, tum illorum cum istis, cohaesio explicari potest,

ad oram vasis delapsura proxime, eo magis eam in oblongum a pondere crescente distrahi secundum diametrum verticalem.

§. 42.

III. *Guttulæ fluidæ minores sese tangentes in medio aliterius fluidi, gravitate sensibilibiter diversi, in unam sphaericam ad sensum guttulam consuere vi cohæsionis debent, quamdiu pondus earundem motui ex cohæsione non resistit.* Cum enim a fluido ambiente, seu leviori, seu graviore, premantur in omnem partem æqualiter, & idem omnibus earum partibus æqualiter, & idem omnibus earum partibus æqualiter cohæreat, atque etiam omnes ipsarum partes vicissim ob homogeneitatem partibus cunctis ambientis fluidi æqualiter cohæreant; idcirco, nisi & ipsæ inter se æquali numero versus omnem partem oppositam se premant, in æquilibrio esse non possunt, atque adeo non quiescent, nisi in unam sphaeram se consociant. Experimentum conforme offerunt guttulæ oleosæ, aquæ agitatione commixtæ, ceu fluido graviore, ac vicissim guttulæ aquæ Oleo commixtæ ceu leviori.

* *Motus guttularum deorsum in fluido leviori, aut sursum in graviore, non obstat huic guttularum se tangentium in unam sphaeram collectioni; quia resistantiam cohæsionis fluidi ambientis non vi cohæsionis suarum partium sed vi respectivæ gravitatis aut levitatis suæ vincunt: unde motus partium guttularum versus se mutuus a cohæsione pendens ab illo descensus aut ascensus motu non turbatur, nisi cum bullæ maiores ita sunt, ut pressio sub inæquali altitudine in ambiente fluido fiat notabiliter maior respectu inferiorum quam superiorum partium:*
tum

tum vero etiam maiores eiusmodi bullæ e. g. æreæ in longum in ascensu distrahuntur.

§. 43.

IV. *Guttula fluidi speciei levioris, tangens guttulam speciei gravioris, quacum non miscetur, tendet versus guttulam speciei graviores vi cohæſionis, eandemque assumpta eo latere figura concava ex parte amplectetur: ipsa vero gutta speciei gravior figuram sphaericam mutabit ita, ut in parvis contactus convexitatem maioris, in partibus vero a contactu remotis convexitatem minoris sphaeræ assumat.* Cum enim guttula levior a graviore pro diversitate gravitatis magis trahatur, quam ipsa istam trahat; idcirco levior vi cohæſionis magis versus graviores, quam ista versus illam, nititur: hoc ipsam guttula gravior magis ex ea parte, qua tangitur a graviore, quam ex altera opposita, premitur, atque adeo & in æquilibrio sublato figura sphaerica mutatur.

Ita experimentorem istam obicere sensibus possumus, 1.) Tabula lignea sebo fuso obducatur; dein conspergatur copioso semine lycopodii specificè levissimo, ne tabulae substratae attractio attractionem mutuam guttularum turbet; tumque tabula ponatur horizontali situ. 2.) Chartæ in formam conï convolutæ, ut in apice exiguum foramen relinguatur, indatur mercurius; sicque ex illo foramine præcise tantum mercurii semini lycopodii imponi poterit, ut guttulam Constituat. Hoc modo duæ, vel tres guttulae mercurii tabulae imponantur 3.) Canalis angustus vitreus ope suctionis repleatur aqua ad duorum digitorum altitudinem; vel nimmergatur tantum ad dictam profunditatem aquæ, protrahatur que in situ valde ad horizon-

izontem inclinato: sic aliquot aquæ guttulas continem admoveatur guttulæ mercurii sic, ut lineam Parisiensem distet; elevetur paululum, & profluat guttula; quæ cum primum guttulam mercurii tangit, versus hanc movetur, & in eo loco, ubi mercurium contingit, superficiem format concavam, in opposito autem convexam: mercurii vero guttula in loco contactus curvitatē maioris spheræ obtinet. Idem erit effectus, si similem in modum iuxta aquæ guttam olei levioris guttulam applicaveris.

* * Dixi vero, *si guttula levior graviori non misceatur*: constat enim, uti solida multa a mensuris fluidis, e. g. ab aquis stygiis, sic & fluida quædam, e. g. mercurium, ab eisdem solvi, eisdemque commisceri.

§. 44.

V. *Fluida diversæ gravitatis specificæ quoad minimas particulas inter se commixta manent, ut specificæ gravioris particula in leviori non descendant, nec levioris particula in graviore ascendant sursum: Et quidem eo maioribus particulis permixtæ manebunt duo id genus fluida se mutuo non perfecte miscentia, quo minus est discrimen gravitatis specificæ utriusque.* Descensus enim partium fluidi gravioris fit pondere respectivo, seu excessu gravitatis specificæ supra æquales partes levioris; ascensus vero partium leviorum fit excessu gravitatis specificæ partium gravioris æqualium. Jam vero licet excessus istæ in utroque casu semper sit proportionalis massæ ipsarum partium commixtarum, seu hæ maiores sint, seu minores, tamen cohæsiō partium unius fluidi commixtarum cum altero non massæ earundem partium, sed superficiēi, id est contactui, proportionalis est (cum densitas respectiva in maioribus & minoribus particulis sit eadem) per §. 24. Cum ergo
mas-

læ decreſcant regulariter in triplicata, ſuperficies ſolum im-
 licata ratione diametrorum; imminutis particulis commix-
 vis ſubmergens, vel ſurſum extrudens, decreſcet in tripli-
 , cohæſio vero retinens commixtas particulas tantum de-
 cet in duplicata ratione diametrorum, ac proinde demun-
 ſtrabit prædictum exceſſum, ac retinebit particulas ſatis mi-
 nis, tam gravioreſ a deſcenſu, quam leviores ab aſcenſu.
 Porro cum maiore vi ſibi cohæreant fluidorum æque gra-
 m particulae, quam ſi alterutri eorum levius conjungatur
 34.); quo minus duo fluida gravitate ſpecifica different;
 maiorum partium niſui, ad deſcenſum vel aſcenſum ten-
 ti, vincendo par erit mutua utriuſque cohæſio: atque adeo
 maioribus particulis ſibi id genus fluida commixta mane-
 nt, ſi mutuo non perfecte miſceantur; quo minus gravitate
 ſpecifica different.

xperientia rurfum ex integro conſentit. Vina aquis ut plu-
 rimum leviora ſunt, & tamen aquam ſibi ſemel com-
 mixtam retinent; quod idem de cereviſia valet. Olea
 & pingua quaecunque aquæ perfecte & quoad minimas
 particulas ſuapte ſponte non miſcentur; imperfecte ta-
 men ope agitationis aquæ commixta eo maioribus maſ-
 ſulis ac guttulis huic cohærent, quo proprius ad ſpe-
 cificam aquæ gravitatem accedunt.

2. De cohæſione fluidorum cum ſolidis.

Hic jam propior acceſſus nobis eſt ad propoſitæ quæ-
 ſtionis academicæ ſolutionem. Siquidem elevatio illa aquæ ad
 gines vaſorum haud dubie ex cohæſione quadam fluidi iſtius
 ſolidi vaſorum materia exoritur. Interim phænomenis de
 cohæſione fluidorum cum ſolidis rite explicandis ante omnia

principium quoddam de diversitate gravitatis specificæ inter totam molem & inter singulares particulas minimas solidorum & fluidorum quorundam corporum præmittere, atque experimentis confirmare oportet, quæ sagacitati Cl. Hambergi accepta referre debemus

§. 45.

Solidum quodcunque corpus, si fluido quodam in poros suos recepto imprægnatum, in eo ipso fluido submergatur in fundum usque; minimas particulas densiores, atque adeo respective specie graviores, habet, quam idem fluidum: etsi sub integro volumine quodam sumtum fluido eidem ceu specie graviores, habet, quam idem fluidum: etsi sub integro volumine quodam sumtum fluido eidem ceu specie graviori innatet. Constat enim ex principiis Physicæ de æquilibrio solidorum cum fluidis, non nisi corpora fluidis specie graviora in iis descendere in fundum usque, non item, quæ eiusdem, vel minoris, gravitatis specificæ sunt, seu solida, seu fluida. Dum ergo corpus aliquod solidum in eodem fluido, quo imprægnatum est, descendit; descensus non oritur a partibus fluidi in poros recepti; ceu quæ eiusdem sunt cum fluido specificæ gravitatis. Ergo idem descensus est a solis minimis particulis ipsius solidi; quæ hoc ipso specie graviores esse debent similibus minimis specificis fluidi particulis. Unde quod solidum eiusmodi corpus integro volumine acceptum, & nondum eodem fluido imprægnatum, levius sit eodem fluido, præcise interstitiis eiusdem tribuendum.

§. 46.

Experimur iam I., lignum in tenuia segmenta divisum,
lin-

eamina, spongiam &c. si aqua imprægnentur, in hac subsi-
 de. Clariss. D. Hamberger quoque experimento se depre-
 didisse testatur, argentum, plumbum, stannum, per amalga-
 tionem, seu solutionem chemicam, mercurio imprægnatum,
 eidem mercurio in vase fluenti imponantur, submergi; ta-
 cti hæc omnia maioribus voluminibus accepta eisdem præ-
 is fluidis innatare, cen specie leviora, soleant. Itaque per
 præc. *particulæ solidæ ligni, chartæ, linteaminum, spon-
 æ &c. particulis specificis aquæ, & particulæ metallicæ ar-
 genti, plumbi, stanni &c. mercurii particulis singillatim spe-
 graviores sunt.*

Scops ligni ideo solum ad experimenta hæc eligitur, ut aqua
 in pluribus locis eius partem contingere, & sic facili-
 us penetrare possit, atque aer in interstitiis interceptus
 facilius exitum inveniat. Quamquam etiam ligna maiora,
 præsertim quæ ex gravioribus sunt, postquam sat diu
 in aqua hæserunt, demum subsident. Spongia sub ipsa
 aqua comprimenda est, ut aer omnis vi expulsus locum
 aquæ subeunti cedat; secus vix obtinetur, ut infra aquam
 mergatur tota: quod idem docet, non qualemcunque,
 sed integram quoad omnia interstitia imprægnationem
 ad effectum, de quo sermo est, requiri; eo quod vide-
 licet secus interstitia multa adhuc aut vacua. aut levio-
 re aliena materia tantum repleta, volumen totum respecti-
 ve levius æquali volumine aqueo adhuc conficiant. De
 Amalgamatis metallicis idem Cl. Hamberger monet, ea
 in igne paranda esse, ut mercurius intime misceatur,
 ærque omnis contentus expellatur; dein intra linte-
 men vel corium comprimenda esse in globum; tum ut
 pars specie levior, mercurius nempe, quo ultra saturi-

tatem interstitiorum abundat, auferatur, quæ solam superficie, & cum ista cohæſionem cum fluido ambiente auget, nec tamen descensum iuvat; tum ne a mercurio, in quem proiicitur amalgama, nimis cito dissolvatur; id quod pauca nihilominus intra momenta contingit. Cupri amalgama se non parasse fatetur citatus auctor; ferrum vero in amalgama a mercurio non abire, alioquin ex metallurgia constat. Recte tamen infert, hæc quoque metalla, si non quoad omnes, saltem quoad plerasque partes suas minimas minimis mercurii particulis graviora esse; eo quod stanno gravior sint; cuius amalgama in mercurio descendere experimento proprio in specie comperit.

§. 47.

Experimur II, plurima corpora heterogeneis, & gravitate specifica admodum diversis ex particulis componi, uti e.g. olea, ex quibus Chémia docet operatione varia nunc aqueas, nunc salinas, nunc sublureas, ac terreas partes separare, quibus igneæ & aëreæ passim commixtæ sunt. Idem valet de foliis plantarum, de herbis, de polline florum &c. quæ licet partes terrestres graviores plurimas contineant, tamen ex plurimis simul aëreis, aqueis, salinis, ac sulfureis volatilibus componuntur. 2.) Præterea in plurimis id genus corporibus microscopia nobis ostendunt texturam superficiei talem, vi cuius ob prominentes asperitates & tenuissima filamina fluida eis superfusa non nisi paucissimis punctis ea reipsa contingere possint, uti in semine lycopodii, in lino, in foliis herbarum, & plantarum &c. Itaque *in primo casu cohæſio talium corporum quoad partes suas proprias nec gravitati specificæ integrorum voluminum, nec singulis particulis miscibilibus proportionalis esse*
po-

potest; sed illius ratio componi debet ex diversissima miscibilitate densitate, & mutua habilitate ad contactus, id est, summe irregularis sit necesse est. In casu altero quoad cohesionem fluidorum cum id genus solidis corporibus insuper punctorum paucitas attendi debet, in quibus contactus aliquis cum fluidi affusi partibus possibilis est.

§. 48.

Si particulae quaecunque corporeae, quae ab aliis contiguis attrahuntur vi attractiva speciali in contactu physico se exerente, si, inquam, particulae eodem tempore in partem contrariam fortius trahantur a vi simili quacunque, alteris illis remissius trahentibus cohaerere illae non possunt. Est enim cohaesio resistentia adversus separationem sola reactione vis inertiae maior (§. 9.). Atqui posita maiore in adversam partem tractione ex prima attractione minore resistentia adversus separationem a remissius trahentibus faciendam oriri in eodem elemento vel particula non potest; cum determinatio maior ad motum contrariam determinationem minorem contrariam in eodem subiecto destruat (§. 10.). Ergo neque cohaesio cum remissius trahentibus oriri potest.

§. 49.

Tamet si ob generalem & communem omnium elementorum vim attrahendi specialem particulae fluidorum quorumcunque singillatim sumtae omni solido per se cohaereant pro rationae contactus & gravitatis specificae particularum eiusdem solidi: tamen fluida maiore paullo quantitate coniuncta nulli cohaerere possunt solido, cuius vis attractiva spectata ratione composita contactus & gravitatis specificae partium contingentium partes

Res fluidi minor est vi attractiva, qua secundum rationem compositam similem se mutuo attrahunt ipsa particulae talis fluidi (§. 24.). Ratio est; quia, cum maior quædam fluidi talis quantitas coniuncta est, cuius partes fortius se ipsas mutuo in contactu attrahant, quam a solido attrahantur partes illi contiguæ, eo ipso tempore partes fluidæ solidum contingentes & ab hoc attractæ trahuntur fortius in partes oppositas a conjunctis aliis partibus homogeneis fluidis: ergo per §. præ. hoc casu solido tali coherere non possunt: etsi seorsim summe talis solidi partibus pro ratione attractionis earundem coherere deberent.

• *Experimentum* seu observatio quædam memorabilis momentum regulæ istius apertissime declarabit. Mercurius modicissima etiam quantitate sumtus vitro non coheret, sed in guttulas collectus confluit. Nihilominus si in destillatione sub tenuissimi vaporis specie ascendat ex cucurbita, capitello intus cavo adhæret, atque extrinsecus insipientibus speculi formam in vitro illius offert. Ast quamprimum continuata destillatione cutis crassior ex sublato mercurio efformata est, rursus defluit totus dimisso vitro. Ex hoc experimento apertissime patet, mercurii particulas singillatim etiam vitro sic coherere, ut vis illa cohesionis etiam illarum gravitatem singillatim vincat. Ast ubi mercuriales vapores cuticulam tam crassam efformarunt, ut particulae eorum, vitro prius se contingenti coherentes, infra se alias mercuriales sibi contiguas habeant, quibus ob vim attractivam fortiolem fortius coherent, ob tractionem talem in partes contrarias fortiolem vitro coherere omnino desinunt, eoque dimisso defluunt in excipulum.

§. 50.

Fluida quæcunque, paullo majore quantitate accepta, nulli cohærent solido, cujus particulæ singulæ singulis ipsorum particulis specificis sunt specie leviores. Non enim fluida cohæreere possunt solido, si particulæ ipsorum solidi particulis ætiguis eodem tempore ab aliis fluidi particulis homogeneis attrahantur fortius in partes contrarias (§. 48.). Atqui in hoc, cum solidi particulæ sunt leviores: siquidem attractio in ratione composita densitatis particularum trahentium & magnitudinis contactus: est autem per hypothesin major densitas particularum fluidi quam solidi; nec contactus ad particulas solidi ceu heterogeneous potest esse major quam ipsarum particularum homogenearum fluidi inter se; (§. 33.) nisi in solido fingas particulas involucris rationem habentes respectu particularum fluidi; quod observationibus microscopiorum omnibus adversatur, Ergo fluida &c. &c.

§. 51.

Fluida quæcunque solidis secundum particulas minimas specificas specie gravioribus cohærent, nisi ratione contactus impeditioris ad particulas solidi minor sit attractio, qua solidi particulæ trahunt fluidi particulas, quam ea, qua fluidi particulæ se mutuo attrahunt. Cum enim cohæsiō juxta atque attractio sit in ratione densitatis seu gravitatis & magnitudinis contactus; (§. 24.) nisi contactus respective, ut dicam, in particulis solidi sit impeditior, pro majore densitate particularum solidi fortior erit eorum attractio, ac proinde etiam cohæsiō particularum fluidi fortior cum illis, quam inter se.

Dixi: nisi ratione contactus impeditioris &c. quibus verbis excep-

exceptio omnium earum irregularitatum continetur,
 quas §. 47. complectitur.

§. 52.

Fluida diversa, eidem solido quoad particulas minimas specie graviori coherrentia, coherrent ei pro ratione gravitatis specificæ suarum particularum propriarum. Etenim fluidi coherrentis particulæ a solidi particulis secundum omnia elementa, quibus istas contingunt, trahuntur æquali vi. Ergo quo densiores sunt, id est, quo pluribus elementis sub eadem superficie particulas solidi contingunt, eo fortius trahuntur, eisque etiam eo fortius coherrent.

§. 53.

Unde sub restrictione §. 51. indicata hoc ipso fluido etiam adhærent solido secundum minimas particulas æque gravi. Sequitur ex §§. 51. 52.

- * Es his jam legibus commodissime omnium phænomenorum ad cohæsiorem fluidorum cum solidis pertinentiam, atque inter hæc etiam §. 1. relatorum quæ hic præcipue in quæstionem¹ veniunt, sufficientes reddere rationes cum omni, quæ in rebus physicis haberi potest, certitudine poterimus.

§. 54.

Atque inprimis evidens est, diversitatem phænomenorum §. 1. relatorum neque a pondere fluidi ejusdem, ejusque guttularum. neque a pressione aëris, vel alterius cujuscunque materiæ extrinsecæ, oriri posse, tum ob dicta §. 15; tum quod pondus

pondus fluidi ejusdem ejusque guttularum semper sit prorsus idem, atque eadem quoque semper pressio seu aëris, seu alterius cujuscunque materiæ extraneæ; tum denique quod omnia phænomena recensita perinde in vacuo Boyleano atque in libero aëre eveniant.

¶ Dicemus vero paullo post, guttulas fluidorum, de quibus §. 1. actum omnes perinde planis homogenea ex materia sibi superne applicatis adhærere (§. seq. not. 1.) ubi sane pondus seltē guttulæ causa cohæſionis id genus esse non potest.

§. 55.

Ratio, cur guttulæ aquæ & mercuriales in casibus §. 1. no. 3. & no. 4.) expressis diffuant, est fortior attractio versus solidi plani particulas minimas specie graviores, quam sit partium minimarum leviorum fluidi attractio inter se, & ex attractione orta major cohæſio ad particulas plani solidi, quam sit cohæſio particularum fluidi respective inter se. Cum enim particulæ ipsius fluidi, aquæ nimirum, & mercurii, in se invicem omnes æqualiter agant, atque se attrahant æqualiter; idcirco, quamdiu ex nulla parte ab alio agente extrinseco fortius versus partem aliquam attrahuntur, quam ipsæ se mutuo attrahant, tamdiu figuram sphericam conservant (§. 41.) nisi ob quantitatem fluidi gutta majorem vis gravitatis cohæſionem vincat (§. cit. not.) at si ob majorem densitatem, seu gravitatem specificam, particularum minimarum plani solidi, cui guttula fluidi insit, in particulis guttulæ planum contingentibus attractio versus planum solidum est major, quam sit attractio particularum guttæ fluidæ versus se invicem tunc nifus particularum guttulæ contingentium

planum solidum, seu cohæsiō, major erit versus planum solidum, quam versus homogeneas guttulæ fluidæ particulas, ac proin guttulæ prius sphaericæ æquilibrium circa vires coherentes omnium ejus partium tolletur, & motus ex cohæsiōne majore versus particulas plavi solidi oriētur in particulis contingentibus. Motus iste in Fig. II. fiet secundum directionem ab , & particulæ fluidæ, ex æquilibrium semel dimotæ, motum istum vi propriæ cohæsiōnis sequuntur ita, ut trudan-
tur a superioribus versus latera cd ; ex quo, aucto rursus contactu cum plano, crescit causa motus, decrescitque continuo altitudo ab , crescit vero latitudo cd , id est, gutta diffluit in plano subiecto. Atqui ex §. 46. patet, in omni casu diffusus guttularum aquæ, vel mercurii, particulas plani subiecti minimas esse specie graviore particulis singulis minimis aquæ, vel mercurii (vide etiam dicta §. 23.) ac proinde per §. 51. his aqua, & mercurius, per se loquendo cohærere debent, nisi contactus aliunde impediatur.

- * Confirmatur demonstratio hæc effectu consimili prorsus, quamvis versus partes recta oppositas, consequi solito, si guttæ ef insistenti in plano mn , sebo illito, planum metallinum op superne ad contactum usque in e applicetur: mox enim gutta figuram sphaericam dimittens versus planum superius diffluit in formam gi ; eo quod nimirum vi cohæsiōnis versus planum illud in puncto e majore æquilibrium inter partes guttæ continuo tollatur, ortoque semel versus illam partem motu ceteræ vi cohæsiōnis propriæ consequantur; unde altitudo ef minuitur, crescitque latitudo gh . Hoc quidem casu gravitas guttæ motui diffusionis versus superius planum opponitur; at, cum cohæsiō gravitatem
guttulæ

guttulæ superet (§. 28. not.) diffluxio nihilominus tamdiu consequitur, quamdiu fluidi copia quantitatem guttulæ non superat. Imo similis diffluxus guttæ *e f* quoque consequitur, si ad latus *g* vel *h* guttulæ sphaericæ cochlear vel cultrum metallicum applicueris. Porro facilins adhuc difflunt guttulæ, si solidum planum fluido homogeneo jam prius sit humectatum; quia fluido ejusmodi homogeneo jam inæqualitates superficiei solidæ implente, statim initio guttula fluidi in pluribus punctis contactum invenit, atque id circo fortius versus solidum tale trahitur.

Dicitur vero: cur gutta aquæ non diffluit super plano laneo super linteo, super folio brassicæ &c.; cum tamen & lanam, linum, folium brassicæ &c. constet multis ex particulis componi (e. g. terreis) quæ aquæ particulis sint seorsum sumtis graviores. *Respondeo*, id inde esse, tum quod permixtæ illæ sint multis aliis levioribus, tum quod illorum corporum superficies tam tenuibus filamentis prominentibus sint extenuatæ (microscopio inprimis id docente) ut in paucissimis punctis guttulæ aqueæ contactus concedatur. Vide dicta §. 47. & 51. Neque enim in contactu guttulæ ad plana, de quibus hic sermo est, contactus solum in puncto unico fingendus est, ut in sphaera & plano geometrico; maxime cum ob dicta §. 41. not. etiam guttulæ figura sphaerica a proprio pondere saltem insensibiliter turbetur. Itaque cum cohæsiō partium propriarum guttulæ major sit summa punctorum contactus cum lana, lingo; &c. idcirco guttula super his non diffluit. Idem intellige de gutta mercurii, super planis levioribus non

diffluente secundum dicta §. 1. Nr. 4. aut si pianum muco levioze, vel habitu aqueo, infectum sit. Hanc solam veramque rationem esse, experimentum §. 49. in annot. relatam apertissime evincit. Cum enim in illo mercurii particulæ in vaporem attenuatæ etiam contra vim gravitatis suæ in oppositum tendentem superiori cucurbitæ ejusque domatis superficie concavæ adhæreant, etsi & ipsa ex vitro levioze sit, necesse est, ut, cum guttulæ mercurii in vitro plano sibi subiecto non diffluunt, id ipsum ex cohæsione majore particularum mercurii inter se, figuram sphericam conservante, oriatur, quæ videlicet & nativam earundem gravitatem, & simul leviozem illam cum vitri particulis cohæsionem simul superet. Atque ex his jam facillimum erit ad rationem primi & secundi experimenti §. 1. propositi, a qua propositæ academicæ solutio pædet, cum omni evidentia concludere.

§. 56.

Ratio sufficiens, cur fluida, e. g. aqua, & mercurius, in vasis nunc secundum leges hydrostaticas sub libella & superficie convexa consistant, nunc concavos colliculos ad marginem sursum versus vasorum latera efforment, est attractio minor in primo, & major in altero casu, qua trahuntur partes fluidi versus particulas vasis circa margines, quam ille mutuo se attrahunt. Quodsi enim attractio illa versus partes materiæ vasorum minor est attractione mutua partium ipsius fluidi inter se, nulla cum materia vasorum cohæsio oritur (§. 49.) nec adeo ratio est, cur a superficie convexa fluidum recedat, quam gravitas naturalis fluidi determinat. Ex ad-
verso

verso si ob majorem de densitatem minimarum partium vasis materiam constituentium major est attractio partium vasis minimarum quam sit attractio partium ipsius fluidi mutua; fluidum solidi partibus cohæret (§. 51.) nisi aliunde obstaculo quocunque contactus partium vasis impediatur. Atqui in omnibus illis casibus §. 1. Nr. 1. & 2. relatis, in quibus aqua, & mercurius, formant superficiem concavam, & ad cavos colliculos supra libellam assurgunt circa margines, particulae minimae specificae vasis materiam conicientes sunt graviore seu densiores particulis minimis specificis fluidi, puta in vase ligneo, terreo, metallino respectu aquae; & in vase argenteo, plumbeo, stanneo, cupreo respectu mercurii, secundum dicta §. 46. ac proin fortius attrahunt versus se particulas fluidi quam istae trahantur a se invicem; nec quidquam adest, quod contactum vulgo impediat; nisi forte pulverulenta, aut muco aliquo leviori, vel sebo, infecta superficies vasorum sit; vicissim in iis casibus, in quibus fluidum ad libellam sub convexa superficie consistit, vel particulae superficiem vasis conicientes sunt leviores rarioresque fluidi particulis, ac proin minus attrahunt (§. 50.) uti sebaceae respectu aquae (in quibus etiam irregularitas §. 47. primo loco memorata intervenit) & terreae, lapideae, lignae, coriaceae, respectu mercurii, aut fusi metalli; vel omnino in vasis ad summum repletis superficies vasorum supra libellam fluidi extans deest; cui cohæreat fluidum. Ergo ratio sufficiens, cur fluida &c. &c.

§. 57.

Experimenta varia, quae huc usque diximus, ulterius consensu suo apprime confirmant. 1.) Si tenues cylindros metallinos, lapideos, ligneos, superficiei aquae in vase stag-

nanti applices ad contactum usque; si similes cylindros argenteos, plumbeos, stanneos &c. applices similiter mercurio in vase quiescenti: utroque in casu aqua, & mercurius, supra libellam assurgens, colliculos versus cylindrorum illorum superficiem efformabit. Vicissim, si dictos cylindros sebo illitos, aut semine lycopodii conspersos, aquæ applices, aut cylindros similes non metallinos mercurio; nullibi assurrectio aliqua supra libellam observatur. *Ratio* eadem est quæ §. præc., nec quidquam nisi vasis & cylindrorum figuræ discrepant.

2.) Si aurum, vel argentum, humectetur spiritu vini primum, dein aqua, deinde mercurio; facile rursus abstergi spiritus vini solet, difficilius aqua, difficillime omnium mercurius. Porro quod difficilius separatur, fortius cohæret (§. 9.). *Ratio* patet ex §. 52. Nempe aqua densior spiritu vini, mercurius densior aqua est. Ergo aqua fortius vini spiritu, mercurius fortius aqua, eidem metallo cohæret.

3.) Si duæ phialæ, vitreæ quarum diameter ad summum tres digitos æquet, impleantur aqua, & quidem una (Fig. III.) ad summum, altera (Fig. IV.) non ad summum; in priore aqua superficiem convexam, in altera concavam formabit (§. præc.). Pone sphaerulam vitream cavam, cujus diameter $\frac{1}{4}$ digiti circiter, *primo* ad marginem *d* vasis primi; & ea sibi relicta non quiescet ibi, sed motu accelerato perget medium versus in *c*; ubi aqua circum eam undique æqualem colliculum cavum formabit. Pone sphaerulam illam *secundo* in vase altero in medio *c*, & quiescet. Pone vero *tertio* sphaeram in eodem vase altero vel paullulum extra illud medium, & motu accelerato perget versus marginem vasis *b*. *Ratio* hæc est. Fluidi vitro cohærentis attractio mutua efficit, ut vitrea illa
sphaera

sphæra vicissim fluido cohæreat (est enim omnis cohæsiō mutua, & ex determinationibus ad motus oppositos æquales orta, per §§. 9. & 10.). Jam vero attractio illa fluidi, cohæsiōnem vitri mutuam determinans, *vel* est ex omni parte circum undique æqualis, uti e. g. in medio utriusque vasis, seu in puncto *c*; & tunc sphærule vitrea necessario quiescet; eo quod vi cohæsiōis determinationibus in partes oppositas æqualibus urgeatur: *vel* illa fluidi attractio ex diversa parte varia est & inæqualis; & motus sphærule vitreæ versus eam partem consequatur necesse est, versus quam maxima est fluidi attractio. Est vero attractionis istius fluidi magnitudo circum eadem sphæulam undique ex omni parte proportionalis magnitudini contactus, quo fluidum semper idem sphærule vitreæ superficiem contingit: is autem contactus in primo vase ad *latus b* crescit pro ratione recessus a vasis margine versus medium ob superficiem fluidæ convexitatem; idem vero in vase secundo ad *latus b* crescit pro ratione recessus ad medio vasis ob superficiem fluidæ concavitatem & elevationem circa marginem *b*. Ergo in primo vase motus sphærule ad marginem positæ consequetur versus medium, in altero autem vase sphærule, quam primum extra medium *c* dimovetur, motu accelerato pergere debet versus marginem *b*.

- * Dantur quidem experimenta, quæ inprimis regulæ cohæsiōis §. 11. recensitæ adversari videntur: sed accuratius expensâ eam potius regulam confirmant. Sic 1.) calx paullo majore quantitate marmori polito, cui gravitate specifica vel parest, paullo inferior, applicata non adhæret, sed, quam primum exsiccatur, sponte decidit. 2.) Cera Hispanica sigillis non adhæret, licet specie gravioribus. Verum in utroque hoc phænomeno impedi-

- * Fluidum intermedium, quod solidorum cohæſioni procurandæ vulgo adhibetur, *gluten* appellamus, si eodem ſolida vegetabilia connectantur, *cæmentum*, si lapides; *ferrumen*, si metalla.

§. 60.

Corpus intermedium, quo firma duorum solidorum corporum cohæſio procuretur, debet 1.) eſſe fluidum, 2.) ſolidiſſime quoad particulis levius, vel certe non gravius, 3.) quolibet anni tempore debet poſſe in ſolidum abire. Debet 1.) eſſe fluidum; quia ſecus dividi facile in minimas partes non poteſt, quibus inæqualitates ſuperficierum ſolidarum impleantur, & contactus crebrior procuretur. 2.) debet eſſe ſpecie levius, vel ſaltem non gravius, quoad particulas; quia ſecus ipſum ſolidis non cohæreret, (§. 50.) nec diſſlueret in inæqualitates ſolidæ ſuperficie utriusque, eas replendo; unde nec ſolida eo mediante cohærere ac connecti poſſent (§§. præc. & 56.). 3.) Quolibet anni tempore debet in ſolidum abire poſſe: fluida enim, quæ nunquam ſolidescunt, uti ær, mercurius, ſpiritus vini &c. aut nimis ſunt ſpecie levia, aut tenuiſſimorum contactuum ſunt capacia, (§. 32. n. 6.) atque idcirco debili admodum poſſent vi cohæſionis: (§. 24.) fluida vero, quæ interdum ſolum: ſed raro, ſolida evadunt: uti aqua, quamdiu ſunt fluida, ab alio inſigniter leviori corpore, & contactuum majorum ſimul incapaci corpore, id eſt, ab igne (§. 32. n. 3.) fluiditatem obtinent. Cum igitur huius fluidi ignei leviſſimi partes graviorum talis intermediarii fluidi particularum contactus impediunt, tum inter ſe, tum inter partes ſolidi quoque; fluidum tale, quamdiu in eo ſtatu eſt, glutini ſolidorum firmiori ſervire non poteſt. Itaque pro majore

e cohæſionis gradu ſtabili obtinendo requiritur, ut fluidum intermedium ſolida connectens quovis anni tempore, id eſt, ovis in aëre caloris exiſtente gradu, ſolidum evadat.

Quo magis fluidum intermedium ad gravitatem ſolidi ſpecificam accederet, eo major deberet eſſe per ſe cohæſionis gradus, quam efficiat inter ſolida; quia tum inter ſuas proprias (§. 40.) tum cum ſolidis majorem deberet habere cohæſionem. (§. 52.) Quia tamen quorundam fluidorum particulæ pro diverſa, qua gaudent, craſſitie & figura (§. 25.) magis exacte inæqualitates in ſuperficie ſolidorum exiſtentes replent, & ipſæmet majoris contactus reſpectivi capaces ſunt cum determinati ſolidi particulis, quam aliorum fluidorum particulæ, & vis ratione gravitatis ſolius intenſa nihil valet (ut patet in mercurio:) idcirco mirandum non eſt, ſi fluida invenire eſt aliis ſpecie leviora, quæ majorem ſolidis interpoſita cohæſionem pariunt, quam fluida alia graviora. Sic teſte Cl. Muſſchenbrœkio in Elem. Phyſ. Tom. I. §. 557. duos cylindros ex orichalco, quorum baſium diametri æquabant 1. 916. poll. Rhenol. aqua interpoſita cohærentes reddidit vi 12. unciarum, oleum raparum vi 18. unc. terebinthina veneta vi 24. unc. colophonica vi 850. librarum, ſebum candelarum vi 800. libr. Sunt vero hæc corpora interpoſita cylindris aqua ſpecie leviora, ſed & valde heterogeneis ex particulis compoſita. (§. 47.) A pice autem, quæ aqua gravior eſt, cohæſere iidem cylindri vi plus quam 1400. librarum.

- Quodſi fluidum intermedium, poſtquam ſolidi naturam induit, eiſdem perfecte eſt gravitatis ſpecificæ ac ſolida,

da, quæ connectit, ita, ut eius partes inter se & cum solidis tantundem, quantum ipsæ particulæ solidorum mutuo, cohaereant, uti cæmentum, quo lapides committuntur, & metalla fusa, quæ iungendis metallis adhibentur; tunc parum refert, sive superficies nectendorum lævigatæ sint, sive non sint: eo quod omnia asperitatum interstitia a fluido quoad vim cohaerendi tam homogeneo facile impleantur. Contra si fluidum uniens, postquam solidescit, est sensibilibiter specie levius quam solida unienda; quale est gluten vulgare, quo affera, & alia his gravitate specifica non multum imparia, conglutinantur; tunc uniendæ solidorum superficies prius debent reddi æquabiles, quoad licet; ut tot, quot possint, particulæ specie graviores ipsorum solidorum se immediate contingant, reliqua vero tantum interstitia glutine mediante uncantur. Sic enim iam numerus contactuum augetur, nec cohæsiio solum tanta evadit, quanta est glutinis, sed ob multas specie graviores particulas ipsorum solidorum sese immediate contingentes maior, etsi tanta nunquam avadat, quanta ipsius solidi continui.

* * * Porro ex his sequi videtur, corpora solida diversa, fluido eodem specie leviori intermedio iuncta, tanto maiore vi cohaerere debere; quo maior est gravitas specifica solidorum eorundem. At enim Cl. Musschenbrœkius in Dissert. de Cohæs. longe a densitate ista diversam cohæsiionis rationem invenit. Diversæ enim materiæ cylindros diametro 1. poll. & 9. lin. æquantes, bene lævigatos, & ad gradum aquæ ebullientis calefactos: sebo fuso illiniit; qui dein refrigerati vi cohæsiionis sequentia pondera sustinere:

Cy-

lindri ex plumbo	275.	℥.	densitas cylindrorum	11. 3.
ex argento	125.	-	-	11. 1.
ex bismutho	100.	-	-	9. 7.
ex cuprorubro	220.	-	-	9. 0.
ex chalybe	225.	-	-	7. 7.
ex ferro mulli	300.	-	-	7. 6.
ex stanno	100.	-	-	7. 3.
ex marmore albo	225.	-	-	2. 7.
ex ebore	103.	-	-	1. 8.

Verum in his experimentis aliud accidens intervenisse ex eo patet, quod argentei cylindri minus cohæserint mediante sebo, quam hoc eodem mediante cohæsere cuprei, stannei item minus quam plumbei; cum tamen certum sit ipsarum particularum argenti inter se maiorem esse cohæSIONem mutuam immediatam quam cupri, maiorem item particularum stanni quam plumbi: siquidem teste Wallerio (in Mineralogia) constat, fila metallica diametro singillatim æqualia uni lineæ pedis Rhenani, antequam rumperentur, vi cohæSIONis suæ pondera sequentia sustinuisse, aureum 500. ℥. argenteum 370, cupreum 299½, ferreum 450, stanneum 49½, plumbeum 29½. Itaque discrimen illud cohæSIONum a discrimine gravitatum dissentiens potius ex eodem fonte repetendum, ex quo discrimen cohæSIONis tum ipsorum solidorum continuorum verisimillime citra gravitationes proportionem exoritur, tum ex quo supra hic not. 1. diversa cohæSio a fluido diversimodis denso inter solida interposito orta repetita est. Nimirum idem fluidum, e. g. sebum, non perinde aptum est seu ad inæqualitates diverforum solidorum rite implendas, seu ad æqualem cum eorum particulis contactum: præsertim quod eodem caloris gradu solidorum, tam propriarum particularum varia densitate præditorum, interstitia non

æque dilatentur. Ceterum diversæ cohæſionis metallorum quoad partes suas proprias, densitatis rationem minime servantis, caussa ex §. 32. n. 7. repetenda est.

* * * * His principiis tota *ars ferruminandi metalla* quoque innititur. Diversæ autem ferruminum species sunt:
 1.) *ferrumen stanni*, das Schnell-Loth, quod ex duabus partibus stanni & una plumbi, ignis fusione inter se commixtis constat, & stanno, cupro, ac ferro adhæret:
 2.) *ferrumen orichalci*, quod ex duabus partibus orichalci, una Zinei, & una boracis parte, partim in igne, partim in aqua commixtis, constat, atque adhæret cupro, & ferro:
 3.) *ferrumen argenti*, quod ex auro & argento compositum, argento adhæret. *Ratio* cohæſionis in omnibus his est, quod ferrumen semper constet partibus compluribus aut levioribus, aut homogeneæ gravitatis cum metallis ferruminandis; partes vero graviores, quibus una constet, non maiore aliqua quantitate immediate coniunctæ, sed potius singulæ dispersæ sint per alias leviores, & ab his undique circumdatæ. Unde cohæſionem leviorum cum ipso metallo ferruminando non impediunt, ac simul, dum singillatim levioribus interponuntur, quæ ipsis ceu maiore vi polentibus fortius quam inter se mutuo cohærent, leviorum illarum partium cohæſionem mediatam etiam exaugent, atque corroborant.

Atque hic ipse consensus omnium cohæſionis phænomenorum, qui facile quoque per alia phænomena (puta tubulorum capillarium, elasticitatis &c.) ostendi posset; manifestum indicium est, quam certum sit, universe omnis cohæſionis causam proximam haud aliam esse quam vires cohæſionis ex vi attractiva speciali ortas, & inde a §. 9. in hac Dissertatione demonstratas.





Fig. 2

Fig. 3





Fig. 4





Abhandlung,

über die

Preißfrage.

und was für Mittel es gebe die Hochgewitter
zu vertreiben, und eine Gegend vor Schauer
und Hagel zu bewahren.

von

P. Benedict Arbutnot.

entlichem Mitgliede zu St. Jacob in Regens-
burg.





I.

Es war in den vorigen Zeiten den Naturkündigern das Hochgewitter ein verborgenes Geheimniß. Die verschiedene Wirkungen des Strahles, und das schnelle Herabfallen desselben als eines ungleich leichtern Körpers durch die schwerere Luft zu erklären, überstieg weit die Kräfte ihrer Naturlehre. Sie erdichteten zwar (wie es allzeit bey denen, die ohne Erfahrung und hinlänglichen Grund zu schließen pflegen, geschieht) unterschiedliche ungereimte Hypothesen, durch welche sie ihre Meinungen zu erklären suchten. Einige bildeten sich eine schweflichte Materie ein, welche von den Wolken bis auf das Ort reichte, wo der Strahl einfiel; andere hingegen ließen den Strahl aus der Erde in die Höhe schlagen. Welche Meinungen so ungereimt und wieder die Erfahrung sie auch immer seyn mögen; nichts desto weniger mit nicht geringem Eifer vertheidiget wurden. Den Naturkündigern der spätern Zeiten ist das Glück vorbehalten worden, zu einem genauern Rantnisse des Electri und dadurch des Hochgewitters zu gereichen.

E e e

2.

2.

Wie genau sich das Hochgewitter durch die electricischen Versuche erklären läßt; kann schon heut zu Tage niemand, der nur ein wenig in die Naturlehre eingesehen hat, verborgen seyn. So leicht aber sich immer das Hochgewitter durch die Electricitet erklären läßt; eben so schwer deucht mir zu seyn, durch dieselbe ein Mittel anzugeben, durch welches das Hochgewitter vertrieben werden möchte.

3.

Da nun die Frage; ob und was für Mittel es gebe die Hochgewitter zu vertreiben zc. von einer erlauchten Academi der Wissenschaften zu München schon zum zweyten mal aufgeworfen worden; und verlangt wird, wenn es möglich ist, dieses Mittel aus den electricischen Versuchen herzuholen; so habe ich dem Verlangen, so viel mir möglich, ein Genüge zu leisten, folgende Ordnung in meiner kurzen Abhandlung erwählet.

In dem ersten Hauptstücke werde ich verschiedene electricische Versuche, durch welche die electricische Materie in der Maschine gemindert wird, anführen.

In dem Zweyten werde ich die Natur des Hochgewitters untersuchen.

In dem Dritten werde ich mich in Untersuchung der bisshin gebräuchlichen Mittel die Hochgewitter zu vertreiben beschäftigen.

Ob man endlich aus den electricischen Versuchen ein Mittel das Hochgewitter zu vertreiben angeben könne, wird der Inhalt des vierten und letzten Hauptstückes seyn.

Erstes Hauptstück,

Von den electricischen Versuchen, wodurch das electricische Feuer in der Maschine vermindert wird.

4.

Da der Donnerstrahl und das electricische Feuer eine und die nämliche Materie ist, (so ich nachhero beweisen werde, da die Natur des Hochgewitters der Gegenstand meiner Beschäftigung seyn wird) giengen alle meine Versuche mit der electricischen Maschine dahin; durch was für Mittel ich eine Verminderung des electricischen Feuers halten könnte. Denn, was die Materie in der Maschine vermindert, sollte denn ersten Ansehen nach auch das electricische Feuer in den Wolken vermindern und zerstreuen.

Erfahrung.

5.

Das electricische Feuer wird von allen Metallen und Wasser attrahiret; und folglich von allen Körpern, welche weniger oder mehr von diesen zweyen in sich enthalten, auch mehr oder weniger angezogen. Man kann demnach diese zwey Körper die Conductores oder Leiter der electricischen Materie nennen. Daraus erhellet, warum bey Ladung der Maschine Blech oder Kauschgold gleich an dem gläsernen Cylinder geleyet werde. Damit nemlich die electricischen Theile, welche durch das Reiben aus dem Glase herausgetrieben worden, gleich von dem Metalle angezogen, und so weiter in die Verstärkungsmaschine geleitet werden. Eben die nemliche Wirkung bemerket man bey dem Wasser; daher die Verstärkungsmaschine mit Wasser oder Feil-Späne angefüllet wird; welche zwey Körper die

electrische Materie also an sich ziehen, daß die Theilchen nicht leicht abfliegen können.

Erfahrung:

6.

Bei nasser Luft läßt sich die Maschine nie so stark anfüllen, als wenn sie trocken ist; und wenn auch die Maschine durch langes und heftiges Reiben in einem ziemlichen Grade angefüllt wird, so dauert die Materie in derselben bei nasser Luft kaum etliche Stunde; ja zuweilen kaum eine halbe Stunde; da sich doch das Feuer bei trockenem Wetter mehr als 24. Stunde in der Maschine erhält.

7.

Diese Erfahrung läßt sich gar leicht aus der vorigen beweisen. Denn, wenn die Luft naß ist, so wird die electrische Materie aus der Verstärkungsmaschine von den Wasser-Theilchen, die sich in der Luft befinden, gezogen, bis sich endlich dieses Fluidum nach dem allgemeinen Gesetze aller flüssigen Körper im Waage rechten Stande in die naße Luft ausgebreitet hat: da hingegen bei trockener Luft das in der Verstärkungsmaschine befindliche Wasser oder Metall die Materie stark an sich zieht, und nur sehr langsam sich ausbreiten läßt. Ich habe auch bemerkt, daß man bei nasser Luft den gläsernen Cylinder viel länger reiben muß, bis man einige electrische Funken heraus locket: denn so lange der Cylinder naß ist, läßt sich nichts heraus bringen; weil die Attraction der wässerichten Theilchen so stark ist gegen den Cylinder, als die Attraction des Bleches ist von dem Glase gegen der Maschine. Dahero auch ein durch viele Potasche in Fluß gebrachtes Glas zu der Electricitet gar nicht taugt; weil die Potasche die Masse an sich zieht, also daß man nicht leicht dieselbe durch das Reiben von dem Glase abtreiben kann.

8.

8.

Will man sehen, wie die electriche Materie bey Ladung der Maschine zunimmt, oder nach Ladung derselben wieder abnimmt, darf man nur einen Dratt von der Maschine abhangen lassen, und einen Faden an der oberen Spitze des Drattes binden, daß der Faden an demselben herabhängt: man befestiget alsdann einen von Wachs gemachten Quadrant an dem Dratte, daß der Faden neben demselben bewegt wird; so kann man immer die Grade der zunehmenden und abnehmenden Materie an dem Quadrante zählen. Denn je stärker die Maschine angefüllet ist, desto weiter wird auch der Faden vom dem Dratte abstehen, und mithin der Winkel, den der Faden mit dem Dratte macht, größer. Der Gegentheil geschieht, wenn die Materie abnimmt.

9.

Aus den angebrachten Erfahrungen erhellet, daß alles, was in der Luft eine Nässe verursacht, auch die Verstärkung der electriche Materie in der Maschine verhindere; Wenn man demnach die erforderliche Nässe in der Luft von der Erde bis in die Wolken durch ein Mittel verursachen könnte, möchte man wohl die Verstärkung des electriche Feuers in dem Gewölke als in der natürlichen Electricitet (wie es in der Künstlichen geschieht) und mithin auch die Wirkungen dieser Materie verhindern.

Versuch,

10.

Man lade auch bey trockener Luft die electriche Maschine so stark als möglich; man zünde alsdann unter der Maschine oder um dieselbe herum feuchte Kräuter oder Stücke von nassen Holze an; so

wird man bemerken, daß sich die electriche Materie aus der Maschine ziemlich geschwind verliehre. Dieser Versuch läßt sich aus der allgemeinen Erfahrung, so ich voran gesetzt habe, gar leicht beweisen. Denn durch die steigenden Dünste der feuchten Körper wird auch die Luft um die Maschine herum angefeuchtet, und zieht folglich die electriche Materie aus der Maschine an sich.

Versuch.

II.

Ich füllte die Maschine mit electricher Materie so stark, als konnte, bey trockenem Wetter; daß der Faden von dem Dratte ziemlich weit abstund; ich lud alsdann ein Stückchen mit Pulver, setzte solches auf dem Bleche, mittelst dessen das electriche Feuer in die Verstärkungsmaschine geleitet wird; brennte das Stückchen koch, und bemerkte bey mehrmaliger Wiederholung des Versuches, daß der Faden bey dem Schusse an den Dratt auf einmal herabfiel; und mithin die electriche Materie in der Maschine vermindert würde. Die Ursache dessen deucht mir, ist; weil die Flamme des angezündeten Pulvers, so sich ziemlich weit ausbreitet, auch viele electriche Partickeln aus der Maschine an sich reißt, und in die Luft zerstreuet. Hingegen glühende Kohlen, auch die Flamme eines angezündeten Geistes hat keine besondere Wirkung an der electrichen Maschine; ja man bemerkt, daß die Kohlen, und die Flamme selbst electricret werden; und wenn man den Finger gegen solche Flammen hält, so neuet sich die Flamme gegen den Finger wie andere electriche Körper zu thun pflegen. Daß die electriche Materie bey der Flamme eines Geistes sich nicht so schnell verliehret, als bey der Flamme eines angezündeten Pulvers, mag wohl die Ursache seyn, weil jene sich gar nicht weit ausdehnet; die Flamme aber des angezündeten Pulvers eine geraume atmosphäre hat.

Der

Versuch.

12.

Man nehme einen Spritzkrug, fülle solchen mit Wasser an; man lege das eine Ende eines Hebers in das Wasser, daß das andere Ende desselben über ein mit Wasser angefülltes Geschier, so auf dem Boden steht, herunter hängt; man ziehe mit dem Munde das Wasser an sich, daß es durch den Heber in das untere Geschier zu laufen anfängt; man reibe alsdann das Glas, wodurch die Maschine pfeget geladen zu werden, so wird man bemerken; daß so lange das Wasser durch den Heber läuft, die Maschine sich gar nicht anfüllen läßt; oder wenn sie schon zuvor geladen worden, so bald das Wasser von dem oberen Geschirre durch den Heber in das untere zu laufen anfängt, verliert sich die electrische Materie in der Maschine sehr schnell. Indem die electrische Materie ein Fluidum ist, so steht sie allezeit in dem Waage rechten Stande in allen Körperen, so mit der Maschine eine Verknüpfung haben. Derowegen auch, wenn man von der Maschine einen Dratt auf den Boden herunter läßt; so läßt sich die Maschine nie laden, und wenn sie geladen ist, so bald der Dratt den Boden berührt, verliert sich also gleich die Materie in der Maschine, weil sich das Feuer in alle andere Körper in gleichem Maße ausgießt. Auf gleicher Weise erlangt die Maschine durch das Wasser-Ströhmchen, so durch den Heber in das untere Geschier von dem Oberen in einem Continuo herunter läuft, eine Verknüpfung mit allen herumstehenden Körperen, und folglich ergießt sich in gleichem Maaße in dieselbe; mithin muß sie sich in der Maschine verliehren.

13.

Ich habe den (N. 10.) angebrachten Versuch mit allerhand säftigen Kräutern und Hölzern gemacht, und habe nichts anderes
beob.

beobachtet als daß, je saftiger und wäßerichter die Körper waren, desto schneller sich die electriche Materie in der Maschine verlißte. Den Versuch, so ich (N. 11.) angebracht habe ich mit Loßbrennung eines Stückchens, auch zu verschiedenen Zeiten, und auf verschiedene Art gemacht. Ich setzte die Verstärkungsmaschine so weit von dem Bleche, worauf das Stückchen lag, daß die Flamme des angezündeten Puffers selbe nicht erreichen könnte, da ich auch dem Stückchen eine andere Richtung als gegen der Verstärkungsmaschine gab. Ich bemerkte doch jederzeit, daß, so bald das Stückchen lag, der Faden gegen dem Dratte auf einmal völlig herunter fiel; aber gleich wieder von dem Dratte abgieng, doch so, daß die Entfernung um etliche Grade weniger nach dem Schusse, als sie vor demselben war; woraus ich augenscheinlich abnehmen konnte, daß die Flamme des angezündeten Puffers die an dem Dratte stehenden electriche Theilchen gleich an sich riß; welche aber augenblicklich von der electriche Materie aus der Verstärkungsmaschine ersetzt wurde; indem der Faden bey dem Schusse gegen dem Dratte herunter fiel, und gleich wieder von demselben abgieng. Weil aber die Entfernung des Fadens von dem Dratte nach dem Schusse um etliche Grade weniger als vor demselben war, so muß auch die Flamme viele electriche Theilchen an sich gezogen, und mit sich in die Luft gerissen haben.

14.

Was sich nun aus diesen Versuchen in Absicht auf das Hochgewitter schließen läßt, werde ich nachhero in dem dritten und vierten Hauptstücke betrachten: nachdem ich vorher die Natur des Hochgewitters so genau als möglich, werde untersucht haben.

Zweytes Hauptstück,

von der Natur oder Beschaffenheit des Hochgewitters.

15.

Daß der Donnerstrahl eine und die nemliche Materie mit Electricischen sey, kann aus unlaugbaren Versuchen bewiesen werden. Derowegen deucht mich, man könne auf keine bessere und leichtere Art die Natur des Hochgewitters erklären, als durch die Beschreibung desselben mit der künstlichen Electricitet. Und ich getraue mich zu behaupten, daß kein Phænomenon, so eigentlich und unmittelbar von der Wirkung des Strahles herkömmt, sich jemals gesagt habe, so man nicht durch die electricischen Versuche erklären kann.

Versuch.

16.

Man stecke bey einem Hochgewitter eine zugespitzte eiserne Stange auf, dasselbe von allen symperielectricischen Körpern frey steht. Man führe von der Stange bis an die Maschine einen Dratt; wird die Maschine stärker geladen, als wenn man den gläsernen Cylinder eine Stunde gerieben hätte. Also ist die Luft bey einem Hochgewitter mit electricischen Theilchen angefüllet, welche von Metall und Gasser angezogen werden, wie die electricische Materie, die durch Reibung des gläsernen Cylinders hervorgebracht wird. Führt nur ein Strahl durch die Luft, so wird die Maschine leer. Also ist diese Materie keine andere als diejenige, die in den Wolken ist, und sich die untere Luft ausgießt, und von der eisernen Stange angezogen

§ f f

wird,

wird. Diese Materie hat den nemlichen Geruch, die nemliche Farbe, die nemliche Wirkungen auf alle Körper mit dem electrischen Feuer: also ist sie die nemliche mit der electrischen Materie. Der Geruch und die Farbe von beyden ist der Geruch und die Farbe des angezündeten Schwefels.

Anmerkung.

17.

Anstatt des gläsernen Cylinders kann man sich mit besten Erfolge eines aus Schwefel gemachten Cylinders bedienen. Dies aber bey einem Hochgewitter die Luft mit schweflichten Theilchen angefüllt ist, geben uns die Sinne genugsames Zeugniß. Die bey einem nahen Hochgewitter angelofene Fenster, der starke Geruch des Schwefels beweisen augenscheinlich den Ueberfluß des Schwefels in der Luft. Wenn nun die in den dichten Wolken befindlichen Schwefeltheilchen an ein ander durch die beständige Bewegung gerieben, und durch die wässerichten Theilchen aufgelöst werden; so müssen notwendiger Weise die Feuertheilchen aus dem Schwefel (gleichwie es in der künstlichen Electricitet geschieht) heraus fließen, und die ganze Wolke mit electrischer Materie anfüllen.

Versuch.

28.

Man electrifizire einen Tropfen Wasser, halte solchen an zerstoßenem Salze, so wird er das Salz an sich ziehen, und sogleich zu Eise werden. Sind nun bey einem Hochgewitter viele salpetrische Theilchen in den Wolken, so werden die electrisirten Wassertheilchen die Salpetrischen an sich ziehen, und also gleich zu Eise werden.

Da

Daher kommt es, daß man bey dem Hochgewitter so vielfältigen Hagel hat, der an den Feldfrüchten unerseßlichen Schaden verursacht.

Versuch.

19.

Man hente an der electrischen Maschine eine metallene Kugel; man lade sodann die Maschine, man nehme einen anderen metallenen Körper; (oder mit Wasser angefülltes Geschier) binde die Kette, so die Verstärkungsmaschine von außen berührt, um ihn herum, oder berühre ihn damit: so wird die electrische Materie aus der electrifirten Kugel gegen dem anderen Körper mit einem Knalle auch in einer ziemlichen Weite hinfahren. Diesen Raum, der zwischen den zweyen Körperen ist, da die electrische Materie aus dem einen in den anderen schlägt, nenne ich den Schlag-Raum (*Distantia dictus*) welcher desto größer seyn wird, je mehr der eine Körper mit electrischer Materie angefüllt ist, und je leerer von dieser Materie der andere Körper ist. Wenn nun in den Wolken mehr electrische Materie als in der Erde ist, oder in anderen auf der Erde befindlichen Gegenständen; so muß nach dem erst angebrachten Versuche die electrische Materie oder der Donnerstrahl mit einem Knalle (so durch die schnelle und heftige Ausdehnung und wieder Zusammenschagung der Luft verursacht wird) gegen die Erde, oder solche Gegenstände, die in dem Schlag-Raume stehen, herunterfahren. Hier haben wir eine natürliche und gründliche Ursache; warum der Strahl als ein leichteres Fluidum durch die schwerere Luft herunterfalle. Hieraus läßt sich auch leicht erklären; warum der Strahl die Thürme oder die auf Bergen stehenden Gebäude, auch auf den Bergen wachsende Bäume öfters als andere Dinge trift: weil diese wegen ihrer nahen Entfernung von den Wolken öfters in dem Schlag-Raume des Strahles als andere Dinge stehen.

Anmerkung.

20.

Der erst angebrachte Versuch geht nur an bey den metallenen oder wässerichten Körpern; ja ich habe schon in dem ersten Hauptstücke (N. 1.) die allgemeine Erfahrung angebracht, daß die electrische Materie nur von Metalle und Wasser, oder von den Körpern, die Metall oder Wasser in sich enthalten angezogen werde. Hingegen Pech, Wax, Glas, Seiden, Unschlitt &c. verhindern gänzlich den weiteren Ausfluß dieser Materie. Wie aus allen electrischen Versuchen bekannt ist. Daher kommt es, daß der Donnerstrahl gemüthlich in die Wässer und Bäume schlägt, weil diese viele wässerichte Säfte in sich enthalten; absonderlich aber, wenn sie an Bergen, oder sonst erhabenen Orten (wie vorhin gesagt worden) stehen. Weil sie alsdann näher an den Wolken, und mithin öfters in dem Schlagraume stehen. Es erhellet ferner aus dieser Erfahrung, warum der Strahl den Metallen Spizen zugeht; warum, wenn er in die Gebäude schlägt, meistens die metallene Geschier beschädiget. Warum hingegen der Strahl keinen Ideoelectrischen Körper, als Pech, Glas, Seiden &c. angreift; weil diese Körper die electrische Materie nicht annehmen, und den weiteren Ausfluß derselben gänzlich verhindern. Und wenn Phænomena da sind, daß dergleichen Körper niemals beschädiget worden; so wird man nach Untersuchung der Umstände erfahren, daß die Beschädigung nicht unmittelbar von dem Strahle, sondern von der schnellen Bewegung und Ausdehnung der Luft herrühre, welche zuweilen die Gläser zerbricht, und Seiden zerreißt. Man weiß Exempel bezubringen, wo der Strahl alle Kleider am menschlichen Körper verzehret habe, außer seidene Scapulire, die sie trugen; wie es einem Pfarrherrn unweit Altdorff vor wenigen Jahren begegnet ist, welcher von dem Donnerstrahle getroffen worden,

und

und alle seine Kleider, das seidene Scapulier ausgenommen, verjehret worden.

Erfahrung.

21.

Man hat erfahren, daß das electrische Feuer eher den spizigen als breiten Körperen zu geht. Derowegen auch die Stange, so man bey dem Hochgewitter aufstecket, zugespizet wird. Eben dieses beweiset, daß auch der Strahl öfters die spizigen Gebäude als andere treffen müße, so auch mit der Erfahrung ganz richtig übereinstimmt. Mithin bey den Thürmen, sind vielfältige Ursachen, warum der Strahl eher in dieselbe, als in andere Gebäude schlägt, nemlich die Höhe, die Spizen, und das auf den Thürmen meistens befindliche Metall ic.

22.

Diese und dergleichen Phänomenen des Donners, welche unmittelbar von der Materie des Strahles herrühren, lassen sich augenscheinlich durch die electrischen Versuche sehr genau und leicht erklären. Doch giebt es andere, die nicht so leicht in dem ersten Anblicke sich scheinen erklären zu lassen. Wenn man aber betrachtet, daß bey dem Strahle zweyerley Wirkungen gefunden werden, nemlich die Wirkung des Feuers oder electrischer Materie, und die Wirkung der durch das Feuer ausgedehnten Luft, so wird man sie alle ohne Mühe erklären können, wenn man nur alle Umstände weiß. Daher geschieht es, daß der Strahl zuweilen zündet, zuweilen aber nur das Holz zerspaltet; da er nemlich entweder nahe vorbeysfährt, und durch seine heftige Hitze, die in den Poris befindliche Luft schnell ausdehnet, welche sodann keine Entzündung, sondern eine Spaltung verursachet; oder

wenn der Strahl durch einen Riß herein fährt, und ohne das Holz zu berühren, dasselbe abermal durch die schnelle Ausdehnung der Luft zerspaltet. Diese doppelte Wirkung des Strahles beweisen jene Bäume, die man oft von dem Strahle ausgebrannt, oft aber nur zersplitteret in den Wäldern antrifft. Die Donnerstrieche, die nicht zünden, werden gemeiniglich Wasserstrieche genannt; obschon ich öfters beobachtet habe, daß der nemliche Strahl, da er durch das Dach eines Hauses herein fuhr, einen Balken nur zerspaltet, auf der andern Seite aber, wo er hinaus gieng, den Balken in Flammen gesetzt habe. Ja man wird gemeiniglich erfahren, daß die röthlichten Strahlen, welche mehr Schwefel mit sich führen, leichter als die weißen zünden; weil der Schwefel als eine glebrichte Materie sich an den Balken oder Bäumen hänget, und eine Entzündung verursacht, da ein heller und reiner Strahl oft durch einen Riß hereinfährt, und den Balken durch die schnelle Ausdehnung der Luft zerspaltet, ohne ihn zu entzünden. Erst in dem verfloßenen Jahre geschah es in Oesterreich, daß zwey Knaben unter einem Schwibogen saßen: es fährt ein Strahl durch den Schwibogen; dem einen Knaben zerriß er die Beinkleider, dem andern riß er ein Schippel Haar aus dem Kopfe, und heftete solches an eine unweit davon gelegene Mauer; welche lauter Wirkungen der ausgedehnten Luft, nicht des Feuers waren.

23.

Unter andern wunderlichen Wirkungen des Strahles sieht man, daß er den Degen in der Scheide, ohne dieselbe zu verletzen zerschmolzen habe, und hingegen die Scheide zuweilen verleset, ohne den Degen zu berühren. Daß der Strahl den Degen zerschmelze, ohne die Scheide zu verletzen, ist eine ganz natürliche Wirkung des electricischen Feuers, welches von dem Metalle ohnehin angezogen wird. Daß aber die Scheide verleset worden, ohne daß der Degen Schaden

den gelitten; ist eine pure Wirkung der ausgedehnten Luft; da nemlich der Strahl nahe bey der Scheide vorbeÿ fährt, und durch die Ausdehnung der Luft die Scheide zerspaltet. Denn sollte der Strahl völlig an die Scheide kommen, so würde er auch unfehlbar von dem Metalle des Degens angezogen, und den Degen auch zerschmelzen. Bey einigen Donnerschlägen dauret das Krachen oder der Knall lange, bey andern hingegen geschieht es zu weilen, daß der Knall gleich dem Knalle eines Stuckes ist, und gleich aufhöret. Das erste geschieht entweder, da ein Strahl durch die Wolken fährt, und die Wolken den Wiederhall geben, gleichwie, wenn einer auf einer Anhöhe mit Wäldern oder Bergen umgeben, ein Stuck oder eine Flinte losbrennt; so werden alle umliegende Wälder und Berge einen langen Wiederhall zurücke geben: oder auch wenn ein Strahl in die untere Luft schlägt, und allda von verschiedenen Gegenständen hin und her gezogen wird, biß sich der Strahl endlich in einem Wasser oder in der Erde verliert. Das Zweyte aber geschieht, da der Strahl grad aus den Wolken gegen einen gewissen Gegenstand gezogen wird, in welchen er sich gleich verliert, ohne von andern Gegenständen hin und her gezogen zu werden. Denn weilen ein solcher Strahl durch alle Theile der Luft von den Wolken bis auf die Erde in einem unmerklichen Zeitraume herunter fährt, so werden auch alle Theile der Luft schier zugleich bewege, und müssen folglich auch alle schier zugleich zusammen fallen; derowegen uns auch der Knall, wie derjenige eines losgebrennten Stuckes vorkommen muß. Eine sehr wunderbare Wirkung eines Donnerstrahles ließt man in den Jahrbüchern eines gewissen Klosters. Es läuteten drey Brüder bey einem Hochgewitter; der Strahl schlägt in den Thurn, fährt herunter, und schlägt den einen tod, dem Zwayten verbrennte er das Oberkleid, ohne das Hemmet zu verletzen, dem Dritten endlich verzehrte er das Hemmet, fengte die Haut, und ließ das Oberkleid unbeschädiget. So hart und schwer dieses Phänomenon zu erklären scheint, doch wenn man ge-
wiße

wiße Bedignisse sehen darf (wie man in der That sehen muß) so läßt es sich nach meines Erachtens ganz schicklich erweisen. Daß der Strahl den einen erschlagen hat, ist nichts neues, und bedarf keine Erklärung. Daß er dem anderen das Oberkleid verzehret, ohne das Hemmet zu verletzen, ist einer größeren Schwierigkeit unterworfen. Wenn ich aber sehe, daß das Hemmet mit einem fetten Schweiß beschmuget war, so ist es leicht zu erachten, daß es von dem electrischen Feuer nicht angegriffen worden sey. Endlich daß bey dem Dritten das Hemmet verzehret worden, die Haut gesenget, und das Kleid unbeschädiget geblieben, läßt sich wieder erklären, wenn ich sehe, daß er ein wollenes Kleid (denn an der Wolle ist viele Fette) an dem Leibe gehabt habe, und daß das Hemmet mit einem wässerichten Schweiß benetzt war; so wurde der Strahl nothwendiger Maß mehr von dem naßen Hemmet als von dem fetten Tuche angezogen: und wenn die dickeren und fetten Schweißtheilchen die Poros des Körpers verstopfet haben, so hat der Strahl den Körper selbst nicht so leicht angreifen können, sondern hat ihn durch die nahe Entfernung fengen müssen.

24.

Ich habe nun die Natur und Beschaffenheit des Hochgewitters durch Vergleichung desselben mit den electrischen Versuchen, so viel mir möglich war, erklärt: woraus man auch zugleich die genaue Uebereinstimmung der künstlichen und natürlichen Electricität sehen kann. Jetzt schreite ich zur Untersuchung der bishero angewendeten Mittel die Hochgewitter zu vertreiben.

Drit

Erstes Hauptstück,

Von den electricischen Versuchen, wodurch das electricische Feuer in der Maschine vermindert wird.

4.

Da der Donnerstrahl und das electricische Feuer eine und die nemliche Materie ist, (so ich nachhero beweisen werde, da die Natur des Hochgewitters der Gegenstand meiner Beschäftigung seyn wird) so giengen alle meine Versuche mit der electricischen Maschine dahin; durch was für Mittel ich eine Verminderung des electricischen Feuers erhalten könnte. Denn, was die Materie in der Maschine vermindert, sollte dem ersten Ansehen nach auch das electricische Feuer in den Wolken vermindern und zerstreuen.

Erfahrung.

5.

Das electricische Feuer wird von allen Metallen und Wasser attrahiret; und folglich von allen Körpern, welche weniger oder mehr von diesen zweyen in sich enthalten, auch mehr oder weniger angezogen. Man kann demnach diese zwey Körper die Conductores oder Leiter der electricischen Materie nennen. Daraus erhellet, warum bey Ladung der Maschine Blech oder Rauschgold gleich an dem gläsernen Cylinder gelegt werde. Damit nemlich die electricischen Theilchen, welche durch das Reiben aus dem Glase herausgetrieben worden, gleich von dem Metalle angezogen, und so weiter in die Verstärkungsmaschine geleitet werden. Eben die nemliche Wirkung bemerkt man bey dem Wasser; daher die Verstärkungsmaschine mit Wasser oder Feil-Späne angefüllet wird; welche zwey Körper die

die Bewegung der Luft, so von dem Glockengeläute entsteht, weder heftig, noch schnell, also kann es unmöglich vor sich die Zertheilung der Wolken verursachen, und man wird in der That keine Erfahrung beibringen können, daß durch ein großes Geläute ein Wind entstanden sey, welche doch seyn müßte, wenn das Glockengeläute im Stande wäre eine Zertheilung der Wolken zu erwirken. Doch könnte man es noch gelten lassen, wenn man nicht sowohl durch die schier tägliche Erfahrung, als aus physikalischen Gründen überzeugt wäre, daß es bey dem Hochgewitter sehr schädlich seyn müsse.

28.

Diese Erfahrung darf man nicht erst aus den ältern Zeugnissen und Jahrbüchern, noch aus entfernten Ländern herholen, man kann sie jährlich in Baiern zu genüge ansehen. Die Menge der Kirchenthürme, die wehrendem Läuten von dem Strahle sind getroffen worden, geben uns dessen einen unwidersprüchlichen Beweis. Ja es giebt Orter, die an hohen Bergen liegen, zum Besspiel, an dem Hohenberge, wo man wehrendem Hochgewitter gar nicht läuten darf. In dem verfloßenen Jahre hat es nur in einer einzigen Pfarre acht bis neunmal in die Kirchenthürme unter dem Läuten eingeschlagen. Mit einem Worte, ein jedes Jahr giebt uns neue Beweise der natürlichen Wirkung des Glockengeläuts; und gewißlich, wenn nicht das Vorurtheil des gemeinen Volkes, und anderer in der natürlichen Erfahrung und eigensinnigen Leute diesen Mißbrauch so lange unterstützt hätte, wußte man gewiß von dem Glockengeläute bey dem Hochgewitter eben so wenig im Deutschlande, als man in einigen andern Orten weiß, wo man in diesem Stücke vernünftiger, und ohne Vorurtheil zu denken gewohnt ist.

29.

Weil es aber nicht genug ist, die bloße Erfahrungen anzuführen,

ren, sondern auch einen Naturkundigen obliegt, eine Vernünftige
sach der Erfahrungen beizubringen, so will ich auch hier diese Er-
rungen aus physikalischen Gründen beweisen. Indem, wie schon
hin erwiesen worden, das Metall und Wasser die Conductores
electrischen Materie sind, so müssen die in den hohen Thürmen
ngenden metallenen Glocken schon vor sich die electrische Materie
sich ziehen, noch vielmehr aber, da sie geläutet werden.

Versuch.

30.

Man reibe im Dunklen einen gläsernen Cylinder, bis die elec-
schen Ausflüsse sichtbar werden, man halte alsdann den Finger ge-
n dem Cylinder, so wird man wahrnehmen, daß die electrischen
nten aus dem Finger gegen den Cylinder hinfließen, und zwar
irker und häufiger gegen jenen Theile des Cylinders, der zum letz-
gerieben worden. Die Ursache ist, weil die electrische Materie
ach das Reiben aus dem Cylinder getrieben worden, und weil auf
liche Weise in dem Finger diese Materie häufiger als in dem geriebe-
n Glase ist, so fließt sie dem beraubten Körper so lange zu, bis
im Waage rechten Stande ist, und der Körper so viel wieder em-
angen, als er durch das Reiben verloren hat. Daß aber diese
usflüsse häufiger gegen jene Theile, welche zu letzt gerieben worden,
m müssen, ist ganz natürlich, weil diese Theile stärker als die an-
re von der electrischen Materie beraubt sind, indem die übrigen schon
is der nahen Luft den Abgang in etwas ersetzt haben.

31.

Dieser Versuch läßt sich sehr wohl auf die Glocken anwen-
n; denn da die Glocken geläutet werden, müssen die kleinsten Theile

des Metalls stark aneinander gestoßen, und gerieben werden: durch dieses muß auch nothwendiger weise die electriche Materie, so in den Glocken ist, heraus getrieben werden: da nun bey einem Hochgewitter die Luft mit electricchen Theilchen angefüllt ist, müssen sie nothwendiger weise weit häufiger als anderswo gegen die von dieser Materie beraubter Glocken hinfließen, und zwar desto häufiger, je stärker die Glocken geläutet, und mithin von der electricchen Materie beraubt werden; eben als wenn man in einem Zimmer um die Mauer ringsherum Wasser ausgießen sollte, so wird das Wasser von allen Seiten des Zimmers gegen die Mitte desselben mit heftiger Bewegung hinfließen, biß es im Waage rechten Stande in den ganzen Zimmer steht, also auch muß die electriche Materie, die in der nahe Luft um die Glocken ist, mit heftigem Drucke gegen die beraubten Glocken hinfließen. Da nun die electricchen Theilchen einander stark anziehen (wie es aus dem N. 16. angeführten Versuche erhellet) und auch das electriche Feuer in den Wolken eher dorthin fließen muß, wo weniger von dieser Materie ist, so ist es ganz natürlich, daß das Glockengeläut den Strahl gegen den Thurm und die nahe stehenden Gebäude hinziehe.

32.

Da ferner das Wasser ein Conductor der electricchen Materie ist, so wird ein Strahl eher dort, wo eine nahe Luft ist, als anders wo hinfallen. Wenn an einem Orte die Luft bewegt wird, so werden durch die Bewegung die Lufttheilchen an einander gestoßen; und folglich die Feuertheilchen, so die Dünste ausdehnten, und von einander abhielten, herausgeworfen: wenn die Feuertheilchen herausgeworfen werden, so müssen die wässerichten Dünste durch die anziehende Kraft der Theilchen an einander zusammen kommen, und mithin wird um die Bewegungsmaschine die Luft näher und wässerichter
als

Versuch.

12.

Man nehme einen Spritztrug, fülle solchen mit Wasser an; man lege das eine Ende eines Hebers in das Wasser, daß das andere Ende desselben über ein mit Wasser angefülltes Geschier, so auf dem Boden steht, herunter hängt; man ziehe mit dem Munde das Wasser an sich, daß es durch den Heber in das untere Geschier zu laufen anfängt; man reibe alsdann das Glas, wodurch die Maschine leicht geladen zu werden, so wird man bemerken; daß so lange das Wasser durch den Heber läuft, die Maschine sich gar nicht auflädt; oder wenn sie schon zuvor geladen worden, so bald daß Wasser von dem oberen Geschirre durch den Heber in das untere zu laufen anfängt, verliert sich die electrische Materie in der Maschine sehr schnell. Indem die electrische Materie ein Fluidum ist, so steht sie jederzeit in dem Waage rechten Stande in allen Körperen, so mit der Maschine eine Verknüpfung haben. Derowegen auch, wenn man von der Maschine einen Dratt auf den Boden herunter läßt; so läßt sich die Maschine nie laden, und wenn sie geladen ist, so bald der Dratt den Boden berührt, verliert sich also gleich die Materie der Maschine, weil sich das Feuer in alle andere Körper in gleichem Maße ausgießt. Auf gleicher Weise erlangt die Maschine durch das Wasser-Ströhmchen, so durch den Heber in das untere Geschier von dem Oberen in einem Continuo herunter läuft, eine Verknüpfung mit allen herumstehenden Körperen, und folglich ergießt sich in gleichem Maße in dieselbe; mithin muß sie sich in der Maschine verlieren.

13.

Ich habe den (N. 10.) angebrachten Versuch mit allerhand
stigen Kräutern und Hölzern gemacht, und habe nichts anderes
beobachtet

beständigen Erfahrung wissen, daß so oft sich bey dem Hochgewitter der Wind erhebet, das Gewölk gleich zertheilet, und das Hochgewitter in einen Regen verwandelt werde. Ich habe selbst sehr oft gesehen, daß die düchten, und düsteren Wolken einer Gegend mit Donner und Hagel gedrohet haben, und doch ein gähling entstehen der Wind hat dieselbe also zertheilet, daß nichts weiters als ein fruchtbarer Regen entstanden sey; denn sind die Wolken zertheilet, so können sie nicht mit Electrisher Materie geladen werden, gehet nun diese ab, so ist zugleich, nachdem im zweyten Hauptstücke angebrachten Versuchen der Donner zugleich mit dem Hagel gehoben.

34.

Nun kömmt es darauf an, daß man beweise, daß das Aufheuren der Stücke ein taugliches Mittel sey die Luft in eine starke Bewegung zu bringen. Es ist unstreitig, daß die Luft kugelförmigen so vor dem Munde des Stückes stehen durch die Flamme des angezündeten Pulvers in eine sehr schnelle Bewegung gebracht werden. Wenn man sich demnach Luftsäulen von dem Munde des Stückes an, bis auf die Wolken einbildet (wie sie wirklich auch sind) so muß nothwendiger weise die schnelle Bewegung, so den ersten Luft kugelförmigen in diesen Säulen gegeben werden, auch den übrigen wegen der sehr elastischen Kraft der Luft bis in die Wolken mitgetheilet werden. Es ist zwar wahr, daß diese Bewegung, je weiter sie gehet, immer schwächer und schwächer wird, nichts desto weniger, wenn der Schluß öfters widerhollet wird, so können auch die Luftkugelförmigen, so bis auf die Wolken reichen, zu letzt endlich in eine solche schnelle Bewegung gebracht werden, daß dadurch das Gleichgewicht der Luft gehoben werde, und ein starker Wind entstehe. Denn eine Bewegung, die anfänglich nur schwach und schier unmerklich ist, kann doch durch wiederholte Stöße sehr verstärkt werden. Wir haben das Beispiel an den

den Meerflutten, denn anfänglich kräust sich die Oberfläche des Meers, und doch durch öfters wiederholte Windstöße wird das Wasser in eine so heftige Bewegung gesetzt, daß die Flutten wie die Berge steigen. Wenn dieses bey dem Wasser als einem schweren und minder elastischen Körper, als die Luft ist, geschieht, so kann man ganz vernünftig schließen, daß wenn die Luft durch widerholte Stöße bewegt wird, das Gleichgewicht derselben gehoben werde, und daraus ein heftiger Wind entstehen müsse, so auch die Erfahrung nach einer starken Canonade öfters bewiesen hat; ist dieses, so darf man auch schließen, daß das abfeuern der Stücke ein nützliches und taugliches, ja das tauglichste Mittel sey, so man noch weißt, und erfunden hat, das hochgewitter zu vertreiben.

35.

Ich habe durch den (Nro. 11.) angeführten Versuch erwiesen, daß die Flamme eines loßgebrannten Stückchens einen Theil der electrischen Materie an sich reiße. Es wird auch zweifels ohne, aus gleichem Grunde die Flamme eines loßgebrannten Stückes die electrische Materie aus der nahen Luft an sich ziehen. Doch muß ich bekennen, daß dieser der geringste Nutzen der Stücke bey dem Hochgewitter sey; denn dieses wird wenig oder nichts helfen, wenn es auch nicht, die electrische Materie aus dem Gewölke selbst, als aus der natürlichen Verstärkungsmaschine zieht. Dieses aber kann man nicht behaupten, indem auch ein loßgebranntes Stückchen die electrische Materie aus der Verstärkungsmaschine bey der künstlichen Electricitet bey weiten nicht völlig zieht, sondern solche nur in etwas verringeret; es kann aber ein Stück auch nicht einmal so große Wirkung in dieser Absichte auf die Wolken haben, als ein Stückchen auf die Electrische Maschine, sowohl wegen der großen Entfernung, wohin die Flamme keineswegs nur von weitem reicht, als auch, und abson-

ders

berlich wegen der minderen Verknüpfung der electricischen Materie in der unteren Luft mit dem electricischen Feuer in den Wolken. Dem in der künstlichen Electricitet, wird das electriche Fluidum in der Verstärkungsmaschine unmittelbar durch den Dratt mit dem Stücke verknüpft; in der natürlichen aber, oder in den Wolken, ist diese unmittelbare Verknüpfung nicht. Derowegen man auch nicht behaupten kann, daß die Flamme der losgebrenten Stücke in Rücksicht auf die Verminderung des electricischen Feuers in den Wolken, einen besonderen Nutzen haben könnte.

36.

Da demnach der Hauptnutzen des Gebrauches der Stücke bey dem Hochgewitter, in Hetung des Gleichgewichts und bestiger Bewegung der Luft besteht, so dürfte es nicht unnütz seyn, einige Regeln hier beizufügen, wie und wann man sich der Stücke bey dem Hochgewitter gebrauchen sollte. Die erste Regel betrifft die Richtung, so die Stücke haben sollten: die Zweyte bestimmt den Zeitraum zwischen einem Schusse und dem andern; die Dritte zeugt zu welcher Zeit die Ablösung der Stücke den größten Nutzen haben möchte.

37.

Die Richtung der Stücke betreffend, ist außer allem Zweifel die flüglichsste, wenn sie gegen die Wolken selbst gerichtet werden, dem, weil der perpendicular-Stoß, oder was eines ist, der unter einem rechten Winkel auf den Gegenstand geschieht, der wirksamste, und stärkste ist; der Stoß aber, der in dieser Richtung der Stücke, auf die Wolken geschieht, perpendicular ist, so folgt der Schluß von selbst, daß diese angegebene Richtung auch die beste, und flüglichsste sey. Woraus folget, daß je näher die Wolken einer Gegend sind, desto höher auch die Stücke gerichtet werden müssen. Weil ferner
der

aber kommt es, daß man bey dem Hochgewitter so vielfältigen Schaden hat; der an den Feldfrüchten unerfesslichen Schaden verursacht.

Versuch.

19.

Man hänge an der electrischen Maschine eine metallene Kugel; man lade sodann die Maschine, man nehme einen andern metallenen Körper; (oder mit Wasser angefülltes Geschier) binde die Kugel, so die Verstärkungsmaschine von außen berührt, um ihn her zu führen, oder berühre ihn damit: so wird die electrische Materie aus der leitenden Kugel gegen den andern Körper mit einem Knalle auch in einen ziemlichen Weite hinfahren. Diesen Raum, der zwischen den beiden Körpern ist, da die electrische Materie aus dem einen in den andern schlägt, nenne ich den Schlag-Raum (*Distantia dictus*) welcher desto größer seyn wird, je mehr der eine Körper mit electrischer Materie angefüllt ist, und je leerer von dieser Materie der andere Körper ist. Wenn nun in den Wolken mehr electrische Materie in der Erde ist, oder in andern auf der Erde befindlichen Gegenständen; so muß nach dem erst angebrachten Versuche die electrische Materie oder der Donnerstrahl mit einem Knalle (so durch die schnelle und heftige Ausdehnung und wieder Zusammenschlagung der Luft verursacht wird) gegen die Erde, oder solche Gegenstände, die in dem Schlag-Raume stehen, herunterfahren. Hier haben wir eine natürliche und gründliche Ursache; warum der Strahl als ein leichtes Fluidum durch die schwerere Luft herunterfalle. Hieraus läßt sich auch leicht erklären; warum der Strahl die Thürme oder die auf hohen Bergen stehenden Gebäude, auch auf den Bergen wachsende Bäume öfters als andere Dinge trifft: weil diese wegen ihrer nahen Entfernung von den Wolken öfters in dem Schlag-Raume des Strahls als andere Dinge stehen.

39.

Was endlich die Zeit betrifft, kann man drey Zeiträume setzen, in welchen man sich der Stücke bedienen könnte. Der Erste ist, da sich die Hochgewitter zu zeugen anfangen; doch da man aus vorherrschender Wärme geschwülliger Luft, und Herabfallung des Mercurium dem Wetterglaße ein nahes Ungewitter wahrnehmen kann. Der zweyte Zeitraum ist, da sich die Hochgewitter ober dem Horizon zeigen anfangen. Der Dritte ist endlich, da sich schon wirklich die Hochgewitter über eine Gegend ausgebreitet haben. Nicht wenig aus folgendem Grunde, der erste Zeitraum könnte mit beträchtlichem Nutzen beobachtet werden. Denn durch die heftige Bewegung in der Luft würden die Dünste an einander gestoßen, und die Feuertheilchen (welche sowohl die Dunstflügelchen ausdehnen, und verleichteren, als auch diejenigen, welche zwischen diesen Kugeln liegen, und dieselben durch ihre electrische Kraft von einander abhalten) heraus geworfen werden. So bald nun die Feuertheilchen herausgeworfen sind, müssen die Dünste ganz natürlich durch ihre anziehende Kraft voneinander kommen; solcher Gestalt werden die Dunstflügelchen immer größer, bis sie endlich durch ihre natürliche Schwere zu fallen anfangen. Auf solche weise könnte man einen Regen erhalten, wodurch die Atmosphäre nach und nach gereinigt würde, ehe sie noch mit mehreren Dünsten angefüllt wurde, welche wenn sie durch ihre allzugroße Schwere zu fallen anfangen, und durch die von andern Gegenden herdringenden Wolken verdickt werden, einen schädlichen Mayregen, oder (wenn die erforderlichen Salmischen Theilchen in der Atmosphäre sind) einen noch schädlicheren Hagel verursachen könnten: eben dieses kommt mit den Erfahrungen überein, indem man erfährt, daß nach einem heftigen Schießen, der Himmel sich zum Regen zu richten pflege, wenn solches die Räume der Atmosphäre nicht verhindert. Es ist auch diese Erfahrung so gemein, daß man an einigen

Dr

Orten, wenn man einen schönen Tag verlangt, etliche Tage voraus schießt, um die Atmosphäre durch einen vorläufigen Regen zu reinigen. Wenn aber dieser Zeitraum vernachlässiget wird, können noch die Stücke eine nützliche Wirkung auf das Hochgewitter haben, da sie sich erst ober dem Horizon zu zeigen anfangen. Denn wenn man sie nach den eben zuvor angegebenen Regeln anwendet, mögen sie durch die heftige Bewegung der Luft die Wolken aufs wenigst in etwas zertheilen, und auf solche Art verursachen, daß das Hochgewitter weder so heftig sey, noch so lange daure, als es sonst gedauert hätte, und würde mithin den Schaden entweder verhintern, oder aufs wenigst vermindern: woraus folgt, daß man den Gebrauch dieser Maschinen nie so lange aufschieben sollte, biß sich das Hochgewitter schon wirklich über die Gegend ausgebreitet habe. Denn alsdann (wie es vor sich klar ist) kann der Schaden nicht mehr so leicht verhindert werden; und muß folglich immer größer seyn, als es gewesen wäre, wenn man bey Zeiten dieses Mittel angewendet hätte. Zudem daß man zu dieser Zeit dieses Mittel sehr schwer wegen des Regens oder Hagels anwenden kann.

40.

Was ich hier von den Stücken gesagt, ist gleicher Maßen von andern pyrotechnischen Maschinen zu verstehen, durch welche die Luft heftig bewegt, und dessen Gleichgewicht gehoben werden könnte, als da sind große Raketten, welche, wenn sie aus Mörseren geschossen würden, eine große Höhe erreichen würden; Diese, wenn sie gleichsam in dem Gewölke selbst zerspringen könnten, natürlicher weise nicht ohne beträchtlicher Wirkung seyn, und ich weis nicht, ob etwas tauglicher die Wolken zu zertheilen erfunden werden möchte, absonderlich wenn sie nahe sind.

wenn der Strahl durch einen Riß herein fährt, und ohne das Holz zu berühren, dasselbe abermal durch die schnelle Ausdehnung der Luft zerspaltet. Diese doppelte Wirkung des Strahles beweisen jene Bäume, die man oft von dem Strahle ausgebrannt, oft aber nur zersplitteret in den Wäldern antrifft. Die Donnerstrieche, die nicht zünden, werden gemeiniglich Wasserstrieche genannt; obschon ich öfters beobachtet habe, daß der nemliche Strahl, da er durch das Dach eines Hauses herein fuhr, einen Balken nur zerspalte, auf der andern Seite aber, wo er hinaus gieng, den Balken in Flammen gesetzt habe. Ja man wird gemeiniglich erfahren, daß die röthlichten Strahlen, welche mehr Schwefel mit sich führen, leichter als die weißen zünden; weil der Schwefel als eine glebrichte Materie sich an den Balken oder Bäumen hänget, und eine Entzündung verursacht, da ein heller und reiner Strahl oft durch einen Riß hereinfährt, und den Balken durch die schnelle Ausdehnung der Luft zerspalte, ohne ihn zu entzünden. Erst in dem verfloßenen Jahre geschah es in Oesterreich, daß zwey Knaben unter einem Schwibogen saßen: es fährt ein Strahl durch den Schwibogen; dem einen Knaben zerriß er die Beinkleider, dem andern riß er ein Schippel Haar aus dem Kopfe, und befestete solches an eine unweit davon gelegene Maur; welche lauter Wirkungen der ausgedehnten Luft, nicht des Feuers waren.

23.

Unter andern wunderlichen Wirkungen des Strahles ließt man, daß er den Degen in der Scheide, ohne dieselbe zu verletzen zerschmolzen habe, und hingegen die Scheide zuweilen verletzet, ohne den Degen zu berühren. Daß der Strahl den Degen zerschmelze, ohne die Scheide zu verletzen, ist eine ganz natürliche Wirkung des electrischen Feuers, welches von dem Metalle ohnehin angezogen wird: daß aber die Scheide verletzet worden, ohne daß der Degen Schaden

den gelitten; ist eine pure Wirkung der ausgedehnten Luft; da nemlich der Strahl nahe bey der Scheide vorbeÿ fährt, und durch die Ausdehnung der Luft die Scheideerspaltet. Denn sollte der Strahl völlig an die Scheide kommen, so würde er auch unfehlbar von dem Metalle des Degens angezogen, und den Degen auch zerschmelzen. Bey einigen Donnerschlägen dauert das Krachen oder der Knall lange, bey andern hingegen geschieht es zu weilen, daß der Knall gleich dem Knalle eines Stuckes ist, und gleich aufhöret. Das erste geschieht entweder, da ein Strahl durch die Wolken fährt, und die Wolken den Wiederhall geben, gleichwie, wenn einer auf einer Anhöhe mit Wäldern oder Bergen umgeben, ein Stuck oder eine Flinte losbrennt; so werden alle umliegende Wälder und Berge einen langen Widerhall zurücke geben: oder auch wenn ein Strahl in die untere Luft schlägt, und allda von verschiedenen Gegenständen hin und her gezogen wird, biß sich der Strahl endlich in einem Wasser oder in der Erde verliert. Das Zweyte aber geschieht, da der Strahl sogleich aus den Wolken gegen einen gewissen Gegenstand gezogen wird, in welchen er sich gleich verliert, ohne von andern Gegenständen hin und her gezogen zu werden. Denn weilen ein solcher Strahl durch alle Theile der Luft von den Wolken bis auf die Erde in einem unmerklichen Zeitraume herunter fährt, so werden auch alle Theile der Luft schier zugleich bewegt, und müssen folglich auch alle schier zugleich zusammen fallen; derowegen uns auch der Knall, wie derjenige eines losgebrennten Stuckes vorkommen muß. Eine sehr wunderbare Wirkung eines Donnerstrahles ließt man in den Jahrbüchern eines gewissen Klosters. Es läuteten drey Brüder bey einem Hochgewitter; der Strahl schlägt in den Thurn, fährt herunter, und schlägt den einen tod, dem Zweyten verbrennte er das Oberkleid, ohne das Hemmet zu verletzen, dem Dritten endlich verzehrte er das Hemmet, sengte die Haut, und ließ das Oberkleid unbeschädiget. So hart und schwer dieses Phänomenon zu erklären scheint, doch wenn man gewisse

Nun wollen wir auch betrachten, wie die Wolken geladen werden. Da die schweflichten und wäßerichten Dünste sich in dicke Wolken versammeln, müssen durch die Bewegung der Luft die Theilchen selbst aneinander gerieben, und die Schweflichten durch die Wäßerichten aufgelöst werden. Durch die Reibung der Theilchen aneinander, und die innerliche Gährung werden die Feuertheilchen aus dem Schwefel herausgetrieben, und sogleich von den wäßerichten angezogen, bis endlich die ganze Wolke mit electrischer Materie angefüllt, und geladen wird. Hieraus kann man leicht sehen, daß je mehrer Dünste in der Atmosphäre sind, und folglich je dicker die Wolken werden, desto stärker auch dieselbe angefüllt werden müssen, und mithin das ungewitter desto stärker und schädlicher seyn. Nun aber, wenn man nasse und feuchte Körper anzünden sollte, und der Rauch in die Höhe gieng, müssen nothwendiger weise mit den wäßerichten auch viele schweflichte steigen. Diese würden ganz natürlich die Wolken noch dicker machen, und mithin dem Hochgewitter noch neue Nahrung geben, und folglich auch verursachen, daß dasselbe verstärkt, anstatt vermindert werde.

Ferner, wenn auch der Rauch feuchter Körper die nemliche Wirkung an dem Gewölke hätten, die er an der electrische Maschine hat, wer würde so viele Kräuter und feuchtes Holz finden, um so große Gegenden so oft zu bräuchern? den ein kleiner Rauch würde keine Wirkung haben. Was für ein Schade demnach möchte daraus auf einer andern Seite folgen? wer würde das Gestank so oft erbulden? es wäre in der That, wenn es auch bey den Wolken angienge, nur ein Mittel in den Gedanken, so man in die Uebung nicht bringen könnte. Da aber der Rauch, wie jetzt bewiesen worden, die nemliche

Wir-

Drittes Hauptstück,

Von den Mitteln die man bishero zu Vertreibung
der Hochgewitter angewendet hat.

25.

Die Mittel, die man bishero angewendet hat, sind hauptsächlich zweyerley, nemlich das Glockengeläut, und der Gebrauch pyrotechnischer Maschinen, bevoreaus der Stücke. Ich werde nun beyde etwas genauers untersuchen; und zwar erstlich, ob das Glockengeläut bey dem Hochgewitter nützlich sey.

26.

Taugliche und nützliche Mittel sind jene, wodurch entweder die dicken Wolken verdünnet und zerstreuet werden; oder aber die electriche Materie in den Wolken vermindert wird, oder auch wodurch gar verhindert wird, daß die Wolken mit electriche Materie geladen werden. Wenn nun das Glockengeläut eine aus diesen Wirkungen hervorbringt, so kann man solches mit Vernunft nicht mißbilligen. Wenn man aber im Gegentheile überzeugt ist, daß den Glocken keine aus diesen Wirkungen zukömmt, sondern aus der Erfahrung sowohl als physikalischen Gründen beweisen kann. Daß sie den Strahl gegen die Gebäude, wo sie geläutet werden, hinglehen, so folget von selbst der natürliche Schluß, daß das Glockengeläut bey dem Hochgewitter nicht nur unnütz, sondern auch schädlich sey.

27.

Zu Verdünnung oder Zertheilung der Wolken, wird eine bestige und sehr schnelle Bewegung der Luft erfordert; nun aber ist

Regung der Corallen, und ob sie nicht die Ladung der Maschine verhindern: ich habe aber gar nichts besonders bemerken können, und die Maschine wurde geladen wie sonst, weder litt die geladene Maschine einigen Verlust an der electricischen Materie. Ich habe also schließen müssen, daß es ein purer Zufall gewesen, daß der Hagel die Felder nicht so lange getroffen habe, und daß die Ursache unmöglich von der Vergrabung eines Pfundes oder gar nur halben Pfundes Corallen (denn mehr gebrauchte er nicht dazu) habe herrühren können, und hätte man gar keine vergraben, so würde ganz gewiß auch das nemliche geschehen seyn. Vor ungefähr 16. Jahren erinnere ich mich einen heftigen Hagel in einer Gegend gesehen zu haben, und seit Deme weis ich, daß sich nichts dergleichen ereignet habe; und doch hat niemand in dieser Gegend Corallen vergraben. Es geschieht demnach zufälliger weise, daß es in einer Gegend ein, auch zwey und drey Jahre nach einander hagelt, und vielleicht nachhero zehn auch zwanzig Jahre aussetzt.

48.

Aus allen electricischen Versuchen ist es nun gewiß, daß nicht die Ladung der electricischen Maschine verhindere, oder die Materie in der geladenen vermindere, als was die Luft um die Maschine naß und feucht machen, oder was auf einige weise die Maschine mit andern Körpern verknüpft. Denn bey solchen Umständen kann sich die electricische Materie in der Maschine nicht verstärken, oder das Fluidum wird aus der Verstärkungsmaschine herausgezogen. Aus Betrachtung der Art und Weise, auf welche die Wolken geladen werden, ist es nicht minder gewiß, daß nichts die Ladung derselben verhindern könne, als eine Zerstreung des Gewölks, damit nemlich die Reibung der sulphurischen Theilchen aneinander, und heftige Gährung in den verdickerten Wolken verhindert werde; denn so lange die Theilchen nicht an einander dicht gedrückt werden, kann die Gährung auch nicht so

als anderswo. Nun aber da die Glocken geläutet werden, wird die nahe Luft bewegt, durch diese Bewegung werden die Feuertheilchen, so die wässerichten Dünste ausdehnen, heraus geworfen, und folglich werden die Wäsertheilchen zusammen kommen, daß auf solche Art die Luft um die Glocken herum, wässerichter als anderswo wird. Wenn nun eine Wolke, so mit electrischer Materie geladen ist, in der Nähe steht, so wird diese Materie von den um die Glocken stehenden Wäsertheilchen angezogen, wo sonst vielleicht diese Materie gar nicht in die untere Luft gefallen wäre. Da haben wir den zweyten Grund, aus welchem die traurige Erfahrungen von der Wirkung des Glockengeläuts bey einem Hochgewitter bewiesen werden. Es stimmt demnach die Erfahrung mit der Vernunft überein, daß das Glockengeläut bey dem Hochgewitter nicht nur allein unnütz, sondern auch schädlich, und mithin als ein Mißbrauch abzuschaffen sey.

33.

Das zweyte Mittel, so man zu Vertreibung des Hochgewitters anzuwenden pflegt, ist das abfeuern der Stücke. Ob aber dieses ein tüchtiges und nütliches Mittel sey, zu erforschen, wird meine gegenwärtige Beschäftigung seyn. Ich setze diesen Satz voraus, wenn das abfeuern der Stücke nützlich und tauglich ist die Wolken zu zerreiben, und zu zertheilen, so kann man solches als ein nütliches Mittel bey dem Hochgewitter anwenden, nun aber deucht mir, läßt es sich beweisen, daß das abfeuern der Stücke ein taugliches Mittel sey die Wolken zu zertheilen; derowegen sehe ich nicht, warum man solches bey einem Hochgewitter mit Nutzen nicht anwenden dürfte. Denn die Wolken zu zertheilen, wird eine starke Bewegung der Luft erfordert, und wenn man diese erhalten kann, so wird man bald dem Hochgewitter ein Ende machen, und dem daraus entstehenden Schaden, wo nicht gänzlich, doch größten Theils vorkommen, wie wir von der

Derlich wegen der minderen Verknüpfung der electricischen Materie in der unteren Luft mit dem electricischen Feuer in den Wolken. Denn in der künstlichen Electricitet, wird das electricische Fluidum in der Verstärkungsmaschine unmittelbar durch den Dratt mit dem Stücke verknüpft; in der natürlichen aber, oder in den Wolken, ist diese unmittelbare Verknüpfung nicht. Derowegen man auch nicht behaupten kann, daß die Flamme der loßgebrenten Stücke in Rücksicht auf die Verminderung des electricischen Feuers in den Wolken, einen besondern Nutzen haben könnte.

36.

Da demnach der Hauptnutzen des Gebrauches der Stücke bey dem Hochgewitter, in Hetung des Gleichgewichts und heftiger Bewegung der Luft besteht, so dürfte es nicht unnütz seyn, einige Regeln hier beyzusehen, wie und wann man sich der Stücke bey dem Hochgewitter gebrauchen sollte. Die erste Regel betrifft die Richtung, so die Stücke haben sollten: die Zweyte bestimmt den Zeitraum zwischen einem Schusse und dem andern; die Dritte zeugt zu welcher Zeit die Ablösung der Stücke den größten Nutzen haben möchte.

37.

Die Richtung der Stücke betreffend, ist außer allem Zweifel die flüglichsste, wenn sie gegen die Wolken selbst gerichtet werden, denn, weil der perpendicular-Stoß, oder was eines ist, der unter einem rechten Winkel auf den Gegenstand geschieht, der wirksamste, und stärkste ist; der Stoß aber, der in dieser Richtung der Stücke, auf die Wolken geschieht, perpendicular ist, so folgt der Schluß von selbst, daß diese angegebene Richtung auch die beste, und flüglichsste sey. Woraus folget, daß je näher die Wolken einer Gegend sind, desto höher auch die Stücke gerichtet werden müssen. Weil ferner
der

der Stoß auf die Luft, je weiter die Bewegung geschieht, desto mehr auch geschwächt wird, so folgt abermal der richtige Schluß, daß die Stücke, die an erhabenen Orten gestellt werden, eine weit größere Wirkung haben müssen, als wenn sie an niederen stehen.

38.

Den Zeitraum zwischen der Ablösung der Stücke zu bestimmen, muß man auf zwey Sachen acht haben; erstlich auf die Bewegung der Luft, zweitens auf die Weite der Wolken von der Erde. Man weiß aus den physikalischen Versuchen, daß die Luft in einer secund Minute beyläufig 1050 Pariser Schuhe bewegt werde. Es ist auch ferner bekannt, daß bey einem Hochgewitter, da die Wolken ohnehin schwer sind, die Perpendicular-Höhe derselben kaum eine Viertelstunde ausmacht, indem die Erfahrung lehret, daß sie oft die Spitze der Berge, welche diese Höhe haben, nicht einmal erreichen. Da denn eine Viertelstunde 3000. Schuhe enthält, so wird die auf der Erde bewegte Luft die Wolken, wenn sie senkrecht ober dem Kopfe sind, beyläufig in 3. secund Minuten erreichen. In diesem Falle demnach dürften wohl die Schüsse sehr schnell, und zwar alle drey bis vier secund Minuten wiederhollet werden, damit sobald die von ersten Schüsse bewegte Luft die Wolken erreichten, der Zweyte ansehe. Denn auf solche Art würden die von den Wolken zurückgeworfene Lufttheilchen mit denen, die auf ein neues von dem Stückschusse gegen die Wolken bewegt werden, zusammen stoßen, und also das Gleichgewicht der Luft bald gehoben werden, welches einen zerstreunden Wind erregen dürfte. Weil man aber zu schießen anfangen muß, ehe die Wolken unsere Gegend erreichen, und da sie noch etliche Stunde weit sind, so darf das Abfeuern der Stücke auch anfänglich nicht so schnell aufeinander gehen, doch immer schneller, je mehr sich die Wolken einer Gegend nähern.

Was endlich die Zeit betrifft, kann man drey Zeiträume setzen, in welchen man sich der Stücke bedienen könnte. Der Erste ist, da sich die Hochgewitter zu zeugen anfangen; doch da man aus vorhergehender Wärme geschwülliger Luft, und Herabfallung des Mercurium dem Wetterglase ein nahes Ungewitter wahrnehmen kann. Der zweyte Zeitraum ist, da sich die Hochgewitter ober dem Horizonte zeigen anfangen. Der Dritte ist endlich, da sich schon wirklich die Hochgewitter über eine Gegend ausgebreitet haben. Mich denkt aus folgendem Grunde, der erste Zeitraum könnte mit beträchtlichem Nutzen beobachtet werden. Denn durch die heftige Bewegung der Luft würden die Dünste an einander gestoßen, und die Feuertheilchen (welche sowohl die Dunstflügeln ausdehnen, und verleichteren, als auch diejenigen, welche zwischen diesen Kugeln liegen, und dieselben durch ihre elektrische Kraft von einander abhalten) heraus geworfen werden. So bald nun die Feuertheilchen herausgeworfen sind, müssen die Dünste ganz natürlich durch ihre anziehende Kraft voneinander kommen; solcher Gestalt werden die Dunstflügeln immer größer, bis sie endlich durch ihre natürliche Schwere zu fallen anfangen. Auf solche weise könnte man einen Regen erhalten, wodurch die Atmosphäre nach und nach gereinigt würde, ehe sie noch mit mehrern Dünsten angefüllt wurde, welche wenn sie durch ihre allzugroße Schwere zu fallen anfangen, und durch die von andern Gegenden herdringenden Wolken verdickt werden, einen schädlichen Mayregen, oder (wenn die erforderlichen Salmischen Theilchen in der Atmosphäre sind) einen noch schädlicheren Hagel verursachen könnten: eben dieses kommt mit den Erfahrungen überein, indem man erfährt, daß nach einem heftigen Schießen, der Himmel sich zum Regen zu richten pflege, wenn solches die Räume der Atmosphäre nicht verhindert. Es ist auch diese Erfahrung so gemein, daß man an einigen

Orten, wenn man einen schönen Tag verlangt, etliche Tage voraus schießt, um die Atmosphäre durch einen vorläufigen Regen zu reinigen. Wenn aber dieser Zeitraum vernachlässiget wird, können noch die Stücke eine nützliche Wirkung auf das Hochgewitter haben, da sie sich erst ober dem Horizon zu zeigen anfangen. Denn wenn man sie nach den eben zuvor angegebenen Regeln anwendet, mögen sie durch die heftige Bewegung der Luft die Wolken aufs wenigst in etwas zertheilen, und auf solche Art verursachen, daß das Hochgewitter weder so heftig sey, noch so lange daure, als es sonst gedauert hätte, und würde mithin den Schaden entweder verhintern, oder aufs wenigst vermindern: woraus folgt, daß man den Gebrauch dieser Maschinen nie so lange aufschieben sollte, bis sich das Hochgewitter schon wirklich über die Gegend ausgebreitet habe. Denn alsdann (wie es vor sich klar ist) kann der Schaden nicht mehr so leicht verhindert werden; und muß folglich immer größer seyn, als es gewesen wäre, wenn man bey Zeiten dieses Mittel angewendet hätte. Zudem daß man zu dieser Zeit dieses Mittel sehr schwer wegen des Regens oder Hagels anwenden kann.

40.

Was ich hier von den Stücken gesagt, ist gleicher Maßen von andern pyrotechnischen Maschinen zu verstehen, durch welche die Luft heftig bewegt, und dessen Gleichgewicht gehoben werden könnte, als da sind große Rargeten, welche, wenn sie aus Mörseren geschossen würden, eine große Höhe erreichen würden; Diese, wenn sie gleichsam in dem Gewölke selbst zersprängen könnten, natürlicher weise nicht ohne beträchtlicher Wirkung seyn, und ich weiß nicht, ob etwas tauglicher die Wolken zu zertheilen erfunden werden möchte, absonderlich wenn sie nahe sind.

5 h h 2

41.

41.

Ich bekenne zwar, daß es eine schwere Sache wäre, den Zeitpunkt zu errathen, wenn man diese Maschinen anfüglichsten anwenden sollte, daß auch dieses Mittel nicht geringen Unkosten unterworfen sey. Nichts desto weniger weil es unstreitig, nach allen physikalischen Gründen das tauglichste Mittel ist, so jemals erfunden worden. Das Gerodt zu zertheilen, so habe ich solches umständiglich anbringen wollen; und in der That, man kann von einem Naturkündigen nicht mehr fordern, als daß er aus vernünftigen Gründen beweise, was für Mittel schädlich, und was für eine nützlich seyn können. Dem auf solche Art wird man belehret, die untauglichen Mittel für ein und allemal zu unterlassen, und abzuschaffen, die tauglichen aber, wenn es die Noth erfordert, auch mit Mühe und Unkosten anzuwenden. Da ich dann die bishero angewendete Mittel die Hochgewitter zu vertreiben, durchforschet, und so viel nur möglich war, erklärt habe; muß ich endlich zur Beantwortung einer Hauptfrage mich begeben. Ob nemlich durch die electriche Maschine, oder aus den electricen Versuchen kein neues und leichteres Mittel, die Hochgewitter zu vertreiben erfunden werden könne.

Viertes Hauptstück,

Ob aus den electricen Versuchen ein neues Mittel die Hochgewitter abzutreiben erfunden werden könne.

42.

Da die electriche Materie gänzlich die nemliche mit dem Donnerstrahle ist (wie ich im zweyten Hauptstücke schon bewiesen habe) und die electriche Maschine eine Nachahmung einer Donnerwolke ist;
so

so dachte ich anfänglich, daß alles, was die electriche Materie in der Maschine vermindern würde, auch an den Wolken die nemliche Wirkung haben möchte. Aber nachdem ich die Sache etwas genauers betrachtet, und die Art und Weise, auf welche die Maschine sowohl als die Wolken geladen werden, überleget habe, so bin ich überzeugt, daß eben das, was die Materie in der Maschine vermindert, an den Wolken entweder keine Wirkung, oder gar eine widrige Wirkung haben würde. Die Sache läßt sich leicht begreifen, wenn man nur die Art und Weise, auf welche die Wolken und electriche Maschine geladen werden, betrachtet.

43.

Die electriche Maschine wird geladen, da durch eine heftige Reibung des gläsernen Cylinders die electriche Materie herausgetrieben wird, welche also gleich von dem Metalle angezogen, und durch einen Dratt ferner in die Verstärkungs-Maschine geleitet wird. Mithin die electriche Maschine laden, ist nichts anderes, als die aus dem geriebenen gläsernen Cylinders herausgetriebene Materie beysamme zu halten, daß sich selbe nicht gleich in andere Körper in gleichem Maaße ausgießt, sondern in einer Maschine condensiret werde. Weil man nun durch die Erfahrung weiß, daß dieses Fluidum nur von dem Metalle und Wasser angezogen, von Pech, Seiden &c. hingegen der weitere Ausfluß desselben verhindert werde, kann man leicht begreifen, warum diese Materie in einem mit Wasser oder Feilspäne angefüllten Gefäße (wenn dieses durch Seiden oder Pech von andern Körpern abgefondert ist) condensiret werde. Es ist auch leicht zu begreifen, warum die Maschine nicht leicht kann geladen werden, wenn die Luft naß ist, weil die naße Luft die electriche Materie aus der Maschine an sich zieht: mithin folget ganz natürlich, daß, so oft und wie immer die Luft um die Maschine naß wird, die electriche Materie in der Maschine sich bald verliere.

Nun wollen wir auch betrachten, wie die Wolken geladen werden. Da die schweflichten und wäßerichten Dünste sich in dicke Wolken versammeln, müssen durch die Bewegung der Luft die Theilchen selbst aneinander gerieben, und die Schweflichten durch die Wäßerichten aufgelöst werden. Durch die Reibung der Theilchen aneinander, und die innerliche Gährung werden die Feuertheilchen aus dem Schwefel herausgetrieben, und sogleich von den wäßerichten angezogen, bis endlich die ganze Wolke mit electrischer Materie angefüllt, und geladen wird. Hieraus kann man leicht ersehen, daß je mehrer Dünste in der Atmosphäre sind, und folglich je dicker die Wolken werden, desto stärker auch dieselbe angefüllt werden müssen, und mithin das ungewitter desto stärker und schädlicher seyn. Nun aber, wenn man naße und feuchte Körper anzünden sollte, und der Rauch in die Höhe gieng, müßen nothwendiger weise mit den wäßerichten auch viele schweflichte steigen. Diese würden ganz natürlich die Wolken noch dicker machen, und mithin dem Hochgewitter noch neue Nahrung geben, und folglich auch verursachen, daß dasselbe verstärkt, anstatt vermindert werde.

Ferner, wenn auch der Rauch feuchter Körper die nemliche Wirkung an dem Gewölke hätten, die er an der electrische Maschine hat, wer würde so viele Kräuter und feuchtes Holz finden, um so große Gegenden so oft zu beräuchern? den ein kleiner Rauch würde keine Wirkung haben. Was für ein Schade demnach möchte daraus auf einer andern Seite folgen? wer würde das Gestank so oft erdulden? es wäre in der That, wenn es auch bey den Wolken angienge, nur ein Mittel in den Gedanken, so man in die Uebung nicht bringen könnte. Da aber der Rauch, wie jetzt bewiesen worden, die nemliche

Wir-

Wirkung auf das Gewölke nicht haben kann, die er an der electrischen Maschine hat, so fällt die ganze Sache vor sich, und geht weder in der Uebung noch in der Theorie an.

46.

Was auch die Verminderung der electrischen Materie (so in der electrischen Maschine durch die Flamme des angezündeten Pulsers geschieht) betrifft; hat auch wenig oder gar nichts in Rücksicht auf das Gewölke zu bedeuten; indem diese Flamme nur die electrischen Theilchen, die um sie herum sind, an sich zieht: in den Wolken aber selbst wenig oder gar nicht dieses Fluidum vermindern kann, indem auch ein Donnerstrahl, der durch die untere Luft fährt, nur die in der untern Luft befindlichen electrischen Theilchen an sich zieht, keines wegs aber die übrigen Wolken selbst ausleeret, wie viel minder die Flamme des Pulsers, die bey weitem die nemliche Wirkung nicht hat an der electrischen Maschine, die ein solcher Strahl hat, wenn die Flamme des Pulsers auch die Maschine berührt? derowegen habe ich auch in dem vorigen Hauptstücke, da ich von den Stücken und Pyrotechnischen Maschinen, wodurch die Luft bewegt wird, handelte, denselben keinen besondern Nutzen in dieser Absicht zugeschrieben.

47.

Es versicherte mir ein guter Freund, er hätte einmal gelesen, daß, wenn man in den Feldern Corallen eingräbt, solche Felder vom Hagel frey wären, er hätte es auch versuchet, und erfahren, daß seit 10. Jahre, nachdem er nemlich Corallen jährlich in den Feldern zu vergraben pfleget, kein Hagel diese Felder getroffen hätte, da doch dieselbe vorherho öfters davon sind beschädiget worden. Ich machte demnach einen Versuch mit Corallen, um zu sehen, ob ich keine Veränderung in der electrischen Maschine wahrnehmen könnte, bey Auf-

legung

Regung der Corallen, und ob sie nicht die Ladung der Maschine verhindern: ich habe aber gar nichts besonders bemerken können, und die Maschine wurde geladen wie sonst, weder litt die geladene Maschine einigen Verlust an der electricischen Materie. Ich habe also schließen müssen, daß es ein purer Zufall gewesen, daß der Hagel die Felsen nicht so lange getroffen habe, und daß die Ursache unmöglich von der Vergrabung eines Pfundes oder gar nur halben Pfundes Corallen (denn mehr gebrauchte er nicht dazu) habe herrühren können, und hätte man gar keine vergraben, so würde ganz gewiß auch das nemliche geschehen seyn. Vor ungefähr 16. Jahren erinnere ich mich einen heftigen Hagel in einer Gegend gesehen zu haben, und seit Deme weis ich, daß sich nichts dergleichen ereignet habe; und doch hat niemand in dieser Gegend Corallen vergraben. Es geschieht demnach zufälliger weise, daß es in einer Gegend ein, auch zwey und drey Jahre nach einander hagelt, und vielleicht nachhero zehn auch zwanzig Jahre aussetzt.

48.

Aus allen electricischen Versuchen ist es nun gewiß, daß nicht die Ladung der electricischen Maschine verhindere, oder die Materie in der geladenen vermindere, als was die Luft um die Maschine naß und feucht machen, oder was auf einige weise die Maschine mit andern Körpern verknüpft. Denn bey solchen Umständen kann sich die electricische Materie in der Maschine nicht verstärken, oder das Fluidum wird aus der Verstärkungsmaschine herausgezogen. Aus Betrachtung der Art und Weise, auf welche die Wolken geladen werden, ist es nicht minder gewiß, daß nichts die Ladung derselben verhindern könne, als eine Zerstreuung des Gewölks, damit nemlich die Reibung der sulphurischen Theilchen aneinander, und heftige Gährung in den verdickerten Wolken verhindert werde; denn so lange die Theilchen nicht an einander dicht gedrückt werden, kann die Gährung auch nicht
so

Wirkung auf das Gewölke nicht haben kann, die er an der electrischen Maschine hat, so fällt die ganze Sache vor sich, und geht weder in der Uebung noch in der Theorie an.

46.

Was auch die Verminderung der electrischen Materie (so in der electrischen Maschine durch die Flamme des angezündeten Puffers geschieht) betrifft; hat auch wenig oder gar nichts in Rücksicht auf das Gewölke zu bedeuten; indem diese Flamme nur die electrischen Theilchen, die um sie herum sind, an sich zieht: in den Wolken aber selbst wenig oder gar nicht dieses Fluidum vermindern kann, indem auch ein Donnerstrahl, der durch die untere Luft fährt, nur die in der unteren Luft befindlichen electrischen Theilchen an sich zieht, keines wegs aber die übrigen Wolken selbst ausleeret, wie viel minder die Flamme des Puffers, die bey weitem die nemliche Wirkung nicht hat an der electrischen Maschine, die ein solcher Strahl hat, wenn die Flamme des Puffers auch die Maschine berührt? derowegen habe ich auch in dem vorigen Hauptstücke, da ich von den Stücken und Pyrotechnischen Maschinen, wodurch die Luft bewegeet wird, handelte, denselben keinen besondern Nutzen in dieser Absicht zugeschrieben.

47.

Es versicherte mir ein guter Freund, er hätte einmal gelesen, daß, wenn man in den Feldern Corallen eingräbt, solche Felder vom Hagel frey wären, er hätte es auch versuchet, und erfahren, daß seit 10. Jahre, nachdem er nemlich Corallen jährlich in den Feldern zu vergraben pfleget, kein Hagel diese Felder getroffen hätte, da doch dieselbe vorher öfters davon sind beschädiget worden. Ich machte demnach einen Versuch mit Corallen, um zu sehen, ob ich keine Veränderung in der electrischen Maschine wahrnehmen könnte, bey Auflegung


7 bis 8. Schuhe über das Haus hervorsehen, sonst kann es leicht geschehen, daß das Dach beschädiget werde; und wenn sie nicht in einem Stücke von oben bis unten herab geht, so muß sie nicht auf Kettenart in einander gehenket, sondern durch Schrauben aneinander gesetzt werden. Denn man hat von der Erfahrung, daß die Stangen, die durch Glieder in einander gekettet sind, durch den Strahl an dem Orte, wo die Glieder einander fassen, entweder geschmolzen, oder auseinander geschlagen und zertrennet worden. Ferners muß sie so weit in die Erde geführt werden, bis man auf Wasser kömmt, sonst wird der Strahl entweder zurück schlagen, oder in der Erde an dem Ende der Stange herumwühlen, und das Fundament des Gebäudes beschädigen. Es sollte auch die Oberfläche der Erde, wo die Stange eintritt, so trocken als möglich erhalten werden: widrigenfalls wird sich der Strahl, wenn er an die naße Erde kömmt, an den Wassertheilchen 6 bis 7. Schuhe herum verpufen, dieselbe in elastische Dünste zerstreuen, und unfehlbar das Fundament des Hauses beschädigen. Herr Franklin führet ein Beyspiel einer fehlerhaften Stange an. Es ragte die Stange nicht mehr als vierthalb bis 4. Schuhe über das Haus, wurde an der Mauer heruntergeführt nur 3 bis 4. Schuhe in die Erde, wo sie noch kein Wasser hatte, die Stange aber selbst wurde durch Glieder aneinander gekettet. Gegen diese Stange fährt der Strahl, beschädiget die Mauer von oben, schlägt da und dort im heruntersfahren einige Steine aus der Mauer, und beschädiget den Grund des Gebäudes. Ein Diener des Hauses saß neben der Mauer von innen, wo die Stange von außen herunter gieng: dieser bekam einen starken Schlag, da der Strahl herunter fuhr, und die Stange selbst wurde auseinander geschlagen, wo die Glieder einander fasseten. Diese fehlerhafte Stange konnte keine andere Wirkung haben, denn sie war erstlich nicht hoch genug, mithin mußte die von dem Strahle (so durch die allzu

wen

wenige Erhöhung der Stange zu nahe an dem Gebäude kam) ausgedehnte Luft natürlicher Weise die Spitze des Hauses beschädigen. Zweytens wurde sie zu nahe an der Mauer heruntergeführt, mithin mußte die ausgedehnte Luft nothwendiger Weise eine starke Erschütterung in der Mauer verursachen, und wo Riße waren, auch Stücke von Steinen herausreißen. Der Stoß, den der Diener bekam, war entweder eine Wirkung der erschütterten Mauer, oder ein Stoß des electrischen Feuers, welches sich natürlicher Weise einige Schuhe weit um die Stange aus wenigst in einem geringeren Grade ausdehnet. Drittens war der Dratt durch Glieder auf Kettenart in einander gehängt; mithin wo ein Glied das andere faßete, wurde die Stätige Verknüpfung auf einige Art abgebrochen, und die Richtung des Strahles durch die Spitzen der Glieder in der Kette einiger Massen geändert. Mithin wurde der dicke Dratt, oder vielmehr die eiserne Stange bey den Gliedern zerschmolzen, und auseinander gerissen. Viertens gieng die Stange nicht weit genug in die Erde, also breitete sich das electrische Feuer viele Schuhe um das Ende der Stange in die nahe Erde, und erschütterte den Grund des Gebäudes. Hier haben wir an einer Stange die Hauptfehler, und in einem Donner- schlage den Beweis der Wirkung dieser Fehler. Uebrigens belehret uns Hr. Franklin, daß seit zehn Jahren, so lange man nemlich sich dieser Stangen in America bedienet hat, kein einziges Gebäude, so mit einer Stange versehen war, von dem Strahle getroffen worden, sondern daß der Strahl jederzeit unfehlbar der Stange zugefahren sey; da doch viele hundert andere Häuser, die nicht mit der Stange versehen waren, durch den Strahl in die Asche gelegt worden. Wenn demnach an den Thürmen und andern großen Gebäuden regelmäßige Stangen aufgesteckt, und in die Erde herabgeführt würden, könnte man einen großen Schaden mit wenigen unkosten verhindern, und würde die Wirkung des Hochgewitters wenigstens in Rücksicht auf den Strahl gehemmet werden.

51.

Ich habe nun die Versuche angebracht, wodurch die electrische Materie in der künstlichen Electricitet vermindert, und die Ladung der electrischen Maschine verhindert wird: ich habe auch die Natur und Wirkungen des Hochgewitters, so viel mir möglich war, erklärt, die bishero angewendete Mittel untersucht, und in so weit man nach allen natürlichen Gründen die schädliche Wirkung des Hochgewitters ableiten kann, habe ich bewiesen. Ob aber meine Schlüsse nach den Gesetzen der Vernunftlehre richtig fortgehen, überlasse ich, dem Urtheile der Gelehrten, und hoffe, sie werden erkennen, daß, wenn ich die Wahrheit selbst nicht erreicht, doch aufs wenigst mich befließen habe, aus wahren Gründen richtige Schlüsse zu machen.



Johann Helfenrieder,
Professor der Mathematick in Ingolstadt;
Beantwortung


der

Preiß = Frage,

Welche ist die leichteste, und wohlfeilste Art von
Dämerbau, wodurch der Einbruch, oder vielmehr der Aus-
tritt eines Flusses aus seinen Ufern verhindert wird: und er nach der
verlangten Directions-Linie geleitet, oder in derselben er-
halten werden kann.

**Legem ponebat agvis, ne transirent Fines
ivos.**

Prov. VIII. Vers. XXIX.



I.

Wenn jemal eine wichtige Frage von einer gelehrten Gesellschaft ist aufgeworfen worden, so ist gewiß die für dieses Jahr von der philosophischen Classe der Churbairischen Akademie vorgelegte Preisfrage eine derselben. Sollte sie nicht selbst wegen ihrer Wichtigkeit allen denen, welche Menschenliebe, und Kenntniß des Wasserbaues besitzen, Lust machen: sich daran zu wagen, nicht fast den Preis zu erwerben, als dem allgemeinen Nutzen damit zu dienen? gewiß die Schäden, welche die Flüsse durch dem Austritt aus ihren Ufern, und beständige Aenderungen derselben verursachen, sind allgemein, daß man fast allenthalben beständige Klagen darwider hört. Thun uns gleich die Flüsse sehr gute Dienste, so sind sie doch auch unsern Landgütern, und bisweilen auch Gärten, und Häusern sehr gefährliche Nachbarn. Der Nutz sowohl, als der Schaden, von den Flüssen kommt, zwingen uns den Wasserbau als einem der allerwichtigsten anzusehen. Und er ist es auch, theils wegen des Nutzens, denn er verschaffen kann, theils weil kein Bau so kostbar, so

so schwer, und so gefährlich ist, als eben dieser. Ob sich gleich große Gelehrte viel Mühe gegeben haben, auch diesen Theil der Baukunst in Regeln zu bringen, so erlecken selbe doch nicht in jedem Falle, wie man die Sache angehen soll, eine sichere Entscheidung zu geben. Das Meiste wird fast immer der Klugheit des Baumeisters überlassen, der vielmal nach einem ungewissen Gutachten handelt, und manchemal auch etwas wagen muß. Der größte Fehler, den man auch jetzt noch beim Wasserbau zu begehen pfleget, ist, daß man gemeinlich zu frieden ist, auf eine Zeit zu helfen, und nicht so dauerhafte Werke ansetzt, als nöthig wäre, uns beständig wider die Anfälle des Wassers zu schützen. Es ist zwar wahr, daß öfters solche Werke die Kräfte der Gemeinde übersteigen, welche dem Bau bezahlen soll; doch geschieht dieser Fehler auch oft aus einer Leichtsinigkeit, da wir nicht genug erwägen, daß eben jene die theuerste Art zu bauen sey, bey der man immer zu bauen hat; ich werde mich deswegen bemühen vielmehr solche Werke vorzuschlagen, welche, obwohl sie Anfangs nicht gar zu wohlfeil sind, doch ins künftige, weil sie dauerhaft sind, wenig oder nichts mehr kosten; als lichterliche, welche man zwar Anfangs leicht erbauet, die aber ihre beständige Unterhaltung nur gar zu kostbar macht.

2.

Ein anderer vielleicht, eben so wichtiger Fehler ist, daß man gar oft, da man nicht alles thun kann, nichts thut; es würde oft nicht so beschwerlich seyn, ein zimliches Stück Landes von Ueberschwemmungen zu bewahren, ob es gleich die größte Beschwerniß hat, alles zu retten. Ich werde mir es aber sonderlich angelegen seyn lassen, zu zeigen, in welchen Fällen, und wie man besondere Stücke mit geringem Aufwand von den Ueberschwemmungen, entweder vor allem, oder wenigst von den gewöhnlichsten, und meisten bestreuen könne; denn, daß man in solchen Fällen zu helfen unterlasse, ist, so wie ich

Ichs vermuthet, mehr einer Unwissenheit, als einer Nachlässigkeit zuzuschreiben. Der Schaden, den dergleichen Ueberschweemmungen an einigen Orten fast jährlich verursachen, ist ja wichtig genug, daß wir Fleiß anwenden, uns zu bewahren; denn sie rauben uns bisweilen, da sie uns eben im Schritte überfallen, die Früchten eines ganzen Jahres, und wie oft entführen sie uns nicht das schon gemähte Heu, ehe es in die Scheune geführt worden; oder wie oft wickeln sie nicht selbes, da es noch ungeschnitten steht, in so viel Koth, und Letten ein, daß es nimmer zu gebrauchen ist?

3.

Kann man aber die umliegenden Felder mit geringem Aufwande der Ueberschweemmung entreißen, kann man einem Flusse den Austritt, wenigst über die weitere Ufern ganz verbiethen, so ist es desto besser. Wir werden jetzt gleich sehen, was sich thun läßt, und was ohne Gefahr und Schaden, und ohne größere Unkosten ins Werke zu setzen möglich ist, da wir den ersten Theil der vorgelegten Frage; wie nemlich der Austritt eines Flusses aus seinem Ufer zu verhindern sey, erörtern werden. Sind wir mit diesem fertig, so wird der andere Theil zeigen, wie ein Fluß nach der verlangten Directionslinie zu leiten, oder in selber zu erhalten sey.

4.

Es ist eine immer gefährliche, und zimlich kostbare Unternehmung, wenn man einen Fluß (sonderbar jenen, der zu gewissen Zeiten mächtig anwächst) in ein gar zu enges Rinnsaal, mit beyderseits (wenn das Land eben ist) oder nur auf einer Seite (da die andere, so höher liegt, oder sich vom Ufer an immer mehr und mehr erhöht, schon von Natur beschützt ist) an seinen Ufern angelegten Werken anzuschließen sucht. Jenes Wasser, das des geschmolzenen Schnees,

oder mächtig anhaltenden Regens wegen von dem umliegenden Hügel, und Bergen fließt, und sich in dem Fluß ergießet, muß nothwendig ablaufen können; je enger wir nur den Rinnſaal des Fluſſes machen, oder je weniger wir ihn erweitern, deſto minder kann eben eine ſolche Menge Waſſers in gegebner Zeit durchkommen, ohne daß wir es, ſich aufzubäumen, und zu erhöhen zwingen. Bauen wir ſolche Werke nächſt an den Ufern, welche dem Waſſer, ſo ſelbe nicht überſteigen kann, den Austritt verſchließen, ſo ſchützen wir zwar dadurch unfere daran gelegne Güter; und bisweilen (wenn nämlich nur ein kurzer Strich des Fluſſes von einem Hügel zu einem andern, zwiſchen welchem ſonſt der Fluß austreten würde, alſo zu bewahren iſt) könnte zwar ein ſolche Defenſionslinie wider dieſe Feind ohne größere Abſten gezogen werden, allein, wir mehrten eben auf dieſe Weiſe ſeine Kräfte, und wenn er ſie auch gleich vergeblich wider das ſo beſchützte Land ausübt, ſo zwingen wir ihn dennoch anderswo mit deſto größerem Gewalt, und Wüthem auszubrechen, und bisweilen weit mehr Schaden dort anzurichten, als wir bey uns verhütet haben. Es ſind deßwegen jene Geſetze nicht unbillig, die wider das Austreten eines Fluſſes an gewiſſen Orten vorzubauen verbiethen, weil man weiß, daß durch eben dieſes noch größere Schäden an andern Orten verursacht werden. Denn durch ſolchem Vorbau quellen wir das Waſſer, und eben deßwegen kann es nur gar zu leicht geſchehen, daß es ober dieſem Vorbaue austreten, und vielleicht weit umher ergießen muß; da es doch im Gegentheile, wenn es wäre frey geſaßen worden, das Geſtad nicht überſtiegen hätte, oder doch nicht weit würde ausgetreten ſeyn. Unter dem Vorbaue wird eben dieſes Unheil zu befürchten ſeyn. Es iſt zwar billig, daß jeder zu erſt für ſich ſorge, und dem Feind von ſeinem Lande abzutreiben ſuche; doch es muß auch nicht mit gar zu großem Schaden anderer Leute geſchehen, abſonderlich wenn er ohne größerem Nachtheile deſſen, der ihn durch ſeine Schutzwehre verursachen will, kann verhütet werden. Derwegen
muß

müß ein solcher Eigenthümer seinem Landesherrn, der ein allgemeiner Vater seiner Unterthanen ist, keineswegs zur Schuld legen, daß man ihm auf eine solche Weise sein Gut zu schützen nicht gestatte.

5.

Wir müssen aber, um die Sache nun begreiflicher zu machen, ein Beispiel so einer schädlichen Gegenwehre wider dem Flusse in einer Figur vorstellen. Fig. 1. Es sey MN der Fluß in seinem natürlichen Ufern, mm , und nn aber seyen seine Gränzen, wenn er hoch anwächst, die er aber doch gemeiniglich nicht übersteiget, außer daß er zwischen dem Hügeln F und G bey DD hineinbricht, und dort ein großes Stücke Landes überschwemmet. Nun gesetzt, der Herr des hinter DD gelegen, und bis an den Fluß sich erstreckenden Landes, wollte selbes gänzlich von der Uberschwemmung zu befreien mit einem bis an dem Fluß sich erstreckenden Walle $D'E D''$ umgeben, der sich an die Hügel G und F anschloße, so würde zwar dadurch sein Land von der Uberschwemmung (wenn je der Wall stark und hoch genug ist) auf lange, oder ewige Zeiten bewahret seyn; allein würden nicht noch weit größere Uebel für die oben und unten an dem Flusse gelegenen Güter daraus entstehen? Ja der enge Paß zwischen E und H würde das Wasser sich zu erhöhen zwingen; denn, ohne daß es sich erhöhe, ist es nicht möglich, daß eben so viel durch einen engeren, als weiten Weg ablaufe. Da es sich aber erhöht, drückt es dem vom M herablaufenden Wasser entgegen, und zwingt auch dieses sich weiter auszugießen, als es geschehen würde, wenn der Paß vor H bis $D. D'$ offen geblieben wäre. Gesezt nun, das Wasser, welches sonst nur bis nn und auf der andern Seite nur bis mm austreten würde, wenn es diese Gränzen übersteiget, findet bey B und K ein tiefes oder wenigst ganz ebenes Land, so wird alles bey B und K bis an H hin (ich setze H sey ein Hügel) überschwemmet; und es kann geschehen, daß sich die Uberschwemmung, wenn nemlich ebener Boden weiter

herum zu finden ist, sehr weit verbreite, da man doch allezeit von selber wäre befreit geblieben, wenn das Wasser durch den Damm $D'E$ nicht wäre eingeschränket worden.

6.

Aber auch unter dem eingeschränkten Pässe kann eine solche Einschränkung Schaden anrichten; denn obwohl sie die Geschwindigkeit des Wassers in etwas mehret, so wird doch das Wasser auch unter diesem Pässe wenigst auf eine ziemliche Breite höher seyn, als es wäre, wenn er in seinem freyen Laufe nicht wäre gehemmet worden. Es wird etwan bey P eine kleine Anhöhe übersteigen, und sich in ein tiefes Land A ergießen, und wenn es keinen Ausgang findet, einen kleinen Bepfer, oder See machen, ob gleich das dem Meer nähere, und höhere Land L gähling noch darüber heraus sieht. Ist dem Schaden, der ein so unbescheidner Wasserbau andern verursacht, wird er auch selbst demjenigen, der seinen, sein Gut zu schützen, angeleget hat, vielleicht mehr Kosten machen, als er ihm Nutzen bringt. Legte dieser Eigenthümer das Werk nach der Linie $D' C D'$ an, so würde zwar der kleine Pass $D' C D' E D'$ bey der Ueberschwemmung unter Wasser gesetzt, doch weil dem Flusse sein freyer Lauf gelassen wird, so wird auch sein Vermögen wider diesen Wall nicht vermehrt; er darf bey weitem so stark nicht seyn, als er seyn muß, wenn er von D' gegen E bis D'' geführt wird, denn in solchem Falle, hat er von D' bis E , da er sich dem Laufe des Stromes entgegen setzt, und noch dazu desselben Gewalt durch die Aufquellung ist vermehret worden, sehr viel mehr auszustehen, als ein nach der Richtung $D' E D''$ geführter Damm.

7.

Da wir jetzt den Schaden gezeigt haben, den ein anzunehmendes

an

an einem Flusse aufgeworfner Wall um seine Güter vom Einflusse des Wassers zu bewahren, bey gewissen Umständen anrichten kann, so ergiebt sich von sich selbst ein Vortheil, welcher in gewissen Fällen den Austritt des Flusses zu verhindern, oder wenigst zu verschaffen, daß er nicht zu viel des Landes überschwemme, dienen kann.

Es sey wieder *MN* der Fluß, und das umliegende Land wieder das nemliche, welches wir im vorigen Falle zum Beispiele angenommen haben, nur mit dem Unterschiede, daß *D' E D''* nicht ein mit Fleiße gemachter Wall, sondern ein natürlicher Hügel sey, der dem Fluß zwischen *E* und *H* einschränket. Ich sage, man wird in solchem Falle die Ueberschwemmung hemmen; man wird die Wiesen, und Felder *A, B,* und *K* manchesmal davon befreien, da sie ihr doch sonst nicht entgangen wären, wenn man dem Flusse bey *E* Platz macht, man reiße also diesen natürlichen Damm nieder, man lege von dem weggehauenen Erdreiche einen andern *D' C D''* an, wenn es je die Umstände heischen, um das dahinter liegende Land zu bewahren, damit der Fluß freyen Platz habe, seinen Strom, wenn er mächtig anwächst, zu erweitern, so wird das Wasser geschwinder ablaufen können; es wird sich auch, weil es anders nicht aufgehalten wird, keineswegs so sehr erhöhen, noch so viel Unheil ins künftige anrichten, als es würde gethan haben, wenn sein Lauf, so oft er nur immer wachsen sollte, allezeit gehindert wurde.

8.

Es ist eine recht wichtige Sache, die wohl zu merken ist; daß man sich alle Mühe gebe, sowohl den Austritt des Flusses zu hindern, oder doch zu vermindern, als ihn in seiner Directionslinie zu erhalten, oder nach einer verlangten zu richten; ihm ein zimlich gleiches Rinnsaal zu geben, und alles, was ihm in seinem Laufe im Wege steht, so viel es ohne große Kosten seyn kann, auszuräumen. Dies

ses Austräumen, das in gewissen Fällen mit wenigen Kosten geschehen könnte, würde oft vielmehr nützen, als die an den Ufern gemachte Wälle.

9.

Das vom Regen, und Schnee gesammelte Wasser muß ablaufen können, wir mögen es machen, wie wir wollen. Je geschwin-
der es ablaufen kann, je weniger Schaden wird es verursachen, da-
rum muß man sich angelegen seyn lassen, die Geschwindigkeit des Flu-
ßes (doch ohne ihn mehr, zu quellen) zu vermehren; und man muß
ihm auch ein zünftig weites, und so viel es seyn kann, gleich weites
Rinnsaal verschaffen; oder vielmehr ein solches, das der Schnelligkeit,
und Menge des Wassers, so in ihm ablaufen muß, proportionirt ist.
Wo der Abhang größer, und darum der Lauf des Flusses schneller
ist, da darf auch daß Rinnsaal etwas enger seyn, als wo der Ab-
hang geringer, und der Lauf des Wassers langsamer ist. Doch muß
man es nicht so verstehen, als ob die Weite des Rinnsaales dem Ab-
hange allein proportionirt seyn müsse; denn die durch den Fall erhal-
tene Schnelligkeit dauret auch unter dem Anhange. Das Wasser ver-
liethet diese Geschwindigkeit erst nach und nach, da die durch den Fall
erhaltene Gewalt endlich durch die große Menge der Hinternisse, die
dem Laufe des Wassers entgegen stehn, endlich verschlungen wird.
Man hat derowegen wohl Ursache, auch die Geschwindigkeit des
Wassers an verschiedenen Orten des Flusses zu untersuchen.

10.

Das vom Herrn Pitot erfundene, und in den Abhandlungen
der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris, auf das Jahr
1732. beschriebene Instrument, mag hier am dienlichsten seyn; * es
be-

(*) Description d'une Machine pour mesurer la vitesse des Eaux
courantes, & le Sillage des Vaisseaux, par M. Pitot,

bestehet solches hauptsächlich in zweyen Röhren, (Fig. 2.) welche beyde an ihrem Enden offen sind; sie können entweder ganz vom Glase, oder unten vom Eisenbleche, oder Kupfer gemacht, und gläserne Röhre oben darein eingeküttet seyn. Ihre Länge hängt von der Tiefe ab, in die man sie versenken will. Denn, wie wir gleich sehen werden, man senket sie an ein langes dreyeckiges Prisma *M* angeheftet in den Fluß hinein, die Schnelligkeit des Flusses in selben an verschiedenen Orten zu entdecken. Eines dieser Röhre *FD* ist bey *D* recht winkelförmig umgebogen; der umgebogene Theil aber *DE*, dem Bellidor eine trichterförmige Gestalt zueignet, wird gegen den Strom gewendet; senket man nun diese zwey nebeneinander an das Prisma *M* befestigte Röhre in verticaler Stellung in ein stillstehendes Wasser; so steigt es in beyden gleich hoch, so hoch nemlich, als das Wasser selbst außer ihnen steht, (doch wegen der anziehenden Kraft des Wassers, wenn die Röhre nicht weit genug sind, ein wenig höher; man soll sie aber nicht so eng machen.) Läßt man sie aber in einen Fluß hinein, und wendet den Theil *DE* gegen den Strom, so steigt das Wasser in selben Röhre höher, als in dem Röhre *AB*, und zwar so viel, als größer die Geschwindigkeit des Stromes ist. Es ist aber leicht, den Theil *DE* gerade dem Strom entgegen zu richten; man wende nur das Instrument so lange um, bis das Wasser in dem Röhre *DE* zu seiner größten Höhe gestiegen ist, und so ist *DE* schon gegen dem Strom gerichtet, denn in jeder anderer Stellung steht es tiefer, und zwar, wenn es zur Seite gegen den Lauf des Stromes recht winkelförmig gerichtet ist, so steht das Wasser darinn nicht höher, als es außerhalb der Röhre im Fluße steht. Die Ursache, warum das Wasser in dem Röhre *DE* in solchem Falle steigt, und wie aus dieser Höhe die Geschwindigkeit des Wassers, so auf *DE* zufließet, zu messen sey, müssen die, so in der Hydraulick unterrichtet sind, ganz leicht begreifen. Denn sie wissen, daß, wenn in einen mit Wasser gefüllten Geschier zur Seite ein Loch eröffnet wird, die an-

fän

künftige Schnelligkeit des herausdringenden Wassers, der Höhe dessen, so ober dem Loche ist, so proportionirt sey, daß sich diese Geschwindigkeit in verschiedenen Höhen, wie die Quadratwurzeln der Höhen befinde. Also zum Beispiele, wenn diese Geschwindigkeit noch so groß werden soll, als sie ist, so muß das Wasser viermal höher ober dem Loche stehn. Nun muß das Wasser des Stromes, so durch die Röhre oder dem Trichter ED hinein dringet, sich in dem Rohre DC so weit erheben, bis seine Schwere dem Drucke des unten hindringenden Wassers bey E das Gleichgewicht halten kann; bis nemlich das in dem Rohre stehende Wasser (wenn es nicht von dem ihm entgegen fließenden gehindert wäre) mit eben der Geschwindigkeit heraus laufen würde, mit der der Strom jetzt ihm entgegen läuft: folglich läßt sich aus der Höhe des in dem Rohre DC stehenden Wassers die Schnelligkeit des entgegen fließenden bestimmen. Es fällt auch von sich selbst ins Auge, daß man die Bestimmung dieser Geschwindigkeit nicht aus der ganzen Höhe, des in das Rohre DC erhebeten Wassers, sondern nur aus der, die es über die Oberfläche des Flusses hat, machen muß. Denn so hoch das Wasser im Fluße ist, eben so hoch würde es in diesem darcin gesenkten Rohre stehn, wenn auch das Wasser ohne Bewegung im Fluße steht. In dieser Höhe wird es bey E nicht vom entgegen strömenden Wasser durch dessen eignen Laufe erhalten, sondern durch seinen Druck, den es vom ober ihm fließenden Wasser hat. So wird dann nur die übrige Höhe durch die Schnelligkeit seiner Bewegung erhalten. Es sey; B. das Rohre CD bis m in dem Fluß eingesenkt, und das Wasser stehe in der Röhre bey n ; so ist mn die Höhe, durch welche man die Schnelligkeit des Stromes auf folgende Weise bestimmt. Man sagt, was die Quadrat-Wurzel von 15. Pariser Schuhen, einem Zoll, und zweyen Linien, zur Quadrat-Wurzel von mn für ein Verhältniß hat; eben das hat die Länge von 30. Schuhen, zweyen Zollen, 4. Linien zur Länge des Weges, dem das Wasser des Stromes, mit der

G*

Geſchwindigkeit, mit welcher es bey *E* läuft, in einer Secunde durchläuft. Der Grund dieſer Regel ruht auf jenem Verſuchen, die uns lehren, daß ein ohne Hinderniß fallender Körper in einer Secunde 16. Schuh, 1. Zoll, und 700 Linien tief herabfällt; und auf der Theorie der Mechanick, die uns belehret, daß der Körper am Ende des Falles eben ſo viel Schnelligkeit beſitzt, daß er mit ſelber in gleichem Räume eben noch ſo viel des Weges ohne Hinderniß durchlaufen werde.

Auf dieſe Regel nun ſtehet ſich die Tabelle, ſo ſich in Bellin's Architectura Hydraulica P. I. L. 1. c. 3. 2. Abtheil. befindet jene aber die Pitot ſelbſt ſeiner Abhandlung beugeſetzt hat, nimmt an Fall der Körper in einer Secunde nur 14. Schuhe hoch an, damit giebt ſie zu wenig Geſchwindigkeit für die beugeſetzten Höhen. Damit man die Höhe des Waſſers in dem Rohre *CD*, und zugleich auch die damit verknüpfte Geſchwindigkeit deſſelben bequemer meſſen könne, richtet ſich Pitot eine doppelte Scale *N*, die man über das Röhren *M* anſtecken, an ſelben auf und nieder ſchieben, und mit Stellschrauben in einer beliebigen Höhe feſt ſetzen kann. Die völlige Beschreibung des Instruments mag man in des Autors Abhandlung ſelbſt ſehen.

• II.

Mit dieſem Instrumente nun iſt es ganz leicht, die Schnelligkeit des Waſſers zu unterſuchen. Man weiß es wohl, daß eben ſo im nemlichen Durchſchnitte des Rinnſaales an verſchiedenen Orten ſehr verſchieden ſey. Langſamer fließt das Waſſer an der Seite, als an dem Boden, als in der Mitte, weil die hervorragenden Seiten an die es anſtößt, ſelbem immer einen Theil ſeiner Kraft benehmen.

Viele Flüsse, und zwar am meisten jene, die minder tief sind, haben ihre größte Geschwindigkeit auf der Oberfläche in der Mitte des Stromes; in andern aber fließt das etwelche Schuh tiefere Wasser schneller, dann das Oberste, von welchem wir die ächte Ursache bald zeigen werden. Bilde man sich jezo ein, der Durchschnitt des Rinnsaales (Fig. 3.) des Flusses sey durch senkrechte, und horizontale Linien, die einander durchkreuzen, getheilet, so kann man in jedem Theile die Geschwindigkeit des Wassers mit diesem Instrumente erforschen, und also durch Ausmessung dieser Theile, und durch die Rechnung finden, wie viel des Wassers in dem gegebenen Zeitraum dorbey fließt; man sieht, wie viel man das Rinnsaal, wenn es an einem Orte etwan zu enge ist, erweitern soll, damit das Wasser, so durch selbes ablaufen muß, geschwinder durchfließen könne. Man muß zwar keineswegs gedenken, daß das Wasser ein erweiterten Rinnsaal mit eben der Geschwindigkeit, als in dem engeren Fließen werde; nein! denn in dem engeren war es mehr gequellert, doch kann man einigermaßen eine Schätzung darüber machen; denn auf genaue Ausmessung kommt es hier gar nicht an, und es würde sehr beschwerlich seyn, schon vorhin genau zu bestimmen, wie schnell das Wasser im weiteren Rinnsaale laufen wird, weil eben nicht so leicht zu bestimmen ist, wie viel die Wasserhöhe, und also auch die Geschwindigkeit desselben durch die Erweiterung des Rinnsaales, wobey verschiedene Nebendinge ihren Einfluß haben, abnehmen werde. Ich rede aber hier hauptsächlich nur von dem Rinnsaale des Flusses, da er groß, und angeschwollen ist, und eben ober dem Orte, an welchem er erweitert werden soll, austritt, oder auszutreten bereitet ist, denn dieser muß erweitert werden, um den Austritt Schranken zu setzen. Ich behaupte auch keineswegs, daß es allezeit die Noth erfordere, mit dem gemeldten Instrumente zuvor die Geschwindigkeit des Laufes, an dem Orte des Rinns

Dritten Kapitel finden. Daß es aber sehr nützlich sey, diesen Stoß zu wissen, kann man leicht daraus erachten, weil die Stärke der Werke, die man ihm entgegen setzt, nach der Größe dieser Lasten eingerichtet seyn muß, und wenn es gleich nicht allzeit nöthig ist, die Stärke des Anstoßes des Wassers genau zu wissen, so stoßen dennoch manchmal dergleichen Fälle auf, in welchem dieses Kenntniß wenigstens sehr nützlich ist, damit man nicht entweder stärkere Werke, als nöthig sind, mit großen Kosten anlege; oder im Gegentheile nur gar zu schwache, die der Gewalt des Stoßes unterliegen. Die Einmündung, so man dawider machte, und die in des gelehrten Jesuiten P. Lechi in welscher Sprache geschriebenen Hydrostatick zu finden ist, ist folgende: „ Es „ ist gewiß, daß das Wasser auf der Oberfläche wenigst der tiefern „ Flüße als zum Beyspiel der Po ist, nicht so schnell laufe, als es in „ tiefern Orten läuft. Die Theorie und die Erfahrung zeigen es ein- „ stimmig, denn da das tiefere Wasser vom darauffliegenden gedrückt „ wird, muß nothwendig durch diesem Drucke seine Schnellig- „ keit für sich selbst vermehret werden; und diese Vermehrung, wenn „ der Fluß sehr tief ist, daß der Widerstand, den das Wasser auf „ dem Boden findet, die durch den Drucke vermehrte Geschwindig- „ keit, nicht durchaus vertilget, muß endlich auch merklich werden. „ Die Versuche aber, die man mit dem Quadranten, und der Ku- „ gel (Fig. 5.) in dem Po gemacht hat, haben wirklich gezeigt, „ daß das Wasser in gewisser Tiefe schneller, als auf der Oberfläche „ laufe. Diesem Zuwachs aber der Schnelligkeit kann das Pitoti- „ sche Instrument nicht zeigen, denn je höher das Wasser außer dem „ Rohre *CD* ober der unteren Oefnung *E* steht; desto höher steigt „ es auch innerhalb demselben, ohne den Zunahm der Höhe den es „ von der Geschwindigkeit des daranstoßenden Wassers erhält. Mit „ einem Worte, die Säule *DM* ist desto höher, je tiefer *E* unter „ dem Wasser steht, weil *m* allezeit an der Oberfläche sich befindet. „ Nun diese Wassersäule hält mit der äußern das Gleichgewicht,

zwischen seinen Ufern einzuschränken? gewißlich nicht allezeit; man muß nicht selten vorbauen, wenn man anders will, daß unsere Felder vom Ausflusse, und der Ueberschwemmung des Flusses sicher seyen; man muß auch mit Bescheidenheit vorbauen, damit das Vorbauen nicht selbst zum Schaden sey. Und dieses Vorbauen ist in der That das wichtigste, von dem ich in diesem ersten Theile zu handeln hab.

14.

Ehe ich aber meine Gefinnungen darüber öffne, muß ich vor das Pitoresche Instrument, weil ichs eben angetühmet habe, wider jene Einwendungen, die große Gelehrte machten, und die, so viel ich weiß, noch unbeantwortet bis heute blieben, vertheidigen. Und eben diese Vertheidigung ist desto nöthiger, weil der irrige Satz, so sich auf die dawider gemachte Einwendung stützt, leicht zu großen Fehlern im Wasserbau Anlaß geben könnte. Es verdienet aber auch dieses Instrument wohl wegen des doppelten Nutzen, den es in der Wasserbaukunst leistet, wider die gemachten Einwürfe beschützt zu werden, damit es nicht aus üblem Vorurtheile zurück gesetzt werde. Ich führte zwar bisher nur einen Nutzen, der vom Gebrauche desselben kömmt, in meiner Rede an, daß es nemlich die Geschwindigkeit des laufenden Wassers abzumessen sehr dienlich sey; um so auf diese Weise aus der Weite des Rinnsaals, und Schnelligkeit des Flusses die Menge des in gegebener Zeit vorbeilaufenden Wassers zu erforschen; allein eben zugleich, da man damit die Geschwindigkeit des Wassers mißt, kann man auch mit selben die Stärke des Wassers bestimmen, mit welcher es auf eine gerad entgegengesetzte Fläche zustößt; und aus eben diesem läßt sich auch der schiefe Stoß, den es gegen die Ufern auszuüben pflegt, durch die Regeln der Mechanick bestimmen. Ich hab nicht nöthig hier eine Tabelle dieses Stoßes, und eine Erklärung derselbigen zu geben, weil wir schon eine berechnete in des H. Bellard's Architectura Hydraulica erstem Theile, in des ersten Buches

drit

dritten Kapitel finden. Daß es aber sehr nützlich sey, diesen Stoß zu wissen, kann man leicht daraus erachten, weil die Stärke der Werke, die man ihm entgegen setzt, nach der Größe dieser Lasten eingerichtet seyn muß, und wenn es gleich nicht allezeit nöthig ist, die Stärke des Anstoßes des Wassers genau zu wissen, so stoßen dennoch manchemal dergleichen Fälle auf, in welchem dieses Kenntniß wenigstens sehr nützlich ist, damit man nicht entweder stärkere Werke, als nöthig sind, mit großen Kosten anlege; oder im Gegentheile nur gar zu schwache, die der Gewalt des Stoßes unterliegen. Die Einmündung, so man dawider machte, und die in des gelehrten Jesuiten P. Lechi in welscher Sprache geschriebenen Hydrostatick zu finden ist, ist folgende: „Es ist gewiß, daß das Wasser auf der Oberfläche wenigst der tiefen Plätze als zum Beyspiel der Po ist, nicht so schnell laufe, als es in tiefen Orten läuft. Die Theorie und die Erfahrung zeigen es einmüthig, denn da das tiefere Wasser vom daraushiegenden gedrückt wird, muß nothwendig durch diesem Drucke seine Schnelligkeit für sich selbst vermehret werden; und diese Vermehrung, wenn der Fluß sehr tief ist, daß der Widerstand, den das Wasser auf dem Boden findet, die durch den Drucke vermehrte Geschwindigkeit, nicht durchaus vertilget, muß endlich auch merklich werden. Die Versuche aber, die man mit dem Quadranten, und der Kugel (Fig. 5.) in dem Po gemacht hat, haben wirklich gezeigt, daß das Wasser in gewisser Tiefe schneller, als auf der Oberfläche laufe. Diesem Zuwachs aber der Schnelligkeit kann das Pitotische Instrument nicht zeigen, denn je höher das Wasser außer dem Rohre *CD* ober der unteren Oefnung *E* steht; desto höher steigt es auch innerhalb demselben, ohne den Zunahm der Höhe den es von der Geschwindigkeit des daranstoßenden Wassers erhält. Mit einem Worte, die Säule *DM* ist desto höher, je tiefer *E* unter dem Wasser steht, weil *m* allezeit an der Oberfläche sich befindet. Nun diese Wassersäule hält mit der äußern das Gleichgewicht,

„ und vernichtet also den Druck, den sie durch ihre Schwere macht,
 „ die Höhe $m n$ aber zeigt nur die Schnelligkeit, die sie aus andern
 „ Ursachen hat. So hat auch wirklich Pitot selbst mit diesem In-
 „ strumente meistens die Schnelligkeit des Wassers auf der Oberfläche
 „ größer, als tiefer unter selber, und zuweilen auf eine ziemliche Tiefe
 „ gleich groß, aber niemals größer mit diesem Instrumente gefunden,
 „ es kann also dieses Instrument wenigstens die Geschwindigkeit des tie-
 „ fern Wassers nicht richtig zeigen.

15.

Laßt uns nun sehen, ob dieser Einwurf gegründet sey. Daß die Flüsse wenigstens meistens schneller laufen, wenn das Wasser höher ansteiget, das ist gewiß; ist es aber auch gewiß, daß diese größere Schnelligkeit daher den Ursprung nehme, weil der Druck des obern Wassers auf das untere größer ist, wenn das Wasser höher anwächst? wenn der Druck des obern Wassers auf das untere allein und für sich selbst selber in Bewegung setzen könnte, so müßte er auch in den Wehren das untere, und der Verbindung wegen auch das obere in eine beständige Bewegung bringen, und nach was für einer Direction oder Leitung sollte wohl in einem auf jeder Seite eingeschlossnen Wasser diese Bewegung gehen? nicht der größere Druck des obern Wassers, sondern die größere Ungleichheit des Druckes vermehrt die Schnelligkeit des Flusses, und eben diese kann in gewissen Fällen die Ursache seyn, daß das untere (doch nicht das unterste wegen des Widerstandes des Bodens) schneller, dann das obere fließe, und auch in solchen Fällen würde das Pitotische Instrument den Wachsthum der Geschwindigkeit entdecken, so wie ich gleich jetzt be- weisen will.

16.

Es sey (Fig. IV.) AB die Horizontal-Linie, $m n$ die Ober-
 fläche.

fläche des Flusses, da er niedrig ist, und von *m* bis *n* Horizontal, oder beynähe horizontal fort fließt. *M N* aber die Oberfläche, wenn er hoch angeschwollen ist. Bey *B* aber habe er einen Fall, oder wenigst habe sein Rinnsaal wieder einen Abhang; so ist es klar, daß in diesem Falle das unterste Wasser für sich selbst, wenn die am Boden sich entgegen sträubenden Hinternüße den Lauf nicht hemmen würden, auch da er nieder ist, schneller fließen müßte, als das obere; denn es wird von *m* bis *n* vom obern gedrückt, und über *n* hinaus nimmt die Höhe der Wassersäule immer ab, bis sie endlich ganz verschwindet; folglich wird das auf dem Boden fließende Wasser mehr gegen *B* hinüber, als entgegen gedrückt, und so muß seine Geschwindigkeit durch diesen Druck wachsen. Dieser Zuwachs muß noch weit größer seyn, wenn das Wasser höher, nemlich z. B. bis in *M N* steigt, weil alsdann die drückenden Wassersäulen, denen keine andere über *N* hinaus durch gleichen Gegendruck das Gleichgewicht halten, noch höher sind. Doch wegen der Hindernüße wird die größte Geschwindigkeit nicht am untersten Boden, sondern höher im Flusse seyn. Es wird aber auch das obere Wasser, das von dem unteren mit hingezogen wird, schneller als ansonst fließen, und die größte Geschwindigkeit wird wenigst nahe beym Falle *B* in gewisser tiefe unter der Oberfläche *M N*, und in gewisser Höhe ober dem Boden seyn, die man, weil sie von besondern Umständen, und absonderlich von der Beschaffenheit des Bodens anhängt, nicht allgemein bestimmen kann. Ganz anders aber wird es sich verhalten, wenn das Wasser von *m* oder *M* an bis in das Meer keinen, oder fast keinen Fall mehr hätte, sondern beständig Horizontal fort flöße; da sehe ich keine einzige Ursache, warum es in der Tiefe wegen des Druckes des unmittelbar darauf liegenden Wassers schneller fließen sollte, indem diesem Drucke durch den Gegendruck der weiter gegen *B* stehenden Wassersäulen widerstanden würde. Ja wenn auch durch vorangehende Abhänge, oder Fälle das tiefere Wasser im Strome eine größere Geschwindigkeit er-

halt

halten hätte, so würde doch weiter den Strom hinunter, wenn auf eine lange Strecke kein neuer Fall, oder neuer Abhang mehr vorkäme, alles Wasser (ausgenommen, was nahe an dem Boden, und an den Seiten ist, das wegen des Widerstandes, den es da leidet, langsamer fort fließt) zu einer gleichen, oder beynähe gleichen Geschwindigkeit gelangen; denn so lange das untere Wasser schneller als das obere fließt, widersteht ihm einiger maßen das Obere wegen seines Zusammenhanges, das Obere wird immer von schneller fließenden unten angezogen, und immer wird ihm ein Theil der Kraft, und der Geschwindigkeit vom untern mitgetheilt, bis endlich alles vom Ufer, und vom Boden entfernte Wasser mit gleicher Geschwindigkeit fortreißt, und dann bleibt es so lange in eben der Geschwindigkeit, bis neue Abhänge oder Fälle wieder eine neue Ungleichheit verursachen; und dessentwegen kann es recht leicht geschehen, daß das Wasser auf eine lange Weite nicht schneller unten, als an der Oberfläche fließt, sey es auch, daß dem Wasser an der Oberfläche die Luft widerstehe; denn diese (wenn anders kein widriger Wind bläst) wird mit hingerissen, und so widersteht sie immer weniger, je weiter sie dem Flusse folgt; geschieht es aber, daß der Wind nach eben der Direction des Flusses bläst, dann befördert er die Schnelligkeit des Flusses, und machet ihn geschwinder laufen; und überhaupt davon zu reden, ist jener Widerstand, der von der Luft den Ursprung hat, bey sanftem Wetter sehr gering. Ist aber ein Fluß nicht gar zu tief, so muß er nothwendig, wenn besonders der Boden rauch, und steinig ist, auf der Oberfläche am schnellsten fließen; weil der Widerstand, dem das Wasser am Boden leidet, auch das übrige des Zusammenhanges wegen aufhält, und also die dadurch entstandene Verminderung der Geschwindigkeit sich gar leicht bis an die Oberfläche des Wassers erstrecken kann.

Zwischen den Fochen der Brücken aber, die unten breiter als
oben

oben sind, darf man sich keineswegs verwundern, daß das Wasser oben geschwinder, als unten fließt, weil es unten des engeren Canales wegen, mehr Widerstand leiden muß. Kann man denn jezo das Pitotische Instrument noch einer Unrichtigkeit beschuldigen, weil man damit unter den Brücken meistens die Geschwindigkeit des Wassers größer an der Oberfläche, als tiefer unter selber gezeiget hat? Kann man es denn jezo noch für Fehlerhaft angeben, weil es in verschiedenen Tiefen gleiche Geschwindigkeit des Wassers gewiesen hat, da sie doch wirklich meistens, und sonderlich in größeren Flüssen, die eine etwas längere Strecke eben oder dennoch schier gar eben fortfließen, sich so befinden muß? warum aber überhaupt das Wasser, da es höher anwächst, geschwinder zu fließen pflege, davon wird noch eine andere Ursache im zweyten Theile gezeiget werden.

17.

Doch aber, es giebt noch Fälle (wird man sagen) in welchem das Wasser tiefer unter der Oberfläche, weit geschwinder, als oben fließt. Gut! hat man aber in diesen Fällen auch mit dem Pitotischen Instrumente Versuche gemacht? von diesem läßt sich wenigst in des P. Lechi Hydrostatick kein Wörtchen finden! der Herr Zedrii, hat seine Versuche in diesen Tiefen nur mit der Kugel, und dem Quadranten angestellt, und so ist die Geschwindigkeit des Po tiefer unter der Oberfläche größer befunden, als zu oberst. Was folgt daraus? dieses allein, daß auch das Pitotische Instrument in solchem Falle (wenn je die Kugel nicht betrüget), die Geschwindigkeit des tiefern Wassers größer zeigen müßte, wenn es anders richtig ist, und dieses, ich zweifle nicht, würde es gewiß gethan haben, wenn man es nur versucht hätte; denn ist die Geschwindigkeit des gegen E anfallenden Wassers größer, so muß ja nothwendig eine größere Säule dadurch erhalten werden, als wenn sie geringer, und alles übrige gleich ist. Wenn aber auch gleich die durch das pitotische Instrument gesuchte

Geschwindigkeit mit der durch die Kugel determinirten nicht einstimmen sollte, so ist erst eine Frage, welches von beyden Instrumenten fehle. V. Lechi hat selbst die Fehler der Kugel wohl angemerkt; ist das Wasser tief, und läuft der Fluß ziemlich schnell, so wird die Kugel allzeit in der Tiefe eine größere Geschwindigkeit auf dem Quadranten anzeigen, als sie zeigen sollte, wenn sie die wahre weisete. Denn in diesem Falle muß man sich einer ziemlich schweren Kugel, und deswegen auch einer stärkeren Schnur bedienen, die der beständig daranstoßende Fluß also biegt, daß sie den Winkel $a c n$ anstatt $a c m$ (Fig. 5.) weist, woraus man die Geschwindigkeit des Flusses, viel größer, als sie ist, erachtet. Es ist auch eben nicht so leicht, diesem Betrüge durch eine Correction zu entweichen, weil man die Krümme Linie, welche die Schnur macht, nicht leicht bestimmen kann. Ich vertraue derowegen dem Pitotischen Instrumente mehr, als der Kugel; und es hat selbes noch dabey den Vortheil der Bequemlichkeit, daß es sich überall, auch nächst an Ufern die Stärke des Anstoßes gegen selbe zu bestimmen gebrauchen läßt, zu welchem doch die Kugel, nicht wohl bequem, und dienlich ist.

18.

Nachdem wir die Richtigkeit des pitotischen Instrumentes erwiesen haben, wollen wir jetzt wieder zum Wasserbau zurück kehren. Will man einen Fluß einschränken, damit er nicht mit seinem Austritte über die Ufern etwann Schaden bringe, so verlangt man entweder nur ein gewisses Stück Landes wider ihn zu beschützen, oder man will ihn durchaus, oder wenigst ein großes Stück desselben in seinem Rinnfaal erhalten, und so alle an ihm gelegenen Felder davon bestreuen. Das erstere läßt sich manchesmal mit gar geringen Kosten zu Stande bringen; in beyden Fällen aber muß man jene Behutsamkeit gebrauchen, daß man ihn nicht in ein gar zu enges Rinnfaal einzuschließen suche: denn diese Arbeit, wie ich oben schon erwies, ist aus gegebenem

in Ursachen insgemein sehr köstlich, und vieler Gefahr ausgesetzt. sey (Fig. 6.) AB der Fluß in seinem ordentlichen Rinnsaal; die gestrichelten Linien zeigen seinen Austritt an, wenn er am meisten wächst. sey rechterseits ein ziemlich großes Stück des Feldes, das er, weil tiefer als das herum gelegene Land ist, mit seinem Wasser, da er in CD herein tritt, überschwemmet, G sey ein anderes solches Stück linkerseits, über das er durch EF sich hinaus ergießt, so ist ja klar in Folge, daß H in solchem Falle leicht, viel schwerer aber G zu retten sey. Denn das Land H zu bewahren, darf ich nur eine kurze Defensionslinie CD ziehen, so ist dem Wasser der Eingang auf H schon verschlossen; G im Gegentheile zu befreien, muß ein viel längerer Damm EF gezogen werden. Es kann sich auch ereignen, daß der Damm CD gar nicht hoch seyn müsse, um das Wasser abzuhalten, obgleich das Wasser in H wenn es hereingetreten ist, sehr tief wird, weil nemlich der Boden höher bey CD als mitten in H ist; und in solchem Falle ist die Ueberschwemmung sehr überlästig, weil das ausgegoßne Wasser nimmer in sein Rinnsaal zurücke treten, sondern nur allein durch längeres Ausdünsten und Versinken, in den Boden vergehen kann. Hier wäre es wohl die größte Unbescheidenheit, wenn man sich die Mühe nicht geben wollte in CD einen kleinen Damm zu legen, um dadurch das ganze Feld H zu retten.

19.

Nun dieser Fall ereignet sich recht oft, und nur allein ein nachlässiges Betragen ist es von uns, daß wir die Mühe sparen, unsere Ländereien, und unsere Felder in diesem Falle der Ueberschwemmung, und so dem Verderben zu entziehen. Ich rathe dessentwegen, daß man die Gränzen des ausgetretenen Wassers, wenn es die Strände wirklich übersteigt, von Zeit zu Zeit, da es immer wächst, genau bemerke. Eine Person könnte die Sorge haben, bey der Brücke, wenn je eine in selber Gegend ist) die Höhe des Wassers von Zeit zu

zu Zeit zu bemerken; eine andere könnte mit einer Flur Charte des auf einer Seite am Ufer gelegenen Landes, und eine dritte mit eben jener Charte des an den jenseitigen Ufer gelegenen Landes herum gehen, oder reitten, und auf der Charte immer die Gränzen der Ueberschwemmung zeichnen; so würden wir durch die Vergleichung der Zeiten finden, wie weit sich das Waßer auszugießen pfleget, wenn es zu dieser, oder einer andern Höhe wächst. Es würde bisweilen auch eine Person allein (wenn sie wenigst zu Pferde über die Brücke von einer Seite des Ortes zur andern kommen könnte) alles zu verrichten erklecklich seyn; sie würde z. B. da das Waßer 4. Schuh unter der Brücke läuft, von der Brücke ausgehen, und zu erst auf einer, alsdann auch auf der andern Seite die Gränzen der Ueberschwemmung auf der Flur-Charte bemerken. Eben dieses würde sie zum zweytenmal thun, da das Waßer nur noch 3. Schuh tief unter der Brücke; und so zum drittenmal, da es nur noch einen Schuh entfernt ist, und dieses zwar so lange, bis es wirklich schon die größte Höhe erhalten hat. Sollte das Waßer sehr schnell steigen, so könnte man vielleicht bey dem Abfließen desselben die Gränzen der Ueberschwemmung bestimmen, oder wenigst ersehen, was man zuvor zu vollbringen nicht im Stande war. Doch es ist nicht gar so sicher; denn weil das Waßer in Gräben zurück bleibt, könnte man die Ueberschwemmung für eine gegebene Höhe des Waßers größer ansehen, als sie wirklich ist, indem man die kleinen Plätze, durch die es vom übrigen Waßer, das mit dem Fluße zusammen hängt, abgesondert ist, nicht bemerkt, absonderlich wenn solche Plätze mit Gesträuchen besetzt sind; weil man in solchem Falle, wenn sie nur in der Ferne angesehen werden, leicht glauben könnte, es rageten nur die Gesträuche hervor, ob gleich das Erdreich mit keinem Waßer mehr bedeckt sey. Die letzten Gränzen der Ueberschwemmung, wenn das Waßer nämlich die größte Höhe erhalten hat, kann man auch durch den zurück gelassenen Schlamm mit leichter Mühe bemerken.

Weil aber diese Austritte des Wassers zu verschiedenen Zeiten verschieden sind, so kann man zwar schon vorhin bey den kleinen Ueberschwemmungen die ersten Gränzen der Ueberschwemmung bemerken; um aber auch die Grösten zu bestimmen, muß man gleichwohl die Zeit der Ueberschwemmung selbst erwarten. Doch es giebt auch außerordentliche Ueberschwemmungen, die im Verfluß auch vieler Jahre nicht wieder kommen; will man sich auch wider diese schützen, so kann man die Dämme desto höher machen, und durch Libelliren in die horizontale Fläche bringen; denn alle sollen sie sich (eben weil die übrige Höhe unnütz ist) in einer nämlichen horizontalen Fläche endigen.

20.

Wenn man mit keiner Flur-Charten versehen ist, auf welcher man die Gränzen der Ueberschwemmung bey jeder Wasserhöhe zeichnen kann, so mag man die Gränzen durch eingeschlagene kleine Pföcke, die in gewisser Entfernung voneinander eingestecket sind, auf dem Felde selbst bemerken, und wollte man den Bau gleich darnach vornehmen, so würde auch diese Art die Gränzen zu bestimmen die beste seyn. Damit die Arbeit geschwind vor sich gehe, und das Wasser nicht merklich unter selber sich ergieße, da man die ersten Gränzen durch Pföcke zu bemerken beschäftigt ist, so könnte man ja wohl mehr Leute darzu gebrauchen; man könnte auch die durch die kleinen eingeschlagenen Pföcke auf eine solche Weise bemerkten Gränzen erst nach der Ueberschwemmung durch einen Feldmeyer zu Papier bringen lassen, damit man in der Zeichnung die Gränzen der Ueberschwemmung bey verschiedener Höhe des Wassers auf einem Anblick sehen kann. Die Höhe des Wassers selbst kann man von Zeit zu Zeit an einem Baum, der nächst am Strande steht, oder an einer fest in die Erde geschlagenen Säule bemerken, wenn je keine Brücke in selber Gegend den Fluß zu übersezen ist, oder wenn dieselbe vom Wasser überstiegen wird.

21.

Ist man nun einmal mit einer solchen Zeichnung der Gränzen der Ueberschwemmung wohl versehen, so läßt sich ohne Mühe leicht entdecken, ob, und wo man Werke dawider bauen kann. Es bedeute 1. B. (Fig. 7.) 1. 1. 1. 1c. die Gränzen der ersten Ueberschwemmung, da das Wasser noch 6. Schuh unter der Brücke war; 2 2 2. 1c. die zweite Ueberschwemmung, da selbes nur 4. Schuh von der Brücke entfernt gewesen; und 3. 3. 3. 1c. die dritte Ueberschwemmung, da es nur zween Schuh tief unter der Brücke lief, so sieht man ja ganz leicht, daß es bey der ersten Ueberschwemmung kaum der Mühe werth sey, Werke dawider anzulegen, ausgenommen bey dem kleinen Stückchen C, welches mit einem kleinen Damm *m n* könnte für eine so niedere Ueberschwemmung geschützt werden. Bey der zweiten Ueberschwemmung, wenn man sie anders nicht ganz verhindern will, würde wenigstens das Stück *A*, und bey der dritten das Stück *B* der Rettung würdig seyn; deßentwegen hat man sie mit Dämmen *m n* einzuschließen. Doch man müßte hierzu nicht unterlassen, die Sache so einzurichten, daß das Wasser aus diesem Stücken, wenn es die gemachten Dämme bey einer stärkeren Ueberschwemmung überstiegen hat, wieder in den Fluß, da er sinkt, zurücke treten könnte; und eben deßwegen muß bey jedem ein Graben angelegt seyn, durch die das Wasser wieder ablaufen kann, und die man auch zur andern Zeit mit einem Thore, oder Schuttbreite schließen, oder wieder öffnen kann.

22.

Will man aber alles umliegende Feld völlig von Ueberschwemmungen sicher halten, so würde man die Ufer des Flusses beydersseits mit parallel fortlaufenden Dämmen *MM* und *NN* in einer ziemlichen Entfernung von ihnen begleiten müssen; denn je weiter man diese Dämme von den Ufern entfernen wird, um so viel weniger darf man sie

ſie erhöhen, und ſo wird deſto weniger das Waſer gequellert ſeyn; und eben dieſes iſt die Urſache, warum ſie nur mehr dauerhaft, und minder koſtbar ſind; weil ſie keineswegs ſo hoch, und bey weitem nicht ſo ſtark ſeyn müſſen, als wenn man ſie ans Ufer geſetzt hätte. Denn je höher die Dämme ſeyn müſſen, das Waſer einzuschließen, und je höher es innerhalb denſelben ſteigt, deſto größer iſt auch der Druck deſſelben, und deſto ſtärker müſſen auch die Dämme ſeyn; zu dem, je weiter auch ein Damm vom Ufer entfernt iſt, deſto ſicherer iſt es, daß ihn das Waſer nicht untergraben wird: ich rathe deſſentwegen vor allem dieſe Regel genau zu beſorgen: wenn man einen Fluß mit Dämmen einſchließen will, daß er durch ſeinen Austritt nicht ſchade, ſollen ſie nicht gar zu nahe an die Ufer gebauet ſeyn.

23.

Nun haben wir zwar biſher gezeiget, wo Dämme die Flüſſe einzuschränken mit Nutzen anzulegen, und wo ſie zu vermeiden ſeyn; wir haben aber noch nichts von der Geſtalt der Dämme, nichts von der Materie, aus welcher ſie beſtehen ſollen, nichts von der Art ſie anzulegen beygefügt, ich ſage alſo: wenn man einen Damm anlegen will, ſo hat man ſonderlich darauf zu ſehen, daß man ein dauerhaftes Werk mache, welches, wenn es anders möglich iſt, für ſich ſelbſt beſtehen kann, und keine Ergänzung, vonnöthen hat.

24.

Wenn wir unfere Dämme von Mauerwerk aufführen ſollten, würden ſie ohne Zweifel ziemlich koſtbar werden. Hölzerne Werke würden auch nicht wohlfeil, und neben dem noch der Verordnung unterworfen ſeyn. Ich will alſo nur von der Erde aufgeworfne, und mit Raſen bedeckte Dämme haben, welche aber, damit ſie ſtark ſeyen

gegen dem Flusse gar nicht gäh, sondern sanft abhän-
 glich, und auf der vom Flusse weggewandten Seite mit einer größern Böschung versehen
 seyn sollten. Man hatte sich in der Insel Walcheren im niederlän-
 dischen Seelande lange Zeit hindurch bemüht, das Meer mit kostbar
 erbauten Werken im Raume zu halten. Doch alle Arbeit war um-
 sonst, bis man endlich dem guten Rath eines Bauers folgte, und
 den wüthenden Wellen nichts anders, als eine gegen das Meer fast
 unmerklich abhängende Fläche gleich eines Glacis entgegen setzte. Es
 ist zwar dieser Damm, weil er sehr hoch ist, auch etliche hundert
 Schritte breit, aber doch ein solches Werk, das seiner Dauer wegen
 nicht die mindesten Kosten von selber Zeit an, macht, und doch das
 ganze Land wider die Anfälle des Meeres sehr mächtig, und sicher
 schützt. Allein wir werden keineswegs vonnöthen haben, unseren Dä-
 men eine gar zu große Grundfläche auszustrecken: weil insgemein die
 Dämme, die uns vor der Ueberschwemmung sicher halten sollten, nicht
 gar so hoch seyn müssen, und der Gewalt des austretenden Wassers
 nahe an seiner obersten Fläche so groß nicht ist. Eine allgemeine Re-
 gel, wie sich die Höhe der Dämme die nur von Erden aufgeführt,
 und mit Rasen bedeckt sind, zur Grundfläche verhalten soll, läßt
 sich unmöglich geben, weil man sich jeder Zeit nach den besondern Um-
 ständen richten muß. Je fester die Erde ist, aus der sie aufgeführt
 sind, desto mehr Gewalt (wenn alles übrige einerley ist) können sie
 aushalten: ist im Gegentheile der Boden sandigt, und locker, daß
 sich das Wasser leichterding eindringen kann, so müssen sie nur desto
 dicker seyn. Ja wenn sie nur aus purem Sande wären, würden sie
 die Macht des Wassers länger einzuhalten keineswegs im Stande
 seyn. Je höher der Wall werden muß, damit er nicht vom Wasser
 überstiegen werde, desto größer ist auch zu unterst der Druck des Wa-
 sers, darum sieht man ja wohl, daß ein gerade aufstehender Damm
 nicht gut thun könne. Wir werden aber auch im künftigen noch be-
 sonders zeigen, daß die steilen Dämme nicht dauerhaft seyen; weiters
 hat

hat man bey diesen Dämmen auf die Direction des Flusses, nicht zwar wie sie in seinen ordentlichen Ufern ist, sondern wie sie zu jener Zeit, da er hoch anwächst, beschaffen ist, zu sehen, denn er bestimmet zu dieser Zeit manchesmal gleichsam ein neues, und anders gerichtetes Rinnsaal, da ihm die Lage der Hügel an die er sich ausgießt, manchesmal durch die Zurückprallung des Wassers eine andere Leutung geben; nun muß man ohne Zweifel dem Damm, auf dem der Fluß gerade zufließt, mehr Stärke geben, als einem, neben dem er nur Seitwärts vorbeystreicht: denn ist die Richtung des Strommes mit dem Damm parallel, so hat dieser nur den Druck des Wassers von seiner Schwere auszuhalten, ausgenommen, daß die hervorragenden Theile was mehrers leiden müssen. Stößt aber der Fluß auf ein Werk gerade zu, so muß neben der Schwere des Wassers auch dieser Stoß ausgehalten werden. Doch glaube ich überhaupt, die Grundlinie der gegen den Fluß abhängenden Fläche dürfe niemals viel kleiner seyn, als die Höhe des Dammes selbst ist, ich glaube sie werde niemals mehr als fünfmal größer seyn müssen, als seine Höhe. Die obere Breite des Dammes von fester Erde wird manchesmal nicht nöthig haben mehr als 2 bis 3. Schuh dick zu seyn. Wie dick sie aber seyn müsse, wenn der Boden sandicht ist, damit das Wasser nicht durchzudringen vermögend sey, ist nicht so leicht zu bestimmen. Wenn der Boden gar zu sandicht wäre, müßte man wohl anderswoher Erde auf dem Fluß zuführen, um sie mit dem Sande zu vermischen, oder dem Damm unter dem Rasen damit zu überkleiden, dieses aber würde eine kostbare Arbeit seyn; denn durch den puren Sand dringt das Wasser nach und nach gleichsam auf eine unendliche Weite durch; und dessentwegen läßt sich auf einem sandigten Boden schwerlich etwas zu Stande bringen.

25.

Und eben dieses ist die Ursache, daß das Wasser an manchem

N n n

Dr.

Orte, wenn der Fluß zu wachsen anfängt, in der Mitte des Feldes ausbricht, ehe es einmal die Ufern überstiegen hat; denn das Wasser dringt sich ein, und durchgräbt den aus Sande bestehenden Boden; und so kann es Gelegenheit in der Mitte oft auszubrechen finden. Es schieht es nun, daß das Wasser auf allen Seiten in einem solchen Felde, wenn der Fluß größer anschwillt, aus der Erde hervorquellt, so ist es in der That eine vergebliche Arbeit, ein solches Feld mit Dämmen wider die Ueberschwemmung zu beschützen. Bricht aber das Wasser nur an einem Orte aus, so kann man selben mit einem Damm umschließen; überhaupt wenn es immer möglich ist, wird man solche Orte außer dem Damm zu bringen suchen; man wird nämlich lieber den Damm weiter zurücke ziehen, daß er hinter der Ort kömmt; eben weil man zu fürchten hat, daß nicht das Wasser in der Nähe einmal ausbreche, wenn man auch einen solchen Ort mit einem Damm umgäbe, und gleichsam einen Kessel daraus zu gestalten suchte. Was die hintere, oder vom Flusse weggewandte Seite des Damms betrifft, läßt sich ganz leicht ersehen, daß man ihm auch da ein Böschung geben müsse, damit er doch vom Einfall sicher sey, und zwar ein um so viel größere, je weniger das Erdreich, aus welchem er gebauet ist, stark und fest ist.

26.

Das verdrüßlichste ist, daß durch die an dem Flusse gelegenen Felder sich gar oft auch Bäche schlängeln, die sich in den Fluß ergießen. Damit mithin das Wasser durch diese ihre Rinnäle aus dem Flusse sich nicht auf unsere Felder mache, müssen ihre Ufer auch mit Dämmen umgeben seyn, sonst würden alle die, die um den Hauptfluß aufgeführt sind, vergeblich und unnütz seyn. Wenn aber eine Gegend so beschaffen ist, wenn ein Feld so liegt, daß bey einfallenden Regen das Wasser von dem nächsten Hügeln und Bergen gegen den Fluß darübez fließt, da werden Dämme, mit denen man die Ufer des Flusses be-

Begleiten würde, mehr schädlich denn nützlich seyn, weil sie dem vor den Hügeln herunterströmenden Wasser den Ausgang verschließen würden, aus welchem ja klar zu sehen ist, daß solche Dämme, die einen ganzen Fluß in seinem Rinnale erhalten sollen, nicht überall wohl anzulegen seyen. Auch mit jenen, mit denen man nur ein besonders Stücke schützt, kann es sich ereignen, daß der Fluß noch bisweilen den Damm übersteigt, oder daß durch einen gewaltig anhaltenden Regen viel Wasser gesammelt wird; es wird also in diesem Falle recht nützlich seyn, dem Wasser durch Gräben mit Schutzbrettern, die man nach belieben öffnen, oder schließen mag, einen Ausgang zu gestatten, damit es in den Fluß, wenn er wieder gesunken ist, zurück treten kann.

27.

Nun entsteht die Frage: wenn wir einen Damm aufwerfen, wo sollen wir die Erde zum Baue nehmen? ohne einen Graben nächst am Damme zu machen, wird es nicht leicht möglich seyn? wie soll aber dieser Graben beschaffen seyn? soll er lieber tief, oder breit seyn? um genug Erde daraus zu nehmen? soll er gegen dem Flusse vor, oder hinter dem Damme seyn? wenn das Land neben dem Flusse fast eben ist, so wollte ich den Graben viel lieber hinter den Damme in C R (Fig. 8.) angeleget sehen, damit er nicht von jenem Wasser, daß vom Flusse ausgegossen wird, erfüllet werde. Ich möchte ihn lieber breit, als tief machen, damit das in ihm gesammelte Wasser um geschwinder verdünsten kann; doch darf er auch nicht gar zu breit seyn, damit man die Erde zum Damme nicht so weit herführen muß.

28.

Wenn aber das Land vom Damme bis zu den Ufern des Flusses ziemlich abhängig ist, daß das Wasser aus dem Hauptgraben,

N n n 2

der

Der den Damm begleitet, durch einen oder mehrere kleine Gräben, die gerad dem Fluß zugehen, wieder ablaufen kann, so würde ich den Graben, gegen dem Fluße zu, neben dem Damme machen. Auf was immer für einer Seite sich aber der Graben befindet, so könnte man in selben so gar auch Fische halten, wenn er anders immer mit Wasser gefüllet bleibt.

29.

Da die Dämme bey jenen Stücken, die sie nur von höhern Ueberschwemmungen bewahren sollten, und die nur dort ihre Dienste thun, wenn das Wasser zur größern Höhe wächst, nicht gar zu hoch seyn müssen; sieht man ja wohl, daß sie sogar kostbar nicht seyn. Diejenigen aber, mit denen man die niedergelegnen Orter retten will, und zwar so, daß sie zu allen oder fast zu allen Zeiten beschützt bleiben, sind um so kostbarer, je höher sie seyn müssen. Wollte man aber ein solches Stücke zwar nicht vor allen, auch seltsammern Ueberschwemmungen bewahren, sondern nur von jenen, die die gemeinsten sind, so müssen auch die Dämme so hoch nicht seyn, nur einer, oder mehrere durch den Damm gemachte Gräben sind vonnöthen, die man (wie ich oben sagte) nach belieben öffnen, und wieder schließen kann, dem Wasser so die Freyheit ab zulaufen zu gestatten. Nun glaube ich zwar von der Art, wie man den Austritt der Flüße über seine Fehder mit nicht gar großen Kosten zu hindern hat, genug gesagt zu haben; wir wollen zum andern Theile schreiten, welcher nicht minder wichtig ist.

30.

Die beständige Aenderung des Rinnsaales der Flüße hat verschiedene Ursachen, die wir alle wohl einsehen müssen, um Mittel sie zu verhindern, zu erdenken. Erstens ist die Directionslinie bey verschiedenen

nacht die Ungleichheit des
 Änderungen. Denn wo er
 das Wasser, so in Grube
 selben an, und ändert durch
 die Direction des Wassers.
 er andere, die nach verschiede-
 er fast gar keine Änderung
 en, die auf dem Grunde lie-
 d der Sand muß sich hinter
 nem Ufer schwach, so bricht
 if den Grunde fallende Stü-
 falls den Boden.

ganz verschiedend Geschwin-
 rinnsaal; denn bald läßt der
 Sand auf den Boden sinken,
 wieder, da er schnell fließend
 hl, daß ein Fluß, da man

den Boden ausheben, so
 ihm den freyen Lauf gestattet, immer Änderungen in seinem Rin-
 nsaale, oder wenigst in einigen Theilen desselben machen müsse. Die
 mehresten Änderungen aber verursachen die vielfältigen Krümmungen
 derer Rinnsäle, durch die die Direction des Wassers immer anders
 wird, so daß es bald auf diese, bald auf jene Seite gewaltiger anstößt.

45.

Wir haben nunmehr auch die Ursachen der Änderungen des
 Rinnsaales, die sich im selben befinden, alle, oder wenigst die wichtige-
 sten durchsuchet; wie aber werden wir denselben begegnen? um einen

P p p

Fluß

sen muß, denn die Direction des mittlern Wassers, entsteht aus der zusammengesetzten Bewegung, die aus der ersten Kraft, und den unendlichen Reflexionen an den Ufern herkömmt; es entspringt endlich aus allen diesen eine mittlere Direction, der das meiste Wasser und sonderlich in der Mitte folgt. Diese zusammengesetzte Bewegung muß oft ganz anders werden, da der Fluß höher steigt, den 1. B. gesetzt; es mache der Stromm in den niedrigen Ufer an einem Orte einen Zirkelbogen (Fig. 15.) *BC*. da er zuvor von *A* gegen *B* herunter in gerader Linie floß; wenn nun das Wasser höher anwächst, da die niedern Ufer fast horizontal sind, so wird das Wasser, das von *A* gegen *B* herunter fließt, so bald es hoch anwächst, gleich über das Gestade treten, und seine Gewalt, besonders wenn es zwischen *A* und *B* in hohen Ufern eingeschlossen ist, wird mächtig seyn; hat es nun bey *BC*, ober den vorigen niedern Ufer, die es überstiegen hat, den freyen Paß erhalten, so wird das Wasser bey *BC* über selbe hinab gegen *D* zu, nach der Direction *AD* laufen; die Ufer bey *BC* werden von dem darüber laufenden Wasser zu Oberst am Rande beständige Stöße bekommen, und auch dem, welches unter selben noch in diesen Ufern *BC* fortfließt, wird von dem obern nach der Direction *AD* vorüber fließenden ein Theil seiner Kraft mitgetheilet werden. Die Ufern *BC* haben jetzt auf der Seite, da der Fluß darüber fließt, vielmehr zu leiden, als sie sonst, wenn der Stromm noch nieder war, zu leiden hatten; denn alles Wasser stößt mit viel größerer Gewalt an sie, theils weil es von den Obnern gedrückt ist, theils weil das Obere nach *AD* fließende Wasser auch dem untern (wie ich eben gemeldet habe) nach dieser Direction beständig eine Kraft mittheilet. War nur ein wenig die Natur der Bewegungen in flüssigen Körpern einsieht, muß von der Wahrheit dieser Sätze ganz überzeugt seyn, die ich auch deswegen hier zu entwickeln nicht nöthig habe. Da sich nun dieses allezeit, so oft das Wasser größer und aufgeschwollner wird, ereignet, so sieht man leicht, wie es endlich geschehen könne, daß das

Ufer

Ufer BC zerrissen wird; denn der über dasselbe nach der Leutung AD durch längere Zeit strömmande Fluß gräbt endlich den unter ihm liegenden Boden durch; es entsteht ein neues Rinnsaal, das Anfangs zwar noch klein ist, und bisweilen, wenn das Wasser wieder sinket, bald mit Schlamm erfüllet wird; bisweilen aber, wenn das Wasser längere Zeit erhöht bleibt, sich immer mehr vertieft, und erweitert; und endlich in eine solche Tiefe geräth, daß das Wasser hinfür, auch da es wieder gesunken ist, leichter durch dieses nach seiner Direction AB , als in das andere hinüber nach BC fließt. Laßt nun einmal das Wasser geschwinder in dem Rinnsaale BD als in BC , so wird der Schlamm in das letztere hinüber geschoben, und er setzt sich daselbst, und so wird endlich BC ausgefüllt, und zu einem festen Lande.

32.

Gleichwie nun das Rinnsaal eines Flusses bey einem oder einigen Austritten über die vorigen Ufer kann geändert, und ein anderes gestaltet werden, so kann auch das geänderte, wenn das Wasser ein andermal noch höher steigt, auch noch einmal geändert werden. Es sey z. B. EF ein Hügel; das Wasser wenn es sehr hoch steigt, ergieße sich bis an diesen Hügel, so wird es umselben durch die Reflexion gegen G getrieben, und es ist möglich, wenn das Wasser längere Zeit hoch bleibt, daß es sich gegen G hinüber ein neues Rinnsaal ausgrabe, und so auf diese Weise wieder seinen Lauf verändere.

33.

Will man also diese beständige Aenderung des Rinnsaals hindern, so wird unter andern dazu dienlichen Mitteln auch dieses seyn, daß man ihm durch Dämme, die mit den Ufern des alten Rinnsaales bey nahe parallel sind, in der nämlichen Direction, auch da er groß wird, erhalte, die er, da selber noch niedrig war, gehabt hatte,
und

und da man so zugleich die Ueberschwemmung der Felder verhütet, wird es manchesmal der Mühe werth seyn, daß man sich dieses Mittel bediene; Denn bisweilen wird dieser Damm nur hin und wieder einen kurzen Theil eines, oder beyder Ufer begleiten müssen; bisweilen aber sollte er so lang gemacht seyn, daß die Kösten, so man darauf zu wenden hätte, entweder das Vermögen, oder auch den Nutzen, der daraus entspringe, überstiegen. Die Dämme aber müssen alle gegen den Fluß, wie schon im vorigen Theile gemeldet ward, nicht steil, sondern langsam sinkende Flächen seyn, die doch den Ufern nicht gar zu nahe, sondern um so viel mehr entfernt stehen müssen, je größer der Fluß bey'm Zuwachs seines Wassers wird.

34.

Ich muß hier nothwendig einen Satz des im übrigen in der Wasserbaukunst so wohl erfahrenen Herrn Bellidors bestreiten, denn wir sonst auf sein Ansehen anzunehmen nicht zweifeln würden, und der uns nur in einem sehr schädlichen Irthume verleiten könnte. Der irrige Satz, den er aus einer irrigen Erklärung von der Weise, wie sich der Fluß in der Mitte vertieftes Bett gestaltet, herleitet, ist folgender: (L. IV. C. I. S. 988.) „ Je weniger Böschung die Ufern
 „ haben, desto weniger sie vom Drucke des Wasserstrommes leiden,
 „ so daß, wofern sie beynähe senkrecht wie die Rauen stünden, fast
 „ nichts als der Druck des Wassers (seitwärts) in Betrachtung käme,
 „ gleich als ob es still stünde; denn weil der Wasserstromm mit
 „ ihnen parallel lief, so übe er seine Geschwindigkeit nur wenig aus;
 „ also leiden die Ufern, deren innere Oberfläche schief ist, von der Geschwindigkeit des Flusses nur durch das, was sie horizontales haben, u.
 „ Daher kömmt es, daß die gerade stehende Ufern sich in
 „ zimlich gutem Stande erhalten, es sey der Wasserstromm so heftig,
 „ als er wolle, wenn nicht besondere Ursachen ihn verderben u.

Wenn

hutsamkeiten, die man dabey gebrauchen soll, in dem XXI. Kapitel seines Schauplazes der Wasserbaukunst beschrieben. Er wendet zwar dort die Dämme an, den Fluß in die Enge zusammen zu ziehen, man sieht es aber leicht, das sie eben sowohl die Ufern fest zu machen dienen.

47.

Vor allen verdienen hier die Eindämmungen von Faschinen die Bellidor im zweyten Theile der hydraulischen Architectur im zweyten Kapitel des 4ten Buchs ausführlich beschreibt, angezogen zu werden. Man hat dergleichen Eindämmung längst an den Ufern des Rheinstrommes angelegt, und bisher (wie er sagt, nichts einfacher, wohlfeiler, und nichts das seinen Zweck besser erreichte, gefunden. Man bauet nämlich ein Faschinen Werk, das mit Schichten von darauf geworfener Erde beladen wird, doch im Anfange, nicht so sehr, daß es unter gehe, gleichsam als eine schwimmende Insel, oder vielmehr Halbinsel, denn dieses Werk wird hin und wieder durch schief in die Erde gemachte Gräben fortgesetzt, oder vielmehr von daraus angefangen, und also mit den Ufern fest verbunden; endlich wird selbes mit Erde und Steinen, die aber mit den Faschinen sowohl verbunden werden, daß sie das Wasser nicht wegzuschwemmen fähig ist, so sehr beschweret, daß es sich senke, und also die schief abhängige Seite, an die selbes angeleget ist, oder auch wenn es nöthig ist, einen Theil des Bodens bedeckt, und wider den Stromm beschützet. Die ganze Beschreibung des Baues dieser Werke, und der Behutsamkeiten, welche dabey anzurwenden sind, herzusetzen, würde wohl zu lange seyn. Sie verdienet aber in dem Autor, den wir auch in unsere Muttersprache übersezt haben, nachgelesen zu werden. (*)

P p p 2

48.

(*) Was mich sonderlich abschreckt, sie herzusetzen, sind die dazugehörigen Figuren, welche er auf 4 großen Tabellen vorstellet. Sie sind mühsam abzuzeichnen, und würden kostbar zu seyn seyn. Ohne dieselben aber (was nicht den meisten) würde sich die Sache nicht wohl erklären lassen.

denn da sie von den Boden oder Seiten hervor stehen, macht nichts zur Sache, weil sie eben sowohl in einem Falle als in dem andern die Bewegung des Wassers im Wege stehen.

35.

Je größer aber die Schnelligkeit des Strommes ist, desto heftiger wirkt er gegen die hervorstehenden Theile, und fließet das Wasser unten schneller, als oben, so leiden die untern Theile, sowohl die an den Boden, als an den Seiten *A* und *B* mehr, als die oben, daß aber das untere Wasser nicht immer schneller als das obere fließen müsse, habe ich oben schon gezeigt S. 1.

36.

Es giebt noch eine Ursache, wegen welcher die untern Theile mehr als die obern leiden müssen. Das Wasser welches nahe bei *D* oder *E* an einem hervorragenden Stein anstößt, sonderlich, wenn dessen Fläche aufwärts schief gewendet ist, kann in die Höhe ausweichen, ohne daß es den Stein seine ganze Gewalt fühlen lasse, und Wellen werfe: das untere aber, das von der Schwere des ober ihm liegenden gedrückt ist, kann nicht so leicht ausweichen (denn es müßte, wenn es anders weichen will, das obere heben) und es stößt deswegen mit seiner ganzen Kraft, und mit allem Vermögen an. Darum hat ein Stück des Bodens zwar bey gleicher anfänglicher Schnelligkeit des Wassers mehr zu leiden, als ein gleich großes Stück an einer Seite, das weit ober dem Boden ist. Aber eben darum, weil der Boden für sich selbst mehr zu leiden hat, hemmet er auch die Schnelligkeit des Wassers mehr; und so kommt eine viel gleichen Wirkung heraus, als sie sonst seyn würde, wenn nicht andere Ursachen eine Aenderung machen.

37.

Nun haben gleich die unteren Theile mehr, denn die oberen zu leiden, so geschieht doch dieses keineswegs darum, weil das Wasser schief auf den Boden, auf die Seiten aber (wie es sich der Herr Bellidor vorstellt) gar nicht zufließt, sondern allein daher, weil das Wasser manchesmal unten geschwinder fließt, als oben, und nicht so leicht den Steinen, auf die es stößt, so wie das obere an den Seiten entweichen kann. Würde das Wasser nächst am Ufer eben so schnell fließen, als das Wasser am dem Boden, und würde es eben so beschwerlich dem andern, das neben ihm fließt, entweichen können, so hätten die Ufern zu oberst eben so viel zu leiden. Es würde auch nichts dazu machen, ob es zur Seite, oder in die Höhe weichen müßte, wenn die Gewalt, die es das andere, von welchem es umgeben ist, aus dem Wege zu räumen, anzuwenden hätte, die nemliche wäre.

38.

Was aber in diesem Stücke den Herrn Bellidor mag irre gemacht haben, scheinen dreierley Erfahrungen zu seyn: die erste ist, daß man die Geschwindigkeit des Wassers in den Flüssen, viel größer zu seyn befindet, da sie wachsen, als sie zu andern Zeiten war. Allein im ersten Theile erklärten wir schon, daß, wenn das Wasser weiter über dem Horizontalen Bette wieder einen Abhang, oder Fall bekommt, dadurch seine Geschwindigkeit vermehrt werde, und zwar um so viel mehr, als höher das Wasser in seinem Rinnsaale steht. Nebst der dort angegebenen Ursache der in diesem Falle vermehrten Geschwindigkeit, ist noch folgende allgemeine; die verursacht, daß das Wasser von der schon erhaltenen Geschwindigkeit, und von der, die sie durch Fülle, und Abhänge auf ein neues bekommt, weniger verliert. Je höher das Wasser steigt, desto mehr ist in den Rinnsaale; je größer aber die Masse oder die Menge des Wassers ist,

desto geringer ist in Ansehung derselben die Oberfläche, mit der es die Seiten, und den Boden des Rinnsaales berührt. Steigt nun das Wasser in dem Rinnsaale, so hat es zwar an den Seiten desselben eine größere Oberfläche, die seiner Bewegung zum Hindernisse ist; doch die Menge des Wassers nimmt in weit größerer Proportion zu. Destwegen ist auch seine bewegende Kraft (die das Product aus der Menge des Wassers in die Geschwindigkeit, oder dem Raum ist, dem es in gegebener Zeit durchläuft, oder doch zu durchlaufen fähig wäre, wenn es nicht gehindert würde) in eben der Proportion größer, als zuvor, wenn je die Schnelligkeit, die es durch den Fall erhalten hat, für sich selbst die nämliche verbleibt; und dessentwegen ist der Verlust der Geschwindigkeit durch den Widerstand der Ufern in Ansehung der übrigen, die ihm noch bleibt, immer geringer, je mehr das Wasser an Menge wächst. Es ist zwar ebenfalls auch wahr, daß, wenn das Wasser die Ufern übersteigt, und sich auf eine weite Fläche gießt, die Fläche des Bodens, den es berührt, in solchem Falle eben so, oder noch mehr, als die Menge des Wassers bey dem Austritte zunimmt; allein in solchem Falle kann das weit über die Ufern ausgegossne Wasser die Schnelligkeit des mittlern, das im Rinnsaale, und ober selben läuft, eben darum, weil es zu weit davon entfernt ist, keines wegs mehr hindern. Es wird zwar das ausgestoßne Wasser selbst in solchem Falle langsam laufen, oder gar an ein und andern Orten ruhig stehen; aber das mittlere wird zwischen selben gleich als Ufern hinweg fließen: gar vieles zu dieser seiner Schnelligkeit wird auch die weitere Entfernung desselben von dem Boden des Rinnsaales, an welchem gemeiniglich (wie es Bellidor selbst zu Ende des 978s. anmerket) am meisten widerstanden wird, beptragen.

39.

Die andere Erfahrung, die den Herrn Bellidor in seiner Meinung stärkte, ist; daß die Flüße den Boden ihres Rinnsaales in der

der Mitte aushöhlen, und insgemein ihrem Rinnsaale die Gestalt eines umgekehrten Gewölbes geben; wir müssen also wohl auch dieses erklären, um unsern Satz von der Gestalt der Däme zu bestätigen.

Gesezt, es bestehe anfänglich die Gestalt des Rinnsaales aus dreyen ebenen Flächen (Fig. 9.) dem Horizontalen Boden AB nämlich, und der perpendicularen Seiten DA und EB . Es sey das Erdreich, aus welchem sie bestehen, von gleicher Art, und nicht so hart, daß es der Fluß nicht angreifen könne, so sage ich, es werde diese Gestalt keine dauer haben; es wird nach und nach die Bewegung des Strommes auch nach meinen Grundsätzen ihm die Gestalt eines umgekehrten Gewölbes geben. (Fig. 10.) denn das Wasser in den Ecken bey A und B leidet vielmehr Widerstand, als das Mittlere bey C , weil bey A und B nicht nur der Boden, sondern auch die Seiten, oder vielmehr die an dem Boden und an den Seiten hervorragenden Theile widerstehen, in C aben nur der Boden, und das, was an selben hervorraget, allein. Es wird also das Wasser mitten in dem Boden des Rinnsaales bey C schneller als an den Seiten bey A und B fließen, und eden darum den Boden mit größeren Kräften stoßen; mehr auswehen, und mehr vertiefen: entgegen der ausgegrabene Sand, und auch jener, den es anders woher mit sich den Stromm herunter führt, wird sich in den Ecken bey A und B wo die langsamste Bewegung des Wassers ist, setzen, und also muß das Rinnsaal nothwendig die Gestalt eines umgekehrten (Fig. 10.) Gewölbes erhalten. Wenn das Wasser durch seinen Stoß, den es auf die Seiten thut, und jene gegen selbes nur in so weit wirketen, als weit sie etwas horizontales haben, würde das Wasser in der Mitte bey C nicht viel geschwinder, als in demselben bey A und B fortfließen, weil der Boden überall der nämliche ist; die Senkrechten Seiten aber keine Böschung haben, und also nach Bellidors Grundsätzen nicht merklich dem Stromm widerstünden. Warum sollte er ihn denn alsdann

ein führet, zu stark auf die andere Seite. In dem Winkel aber vor einem solchen Einbaue geht das Wasser zurück, und macht einen Wirbel, der die Ufern zerreißt. Er bricht deswegen lieber die Gewalt mit Strichzäunen, und Strommkörben, und zwar was seine Strichzäune anbelangt, von welchen er in seinem Schauplaze der Wasserbaukunst vom 201 bis 207ten S. handelt, thut er wohl recht, daß er sie sehr hoch anrühmet; man wird sich derselben, wo man sie anbringen kann mit großen Vortheile, und wenigen Kosten bedienen; von den Strommkörben aber, von denen er gleich nach diesen handelt, wollte ich mir nicht zu viele Hülfe versprechen. Er hat auch völlig recht, da er rathet ein steiles Ufer BCD (Fig. 14.) welches nicht, wegen der Materie, daraus es bestehet, fest ist, gar abzustechen, und mit kleinen Zäunen und Faschinen auszufüllen, oder mit Binden zu bestecken. Denn die Einbaue an hohen, und perpendicularen Ufern, sind meistens kostbar und vergeblich. Der Eigenthums Herr verkehrt auch nichts dabey, wenn er gleich das Stück CDE in den Fluß stürzt, weil er dafür viel Buschwerke erhält, das reichlich an solchen Ufern wächst, und solche hernach so fest macht, daß sie vom Wasser keine Gefahr mehr zu leiden haben: der Stromm gewinnt auch dadurch einen geraumen Weg, und verlihet seine Kraft und sein Vermögen. Doch wird man dabey eine Behutsamkeit, wenn etwann der Stromm sehr reißend ist, in acht zu nehmen haben, von welcher wir bald handeln werden, um zu verhindern, daß nicht das abgeworfene Erdreich, ehe es noch gar den Grund erreicht, von ihm fortgeführt werde; und dieses sollte man zu hindern suchen, um den Ufern eine größere Böschung zu geben, sonst möchte es zu unterst noch untergraben werden.

55.

Der berühmte Bellidor scheint den Zungen nicht so abhold zu seyn, als ihnen Leupold ist. Er redet uns auch von Eindämmungen,

gen, die von einer Stelle zur andern können gebracht werden, von denen wir jetzt auch reden, und sie zeitliche Eindämmungen nennen wollen.

Sie lassen sich zwar besser zum Ausraumen, als Erdreich anzulegen gebrauchen, doch absonderlich in Flüssen die vielen Sand führen (am meisten wenn sie nieder sind) thun sie uns auch diesen Dienst, denn weil sie, wenn sie tiefer in den Strom hinein gehen, nächst am Ufer den Lauf des Wassers hemmen, so setzt sich Sand neben ihnen in den Winkeln *m* und *n* (Fig. 18.) ausgenommen, wenn sie ziemlich schief den Strom hinunter gehen, wie *G*, und alleine stehen, da sich zwar in *n* hinter ihnen, aber nicht vor ihnen in *m* Sand anlegen würde.

56.

Man könnte auch zeitliche Eindämmungen von Pfählen machen, die man wieder auszüge; allein sowohl das Einschlagen, als Ausziehen der Pfähle macht viel Arbeit; mit Steinen und Schlamm gefüllte Schanzkörbe können auch absonderlich an Orten, da der Fluß nicht gar zu tief ist, zu zeitlichen Eindämmungen nützlich gebraucht werden. Weil sie aber durch öfteren Gebrauch bald zerrissen werden, und weil sie neben sich, wie man sie immer stellt, viel Wasser durchlassen, so halte ich mehr auf die Pontone, und Flöße, die uns Bellidor im zweyten Theile seiner Wasserbaukunst, im dritten Buche, siebenden Kapitel, dritten Abschnitte ausführlich beschreibt. Die Flöße, welche viel weniger kosten, könnte man an Orten gebrauchen, an welchen die Gewalt des anlaufenden Wassers nicht gar zu groß, und keine besondere Tiefe desselben ist, die Pontone aber wider stärkere Anfälle des Wassers, und wo es tiefer ist. Es bestehen diese Flöße aus einem Zimmerwerke von Fichtenholze in Gestalt eines länglicht viereckigten Bodens, die man überall durch Hülfe eisener

an dem Ende befeſtigten Ringen anbinden, und vermitteltſt eichenen Pfähle aus der horizontalen in eine ſchiefe Stellung unter einem beliebigen Winkel bringen kann. Man würde aber wohl, wenn man ſie in Flüßen brauchen würde, die Seite, welche man an den Boden bringen ſollte, mit daran befeſtigten Steinen beſchweren müßen, ſonſt, wenn anders nicht ein großer Theil eines ſolchen Floßes über das Waſer heraus ſtünde, würde man die andere Seite nicht zum ſinken bringen. Die Pontone ſind große Käſten, einer prismaſtiſchen Geſtalt, deren Grundfläche eine Raute iſt, die man, wenn man ſie anders ins Waſer ſenken will, zum Theil mit Waſer, und Steinen füllt; die vollſtändige Beſchreibung, und Abbildung dieſer Maſchinen mag man in dem Bellidor ſelbſt nachſuchen.

57.

Es iſt auch nicht nothwendig, daß wir völlig bey dieſer Geſtalt der Pontone bleiben, man kann ſich auch ſolcher bedienen, deren Geſtalt ein recht winkeliſches Parallelepipedum darſtellt, das in der Länge mehr, als in der Breite hat. Iſt der Ort, da man ſie braucht nicht tief, und ſie ſo hoch, daß ſie über das Waſer herausſtehen, ſo hat man, wenn ſie mit Waſer angefüllet werden, bisweilen gar keiner Steine nöthig, ſie ſinken zu machen; und wenn man das Waſer ausſchöpft, ſteigen ſie wider empor, und laßen ſich weiter bringen. Iſt aber das Waſer tiefer, als dieſe Käſten hoch ſind, ſo würde ich die Steine nicht unmittelbar in ſie legen, ſondern Selten, oder Körbe damit erfüllen, die man darein legte, und jeden, wenn man den Kaſten wieder los machen will, beſonders heraus jdg. Ich will mich hier mit Beſchreibung der Weiſe dieſe Selten, und Körbe herauszuziehen nicht aufhalten, weil ſich ein jeder Mechaniker ſelbſt leicht eine ausdenken kann. Sollte der Kaſten, nachdem alle Steine herausgezogen worden, dennoch noch nicht ſteigen wollen, weil ſich der Sand um ihn herum zu ſehr angeleget hat, ſo müßte man ihn

zu erſt nur auf einer Seite heraus zu heben ſuchen; denn wenn nur einmal das Waſſer unter ihn hinein kommen, und durchdringen kann, ſo hebt ihn ſelbes in die Höhe, weil das Holz nicht ſo ſchwer, wie das Waſſer iſt. Um den Kaſten zu heben, darf man nur ein Schiſchen, das man zuvor zum Theil mit Waſſer angefüllet hat, oder wenn eines nicht erklecket, zwey ſolche an den Kaſten feſt anbinden, alsdenn das Waſſer aus dem Schiſchen wieder herausſchöpfen, ſo werden ſie den Kaſten heben.

§. 58.

Wenn mehrer ſolche Kaſten in einer Reihe nebeneinander hergeſetzt werden, ſo machen ſie eine Eindämmung. Den Raum zwiſchen ihnen kann man auf verſchiedene Art verſchließen, damit das durchziehende Waſſer nicht vielen Schlamm wegführe; z. B. man könnte an den Kaſten *AC* (Fig. 13.) eine Thüre anmachen, die angienge, welche an den nächſtſtehenden Kaſten von den dagegen fließenden Stromme ſelbſt hingedrückt würde, und dem Waſſer den Durchgang dazwiſchen, doch zwar nicht gar genug verſchloſſe.

59.

Iſt der Fluß an dem Orte, da man mit Kaſten einen zeitlichen Einbau machen will, ſo tief, daß es zu koſtbar wäre, Kaſten von ſolcher Höhe zu machen, die bis über das Waſſer hinauf gehen würden, ſo ſetzt man ſie Anfangs auf den Boden *EF* (Fig. 20.) in einer Reihe, welche die Direction des Strommes beynahe ſenkrecht durchſchneidet, nacheinander her, ſo wird ſich vor ihnen, und auch hinter ihnen Sand anſetzen; es wird ſich vor der Reihe *A* ein

Q q q 2

Hü

(*) Die Figur ſtellt das Proſilrot nach dem Durchſchnitt, der dem Stromme parallel iſt.

Hügel C gestalten, und ein anderer kleiner G hinter selber. (*) Hebt man darnach die Kästen heraus, und setzt sie hinter den Hügel G in B, so werden die Gruben vor B mit Schlamm erfüllet; fährt man fort die Kästen immer weiter den Strom hinunter zu setzen, so wird man vom Schlamme einen erhabten Boden *m n* bekommen; alsdenn (Fig. 21.) kann man die Kästen auf diesen Boden setzen, und es wird sich wieder Schlamm vor den Kästen A, in D, und hinter ihnen sammeln. Setzt man sie darnach in B, werden wieder die Gruben vor B ausgefüllet, und wenn man sie also den Strom hinunter immer weiter zurücke setzt, bekommt man eine zweyte Lage von Schlamm, und also kann man fortfahren eine Lage über die andere bis an die Oberfläche des Wassers zu erhalten. Diese Lagen aber werden nicht gleich so hoch werden, als sie hier nach Proportion der Kästen vorgestellt werden, ausgenommen, wenn das Wasser gar viel Sandes führt. Ich rathe aber, daß man sie nicht so lang an einem Orte stehen läßt, bis der Schlamm sich schon höher angesetzt hat. Dieses würde, wenn der Fluß nicht gar zu vielen Sand führt, zu lang hergehen, sondern nachdem eine merkliche Lage sich angesetzt hat, rückt man weiter mit den Kästen; werden gleich also jede Lagen vom Sande und Schlamme nicht so hoch, so werden wir doch bald eine aus vielen zusammengesezte hohe Lage bekommen, denn je höher die Kästen über den Boden empor steigen, je mehrer Sand setzt sich; wenn aber der Sand schon hoch an den Kästen ist, vermindern sie die Geschwindigkeit des Wassers nicht mehr so sehr, und setzt sich also weniger Sand in einer bestimmten Zeit. Man kann also auch ohne gar zu hohe Kästen zu haben, durch dergleichen zeitliche Eindämmungen, an den schwachen, und zimlich steilen Ufern nach und nach Schlamm anlegen, der sie beschützet, und wenn man zugleich auf der andern Seite, oder mitten im Flusse auf dem Boden ausräumt, daß das Wasser nicht gequelllet werde, seine Gestalt, die es sonst wider diese Ufern ausübte, brechen. Damit die Kästen, wenn sie ganz unter das

Wa-

Wasser kommen, nicht selbst mit Schlamm erfüllet werden, und also darnach schwer zu heben seyn, kann man sie mit Deckeln versehen, welche aber mit Steinen beschweret seyn müssen, daß sie das Wasser nicht aufhebe. Oft wird es auch gut oder nöthig seyn, unter die Kästen pfähle einzuschlagen, daß sie der gar zu schnell fließende Strom nicht umwerfe, oder mit sich fortreisse.

60.

Sollte der Fluß wenig Sand führen, und es derowegen lang hergehen, bis man durch Hilfe der beweglichen Eindämmungen so viel Schlamm vor das Ufer, so man damit beschützen will, hinbrächte, als nöthig wäre, selbes genug zu bewahren; so würde man entweder anderswoher Erde auf dem Wasser zuführen, oder wie wir oben S. 54. angemerkt haben, selbst das Ufer abstechen müssen, um Erde zu bekommen, mit welcher man die Füllung machte, oder man müßte gleichwohl nur mit einer Ueberkleidung (S. 46.) sich zu beschützen suchen.

61.

Aber auch, wenn man mit hinuntergeworfner Erde dem Ufer eine starke Böschung geben wollte, würde eine zeitliche Eindämmung zu verhindern dienlich seyn, daß nicht das hinuntergeworfene Erdreich gleich wieder von dem Stromme fortgeführt würde. Ich würde also Anfangs den untersten Theil, die Böschung zu machen die Kästen a, a, a, b, b , wie die 22. Figur weiset, auf dem Boden setzen, und hinter ihnen die Erde hinein stürzen. Wenn der Fluß so gewaltig wäre, daß er sie im hinunterfallen wegführte, könnte man sie nicht durch ein viereckigtes weites hölzernes Rohr hinunter fallen lassen & nachdem also ein Theil der untersten Lage A gemacht wäre: wurde ich die Kästen weiter den Stromm hinunter, und in m, m, m setzen, alsdann wurden sie in n, n, n , gesetzt, und C gefüllet werden, und

Also würden wir immer weiter den Stromm hinunter rücken. Wäre einmal die erste Lage des Vorbaues also zu Stande gebracht, so wurde auf eine fast ähnliche Art die zweyte schmälere, und auf diese die dritte noch schmälere, und so immer eine auf die andere aufgesetzt werden, bis wir endlich an die Oberfläche C (Fig. 14.) hinaufkriechen. Mit dem Rasen, die ich zuvor von DE würde abgelöst haben, ließ sich ein Theil der abhängigen Fläche CE bedecken, den übrigen könnte man mit Samen bestellen, um bald einen neuen Rasen darauf zu haben, oder Buschwerk zu zügelu.

62.

Nachdem ich das steile Ufer also mit einem Vorbaue von Erde bewahrt hätte, könnte ich alsdenn, wenn es nöthig wäre, noch eine Ueberkleidung, wovon wir S. 46. oben gehandelt haben) von Erde und Faschinen darüber anbringen, die man sonst an einem so steilen Ufer nicht hätte anbauen können, oder es obenher mit Bäumen versehen.

63.

Wir haben nun gezeigt, wie die zeitlichen Eindämmungen Schlamm anzulegen und die Ufern zu beschützen dienen, woraus man leicht einsehen wird, daß sie die Einrisse wieder auszuflicken nützen können. Gesezt es habe der Fluß einen Theil des Ufers (Fig. 18.) in der Gegend C verrissen, sezt man ein paar (oder wenn es nöthig ist mehrere) zeitliche Eindämmungen hin, so wird sie der Schlamm, welcher sich an selbe und zwischen ihnen ansetzt, wieder ergänzen. Zu beständigen Eindämmungen aber, welche nämlich bleiben müssen, würde ich mich, da immer noch anders zu helfen wäre, gewiß nicht entschließen: Ich will mich doch die Noth dringen, dieses zu thun, so würde ich, was beständig unter dem Wasser bleibt, meistens vom Holze bauen, und auf diesem Grund den Damm von Erde sezen, der wenn er sehr schief

schief geneigt seyn könnte, nur mit Rasen, und unter selben mit einer festen Erde, sonst aber, wenn er den Platz zu gewinnen steil seyn müßte, mit Steinen würde überkleidet seyn, wodurch man ein zwar auf einmal kostbares, aber immer dauerndes Werk erhielt.

64.

Ich habe nun von Bewahrung der Ufern durch Anbau, oder Anlegung des Schlammes, und Ueberkleidungen genug gesagt. Es ist Zeit, daß wir auch von dem Ausraumen reden, als einem Mittel, welches sowohl die Ströme in ihren Ufern, als die Ufern selbst in gutem Stande zu erhalten, sehr dienlich, und gemeiniglich, wenigstens nach den Anweisungen, die ich jetzt geben werde, viel weniger kostbar ist, als das Vorbauen. Wir wollen also zu erst sehen, wo das Ausraumen nützlich oder nöthig sey, alsdann, wie es vorgenommen werden soll: dabey werde ich auch etwas wenig von Grabung neuer Rinnfäle, und Einföhlung der Gruben einmischen.

65.

Erstlich dienet das Ausraumen die Schnelligkeit des Flusses zu vermehren, da man die Hindernisse seiner Bewegung, sowohl auf den Boden, als an den Seiten, ohne im übrigen sein Rinnfaal zu erweitern, ausräumt, sonderlich wenn man zugleich die Löcher einfüllt: wodurch man schon etwas be trägt, seinem Austritt über die Gestade zu verhindern: macht man aber sein Rinnfaal mit Ausräumen viel größer, als es zuvor war, so wird es in einigen Fällen wohl möglich seyn, das Austreten derselben dadurch gar zu hindern. Will man aber lieber die Schnelligkeit eines Flusses, daß er den Ufern weniger schade, vermindern, so mache man nur durch Ausräumung sein Rinnfaal sehr breit, und gebe den Ufern eine sehr große Böschung, so werden sie unüberwindlich werden; das Wasser wird wenigstens an den

Gestaden langsamer laufen, und sollte man die von selbst weggerissne Erde in die Mitte des Strommes bringen, so würde auch seine Geschwindigkeit gehemmet werden, sonst aber wäre es auch sonderlich bei einem kleinen Flüsschen möglich, daß durch Erweiterung des Rinnsales die Geschwindigkeit des mittleren Wassers mehr wegen gehobenen Hindernissen des Laufes zunimmt, als wegen verminderter Quellung abnimmt. Der äußerste Theil der Ufern eines also erweiterten Rinnsales, welcher nur zu Zeiten unter Wasser steht, wird wohl noch mit Rasen können bedeckt werden, und Gras tragen, welches man, wenn es schon ziemlich groß ist, und der anwachsende Fluß schon darüber herkommen wollte, geschwind abbrechen, und weiter von dem Wasser wegrücken soll.

66.

Nichts ist den Ufern schädlicher als die hin und wieder hervorstechenden, und bisweilen weit in den Fluß hinein sich erstreckenden Stücke, als z. B. A ist (Fig. 24.) sie quellen wenn sie groß sind, das Wasser, und stoßen es mit Gewalt auf die andere Seite, und treiben es vor sich in einem Wirbel, der die Ufer zerreißt. Sie sind nemlich schädliche Eindämmungen (S. 54.) die man vertilgen muß.

67.

Sind die von den Ufern hervorstechenden Theile zwar nicht groß, aber viel an der Zahl, so hemmen sie wenigstens den Lauf des Wassers, und reißet der Stromm ober ihnen kleine Vertiefungen ein, bis sie endlich selbst abgerissen werden, und auch gar oft weiter in die Ufern hineingehende Stücke, mit denen sie fest zusammen hängen, mit sich reißen. Raumet man nun diese Stücke mit Instrumenten weg, und ebnet die Ufern, so haben sie hinfüro von der Gewalt des Strommes weniger zu leiden, und halten das Wasser weniger auf.

68.

Was ich aber für den wichtigsten Vortheil des Ausraumens halte, ist, daß man damit selbst die Direction des Flusses ändern, und die Gewalt, mit der er eine Seite bestürmet, davon abwenden kann: denn da die Direction eines Strommes großen Theils von der Gestalt seines Rinnsaales abhängt, so kann man durch die Veränderung desselben auch die Direction des Strommes ändern. Schaffe man nur die Inseln aus dem Wege, von denen das Wasser gegen eine Seite des Ufers hingetrieben wird, so wird selbes alsobald weniger zu leiden haben; denn es wird nicht mehr so sehr daran hinstoßen. Vertiefe man das Rinnsaal auf der Seite, auf der es höher, als auf der andern ist, und verschaffe man, daß es die größte Tiefe in der Mitte hat, so erlangt es in der Mitte die größte Geschwindigkeit, und wirft den Schlamm gegen die Seiten zu, und auf solche Weise wird die Direction des Wassers gerade für sich gehen, und keine Seite davon zu sehr verletzet werden. Es wird sogar gut seyn, wenn der Strom auf eine Seite *A* (Fig. 25.) zustößt, an der entgegen gesetzten *B* ihn mehr zu vertiefen; man hemmt dadurch die Gewalt des Anstoßes, theils weil also die Geschwindigkeit des Wassers durch die Erweiterung des Rinnsaales vermindert wird, theils weil das von der andern Seite zurückgeprägte Wasser leichter ausweicht. Es würde aber noch besser seyn, wenn man auf der Seite *A* gegen die das Wasser stößt, Schlamm anlegete, da man an der entgegen gesetzten ausräumt, so würde sie desto stärker, und die Schnelligkeit des Wassers an selber, und folglich auch die Gewalt des Anstoßes vermindert.

69.

Absonderlich aber muß man um das Wasser nicht zu sehr zu messen, wenn man auf einer Seite Erde, oder einen Damm anlegen will,

ein führet, zu stark auf die andere Seite. In dem Winkel aber vor einem solchen Einbaue geht das Wasser zurück, und macht einen Wirbel, der die Ufern zerreiſt. Er bricht deſſwegen lieber die Gewalt mit Strichzäunen, und Strommkörben, und zwar was ſeine Strichzäune anbelangt, von welchen er in ſeinem Schauplaze der Waſerbaukunft vom 201 bis 207ten S. handelt, thut er wohl recht, daß er ſie ſehr hoch anrühmet; man wird ſich derſelben, wo man ſie anbringen kann mit großen Vortheile, und wenigen Koſten bedienen; von den Strommkörben aber, von denen er gleich nach dieſen handelt, wollte ich mir nicht zu viele Hülfe verſprechen. Er hat auch völlig recht, da er rathet ein ſteiles Ufer *BCD* (Fig. 14.) welches nicht, wegen der Materie, daraus es beſtehet, feſt iſt, gar abzustoßen, und mit kleinen Zäunen und Faſchinen auszufüllen, oder mit Binden zu beſtecken. Denn die Einbaue an hohen, und perpendicularen Ufern, ſind meistentheils koſtbar und vergeblich. Der Eigenthums Herr verſieht auch nichts dabey, wenn er gleich das Stück *CDE* in den Fluß ſtürzet, weil er dafür viel Buſchwerke erhält, das reichlich an ſolchen Ufern wächst, und ſolche hernach ſo feſt macht, daß ſie vom Waſer keine Gefahr mehr zu leiden haben: der Stromm gewinnt auch dadurch einen geraumen Weg, und verliert ſeine Kraft und ſein Vermögen. Doch wird man dabey eine Behuſamkeit, wenn etwann der Stromm ſehr reiſſend iſt, in acht zu nehmen haben, von welcher wir bald handeln werden, um zu verhindern, daß nicht das abgeworfene Erdreich, ehe es noch gar den Grund erreicht, von ihm fortgeführt werde; und dieſes ſollte man zu hindern ſuchen, um den Ufern eine größere Böſchung zu geben, ſonſt möchte es zu unterſt noch untergraben werden.

55.

Der berühmte Bellidor ſcheint den Zungen nicht ſo abhold zu ſeyn, als ihnen Leupold iſt. Er redet uns auch von Eindämmungen,

71.

Manchesmal geschieht es auch, daß ein Stromm durch einen schwachen sandigten Boden, und niederes Land fließt, da er mit seinem Austritte über die Ufern und beständiger Veränderung derselben immer viel Unheil anstellet. Sollte es nun in solchem Falle etwas leichter seyn, ihn anderswo durch, da das Erdreich fester ist, und die Ufern nicht so leicht können überstiegen werden, auch die Austritte weniger Schaden anrichteten, ein neues Rinnsaak zu graben, so würde es der Mühe werth seyn, wenigst die Sache zu untersuchen, und zu überlegen, und endlich, wenn man findet, daß der Nutz solcher Arbeit größer sey, als die Kosten, so darauf zu verwenden sind, auch wirklich selbe zu unternehmen.

72.

Wir wenden uns nun zur Arbeit des Ausraumens selbst, die Arbeit des Menschen ist kostbarer, als die des Viehes, wir ersparen also etwas, wenn wir die Sache so angehen, daß die Arbeit, welche sonst Menschen verrichten müßten durch Pferde oder Ochsen könne verrichtet werden, wenn nur die Maschinen, wodurch wir dieses erhalten, nicht gar zu kostbar werden. Aber noch besser ist es, wenn wir den Fluß selbst arbeiten machen, und am besten, wenn auch die Weise ihn dazu zu zwingen nicht gar zu kostbar wird, und wirklich der fürtreffliche Herr Bellidor in seiner hydraulischen Architektur, zweyten Theile, 4ten Buch, 1ten Kapitel, 3ten Abschnitts, No. 1015. lehret uns, wie wir die Kraft des fließenden Wassers selbst durch Hülfe der zeitlichen Eindämmungen zum Ausraumen gebrauchen können. Es sey also *H* (Fig. 18.) eine Insel mitten in dem Stromme, setzen wir zwei zeitliche Eindämmungen *D* und *G* an die Ufern, so wird das also gequellte Wasser zwischen ihnen, und der Insel mit größerer Schnelligkeit, und Gewalt durchlaufen, und nach und nach die Insel verzehren.

an dem Ende befeſtigten Ringen anbinden, und vermitteltſt eichenen Pfähle aus der horizontalen in eine ſchiefe Stellung unter einem beliebigen Winkel bringen kann. Man würde aber wohl, wenn man ſie in Flüſſen brauchen würde, die Seite, welche man an den Boden bringen ſollte, mit daran befeſtigten Steinen beſchweren müſſen, ſonſt, wenn anders nicht ein großer Theil eines ſolchen Floſſes über das Waſer heraus ſtünde, würde man die andere Seite nicht zum ſinken bringen. Die Pontone ſind große Käſten, einer priſmatiſchen Geſtalt, deren Grundfläche eine Raute iſt, die man, wenn man ſie anders ins Waſer ſenken will, zum Theil mit Waſer, und Steinen füllt; die vollſtändige Beſchreibung, und Abbildung dieſer Maſchinen mag man in dem Bellidor ſelbſt nachſuchen.

57.

Es iſt auch nicht nothwendig, daß wir völlig bey dieſer Geſtalt der Pontone bleiben, man kann ſich auch ſolcher bedienen, deren Geſtalt ein recht winkeliſches Parallelepipedum darſtellt, das in der Länge mehr, als in der Breite hat. Iſt der Ort, da man ſie braucht nicht tief, und ſie ſo hoch, daß ſie über das Waſer herausſtehen, ſo hat man, wenn ſie mit Waſer angefüllet werden, bisweilen gar keiner Steine nöthig, ſie ſinken zu machen; und wenn man das Waſer ausſchöpft, ſteigen ſie wider empor, und laſſen ſich weiter bringen. Iſt aber das Waſer tiefer, als dieſe Käſten hoch ſind, ſo würde ich die Steine nicht unmittelbar in ſie legen, ſondern Gelten, oder Körbe damit erfüllen, die man darein legte, und jeden, wenn man den Kaſten wieder los machen will, beſonders heraus jdg. Ich will mich hier mit Beſchreibung der Weiſe dieſe Gelten, und Körbe herauszuziehen nicht aufhalten, weil ſich ein jeder Mechaniker ſelbſt leicht eine ausdenken kann. Sollte der Kaſten, nachdem alle Steine herausgezogen worden, dennoch noch nicht ſteigen wollen, weil ſich der Sand um ihn herum zu ſehr angeleget hat, ſo müßte man ihn

, 75.

Felsigte Böden, und felsigte Ufer würden wohl lange Zeit durch das Wehen des Wassers, wenn man gleich seine Schnelligkeit gar sehr vermehrte, nicht vernütet werden: aber man kann sie auch unter dem Wasser bohren, und mit Pulver zersprengen nach der Art, wie sie der Herr Leupold in seinem Hydrotechnischen Theater, oder Schauplatz der Wasserbaukunst S. 165, wohin ich den Leser verwiesen haben will, lehret. Die abgesprengten Felsenstücke, und andere Steine aus dem Wasser herauszuheben giebt er S. 166. eine Zange an, die dazu sehr dienlich ist, und mit seinem Lavenräumer lehrt er uns 170. S. den Schlammlaus heraus zu ziehen, und in ein Schiff einzuladen, darinnen man ihn weiter führen kann; doch ist es eine mühsame Arbeit, die von Menschen muß verrichtet werden.

76.

Hat man keine Felsen, sondern nur anders hartes Erdreich und Kies auszuräumen, so giebt uns Leupold S. 81. auch ein dienliches Instrument, so von Menschen zu gebrauchen ist; aber sein starker Pflug, den er S. 82. beschreibt, läßt sich wo das Wasser nicht tief ist, wohl noch auch unter dem Wasser gebrauchen, und von Pferden ziehen; und wir werden gleich zeigen, wie man ihn und andere dergleichen Maschinen, die man sonst durch Pferde zöge, selbst von dem Wasser könnne ziehen lassen, welches an Orten, da man mit Pferden nicht könnnte zukommen nur desto besser angeht. Man könnnte ihn aber auch ohne Pflugstelzen tief unter dem Wasser gebrauchen, wenn man den Baum, oder die Deichsel, damit er sich nicht so leicht zur Seite wende, sehr lang machte, und damit er nicht gar zu tief gerissen, oder umgeworfen wurde, eine Achse mit zweyen Rädern, die fast mitten ober der Maschine durchgieng, daran befestigte.

Also würden wir immer weiter den Strom hinunter rücken. Wäre einmal die erste Lage des Vorbaues also zu Stande gebracht, so wurde auf eine fast ähnliche Art die zweyte schmälere, und auf diese die dritte noch schmälere, und so immer eine auf die andere aufgesetzt werden, bis wir endlich an die Oberfläche *C* (Fig. 14.) hinaufkriechen. Mit dem Rasen, die ich zuvor von *DE* würde abgelöst haben, ließ sich ein Theil der abhängigen Fläche *CE* bedecken, den übrigen könnte man mit Samen bestellen, um bald einen neuen Rasen darauf zu haben, oder Buschwerk zu zügel.

62.

Nachdem ich das steile Ufer also mit einem Vorbaue von Erde bewahrt hätte, könnte ich alsdenn, wenn es nöthig wäre, noch eine Ueberkleidung, wovon wir S. 46. oben gehandelt haben) von Erde und Faschinen darüber anbringen, die man sonst an einem so steilen Ufer nicht hätte anbauen können, oder es obenher mit Zäunen versehen.

63.

Wir haben nun gezeigt, wie die zeitlichen Eindämmungen Schlamm anzulegen und die Ufer zu beschützen dienen, woraus man leicht einsehen wird, daß sie die Einrisse wieder auszufüllen nützen können. Gesezt es habe der Fluß einen Theil des Ufers (Fig. 18.) in der Gegend *C* verrissen, sezt man ein paar (oder wenn es nöthig ist mehrere) zeitliche Eindämmungen hin, so wird sie der Schlamm, welcher sich an selbe und zwischen ihnen anleget, wieder ergänzen. Zu beständigen Eindämmungen aber, welche nämlich bleiben müssen, würde ich mich, da immer noch anders zu helfen wäre, gewiß nicht entschließen: s. Ute mich doch die Noth dringen, dieses zu thun, so würde ich, was beständig unter dem Waßer bleibt, meistens vom Holze bauen, und auf diesem Grund den Damm von Erde sezen, der wenn er sehr schief

schief geneigt seyn könnte, nur mit Rasen, und unter selben mit einer festern Erde, sonst aber, wenn er den Platz zu gewinnen steil seyn müßte, mit Steinen würde überkleidet seyn, wodurch man ein zwar auf einmal kostbares, aber immer daurendes Werk erhielt.

64.

Ich habe nun von Bewahrung der Ufern durch Anbau, oder Anlegung des Schlammes, und Ueberkleidungen genug gesagt. Es ist Zeit, daß wir auch von dem Ausraumen reden, als einem Mittel, welches sowohl die Ströme in ihren Ufern, als die Ufern selbst in gutem Stande zu erhalten, sehr dienlich, und gemeiniglich, wenigstens nach den Anweisungen, die ich jetzt geben werde, viel weniger kostbar ist, als das Vorbauen. Wir wollen also zu erst sehen, wo das Ausraumen nützlich oder nöthig sey, alsdann, wie es vorgenommen werden soll: dabey werde ich auch etwas wenigens von Grabung neuer Rinnfälle, und Einführung der Gruben einmischen.

65.

Erstlich dienet das Ausraumen die Schnelligkeit des Flusses zu vermehren, da man die Hindernisse seiner Bewegung, sowohl auf den Boden, als an den Seiten, ohne im übrigen sein Rinnfaal zu erweitern, ausräumt, sonderlich wenn man zugleich die Löcher einfüllt: wodurch man schon etwas be trägt, seinem Austritt über die Gestade zu verhindern: macht man aber sein Rinnfaal mit Ausräumen viel größer, als es zuvor war, so wird es in einigen Flüssen wohl möglich seyn, das Austreten derselben dadurch gar zu hindern. Will man aber lieber die Schnelligkeit eines Flusses, daß er den Ufern weniger schade, vermindern, so mache man nur durch Ausräumung sein Rinnfaal sehr breit, und gebe den Ufern eine sehr große Böschung, so werden sie unüberwindlich werden; das Wasser wird wenigstens an den

Se

Gestaden langsamer laufen, und sollte man die von selbst weggerissne Erde in die Mitte des Strommes bringen, so würde auch seine Geschwindigkeit gehemmet werden, sonst aber wäre es auch sonderlich bei einem kleinen Flüschen möglich, daß durch Erweiterung des Rinnfales die Geschwindigkeit des mittleren Wassers mehr wegen gehobenen Hindernissen des Laufes zunimmt, als wegen verminderter Quellung abnimmt. Der äußerste Theil der Ufern eines also erweiterten Rinnfaales, welcher nur zu Zeiten unter Wasser steht, wird wohl noch mit Rasen können bedeckt werden, und Gras tragen, welches man, wenn es schon ziemlich groß ist, und der anwachsende Fluß schon darüber herkommen wollte, geschwind abbrechen, und weiter von dem Wasser wegrücken soll.

66.

Nichts ist den Ufern schädlicher als die hin und wieder hervorragenden, und bisweilen weit in den Fluß hinein sich erstreckenden Stücke, als z. B. A ist (Fig. 24.) sie quellen wenn sie groß sind, das Wasser, und stoßen es mit Gewalt auf die andere Seite, und treiben es vor sich in einem Wirbel, der die Ufer zerreißt. Sie sind nemlich schädliche Eindämmungen (S. 54.) die man vertilgen muß.

67.

Sind die von den Ufern hervorragenden Theile zwar nicht groß, aber viel an der Zahl, so hemmen sie wenigst den Lauf des Wassers, und reißet der Stromm ober ihnen kleine Vertiefungen ein, bis sie endlich selbst abgerissen werden, und auch gar oft weiter in die Ufern hineingehende Stücke, mit denen sie fest zusammen hangen, mit sich reißen. Raumet man nun diese Stücke mit Instrumenten weg, und ebnet die Ufern, so haben sie hinfüro von der Gewalt des Strommes weniger zu leiden, und halten das Wasser weniger auf.

68.

Was ich aber für den wichtigsten Vortheil des Austräumens halte, ist, daß man damit selbst die Direction des Flusses ändern, und die Gewalt, mit der er eine Seite bestürmet, davon abwenden kann: denn da die Direction eines Strommes größten Theils von der Gestalt seines Kinnsaales abhängt, so kann man durch die Veränderung desselben auch die Direction des Strommes ändern. Schaffe man nur die Inseln aus dem Wege, von denen das Wasser gegen eine Seite des Ufers hingetrieben wird, so wird selbes alsobald weniger zu leiden haben; denn es wird nicht mehr so sehr daran hinstoßen. Vertiefe man das Kinnsaal auf der Seite, auf der es höher, als auf der andern ist, und verschaffe man, daß es die größte Tiefe in der Mitte hat, so erlangt es in der Mitte die größte Geschwindigkeit, und wirft den Schlamm gegen die Seiten zu, und auf solche Weise wird die Direction des Wassers gerade für sich gehen, und keine Seite davon zu sehr verletzet werden. Es wird sogar gut seyn, wenn der Strom auf eine Seite *A* (Fig. 25.) zufließt, an der entgegen gesetzten *B* ihn mehr zu vertiefen; man hemmt dadurch die Gewalt des Anstoßes, theils weil also die Geschwindigkeit des Wassers durch die Erweiterung des Kinnsaales vermindert wird, theils weil das von der andern Seite zurückgeprägte Wasser leichter ausweicht. Es würde aber noch besser seyn, wenn man auf der Seite *A* gegen die das Wasser fließt, Schlamm anlegete, da man an der entgegen gesetzten ausräumt, so würde sie desto stärker, und die Schnelligkeit des Wassers an selber, und folglich auch die Gewalt des Anstoßes vermindert.

69.

Absonderlich aber muß man um das Wasser nicht zu sehr zu stellen, wenn man auf einer Seite Erde, oder einen Damm anlegen will,

will, auf der andern Platz machen; und dieſes Ausräumen ſoll zuvor geſchehen, ehe man die andere Seite verſtärket, alſo z. B. geſetzt (Fig. 19.) ich wollte an der Seite *B*, auf die das Waſer ziemlich gerad zuſtößt, ſeine Gewalt zu brechen, einen Anbau bis *m n* machen, und das Waſer nach dieſer Krümmung führen, ſo würde ich zuvor das Eck *A* aus dem Wege raumen, und bis *CD* Platz machen: ſonſt würde man auch unter der Arbeit bey *B* von der allzugroßen Gewalt des aufgequellten, und auf dieſe Seite ziemlich gerad zuſtoßenden Waſers zu ſehr gehindert, es iſt alſo kein Zweifel, daß das Ausräumen, wenn es an rechten Orten vorgenommen wird, zu Erhaltung der Ufern ungemein nützlich, und bisweilen faſt nothwendig ſey.

70.

Die Wendungen eines Strommes führen ihn bisweilen durch ſolche Umwege herum, daß zween Theile ſeines Rinnſaales (Fig. 17.) *H* und *E* nahe zuſammen kommen, von deren einem *H* das Waſer nur durch einen großen Umlauf *HBCDE* in den anderen *E* kömmt. In ſolchem Falle kann man nichts beſſers thun, als daß man die Theile *H* und *E*, durch einen Canal, oder durch ein mit Fleiß gegrabenes Rinnſaale *FG* vereinige, und demſelben den Weg in *BCD* durch Damme *m n* verſchließe, die ſich zwar das Waſer durch angelegten Schlamm, mit der Zeit ſelbſt machen wird, wenn es von *H* gegen *E* einen unmittelbar freyen, und nach der Direction ſeines natürlichen Laufes *AH* gerichteten gang hat. Von den nichts zu melden, daß man den Platz des vorigen Umweges gewinnt, ſo verdient ſchon die Erſparung der Unkoſten, die man das Waſer in dieſen großen und ſo oft gebogenen Umwegen in ſeinen Ufern zu erhalten, beſtändig machen müßte; die Mühe den Canal *FG* zu führen, noch dazu wird die Schiffart dadurch ſehr erleichtert; derowegen ſoll man in ſolchem Falle ohne Bedenken ſolche Arbeit vornehmen.

71.

Manchesmal geschieht es auch, daß ein Stromm durch einen schwachen sandigten Boden, und niederes Land fließt, da er mit seinem Austritte über die Ufern und beständiger Veränderung derselben immer viel Unheil anstellet. Sollte es nun in solchem Falle etwas leichter seyn, ihn anderswo durch, da das Erdreich fester ist, und die Ufern nicht so leicht können überstiegen werden, auch die Austritte weniger Schaden anrichteten, ein neues Rinnsaak zu graben, so würde es der Mühe werth seyn, wenigst die Sache zu untersuchen, und zu überlegen, und endlich, wenn man findet, daß der Nuß solcher Arbeit größer sey, als die Kosten, so darauf zu verwenden sind, auch wirklich selbe zu unternehmen.

72.

Wir wenden uns nur zur Arbeit des Ausraumens selbst, die Arbeit des Menschen ist kostbarer, als die des Viehes, wir ersparen also etwas, wenn wir die Sache so angehen, daß die Arbeit, welche sonst Menschen verrichten müßten durch Pferde oder Ochsen könne verrichtet werden, wenn nur die Maschinen, wodurch wir dieses erhalten, nicht gar zu kostbar werden. Aber noch besser ist es, wenn wir den Fluß selbst arbeiten machen, und am besten, wenn auch die Weise ihn dazu zu zwingen nicht gar zu kostbar wird, und wirklich der fürtreffliche Herr Bellidor in seiner hydraulischen Architektur, zweyten Theile, 4ten Buch, 1ten Kapitel, 3ten Abschnitts, No. 1015. lehret uns, wie wir die Kraft des fließenden Wassers selbst durch Hülfe der zeitlichen Eindämmungen zum Ausraumen gebrauchen können. Es sey also *H* (Fig. 18.) eine Insel mitten in dem Stromme, setzen wir zwey zeitliche Eindämmungen *D* und *G* an die Ufern, so wird das also gequellte Wasser zwischen ihnen, und der Insel mit größerer Schnelligkeit, und Gewalt durchlaufen, und nach und nach die Insel verzehren.

will, auf der andern Platz machen; und dieſes Ausräumen ſoll zuvor geſchehen, ehe man die andere Seite verſtärket, alſo z. B. geſetzt (Fig. 19.) ich wollte an der Seite *B*, auf die das Waſer ziemlich gerad zuſtößt, ſeine Gewalt zu brechen, einen Anbau bis *m n* machen, und das Waſer nach dieſer Krümmung führen, ſo würde ich zuvor das Eck *A* aus dem Wege raumen, und bis *CD* Platz machen: ſonſt würde man auch unter der Arbeit bey *B* von der allzugroßen Gewalt des aufgequellten, und auf dieſe Seite ziemlich gerad zuſtoßenden Waſers zu ſehr gehindert, es iſt alſo kein Zweifel, daß das Ausräumen, wenn es an rechten Orten vorgenommen wird, zu Erhaltung der Ufern ungemein nützlich, und bisweilen faſt nothwendig ſey.

70.

Die Wendungen eines Strommes führen ihn bisweilen durch ſolche Umwege herum, daß zweyen Theile ſeines Rinnſaales (Fig. 17.) *H* und *E* nahe zuſammen kommen, von deren einem *H* das Waſer nur durch einen großen Umlauf *HBCDE* in den anderen *E* kömmt. In ſolchem Falle kann man nichts beſſers thun, als daß man die Theile *H* und *E*, durch einen Canal, oder durch ein mit Fleiß gegrabenes Rinnſaale *FG* vereinige, und demſelben den Weg in *BCD* durch Damme *m n* verſchließe, die ſich zwar das Waſer durch angelegten Schlamm, mit der Zeit ſelbſt machen wird, wenn es von *H* gegen *E* einen unmittelbar freyen, und nach der Direction ſeines natürlichen Laufes *AH* gerichteten gang hat. Von den nichts zu melden, daß man den Platz des vorigen Umweges gewinnt, ſo verdient ſchon die Erſparung der Unkoſten, die man das Waſer in dieſen großen und ſo oft gebogenen Umwegen in ſeinen Ufern zu erhalten, beſtändig machen mußte; die Mühe den Canal *FG* zu führen, noch dazu wird die Schiffart dadurch ſehr erleichtert; derowegen ſoll man in ſolchem Falle ohne Bedenken ſolche Arbeit vornehmen.

, 75.

Felsigte Böden, und felsigte Ufer würden wohl lange Zeit durch das Wehen des Wassers, wenn man gleich seine Schnelligkeit gar sehr vermehrte, nicht vernütet werden: aber man kann sie auch unter dem Wasser bohren, und mit Pulver zer Sprengen nach der Art, wie sie der Herr Leupold in seinem Hydrotechnischen Theater, oder Schauplatz der Wasserbaukunst S. 165, wohin ich den Leser verwiesen haben will, lehret. Die abgesprengten Felsenstücke, und andere Steine aus dem Wasser herauszuheben giebt er S. 166. eine Zange an, die dazu sehr dienlich ist, und mit seinem Lavenräumer lehrt er uns 170. S. den Schlammlaus heraus zu ziehen, und in ein Schiff einzuladen, darinnen man ihn weiter führen kann; doch ist es eine mühsame Arbeit, die von Menschen muß verrichtet werden.

76.

Hat man keine Felsen, sondern nur anders hartes Erdreich und Kies auszurdümen, so giebt uns Leupold S. 81. auch ein dienliches Instrument, so von Menschen zu gebrauchen ist; aber sein starker Pflug, den er S. 82. beschreibt, läßt sich wo das Wasser nicht tief ist, wohl noch auch unter dem Wasser gebrauchen, und von Pferden ziehen; und wir werden gleich zeigen, wie man ihn und andere dergleichen Maschinen, die man sonst durch Pferde zöge, selbst von dem Wasser könne ziehen lassen, welches an Orten, da man mit Pferden nicht könnte zukommen nur desto besser angeht. Man könnte ihn aber auch ohne Pflugstelzen tief unter dem Wasser gebrauchen, wenn man den Baum, oder die Deichsel, damit er sich nicht so leicht zu Seite wende, sehr lang machte, und damit er nicht gar zu tief gerissen, oder umgeworfen wurde, eine Achse mit zweyen Rädern, die fast mit den ober der Maschine durchgieng, daran befestigte.

77.

Den Schlamm unter dem Waſſer locker zu machen, daß alsdann ihn der Stromm ſelber fortführt, findet man in Des Herrn Leupolds Theater auf der XXIII. Tabelle verſchiedene Inſtrumente; aber auch eine gemeine Ege mit eiſernen Zähnen, die man mit daran befeſtigten Steinen beſchwerte, weil ſie ſonſt unter dem Waſſer, da das Holz, welches ringer, denn das Waſſer iſt, aufwärts treibet, nicht genug eingreifen würde, könnte hiezu dienlich ſeyn. Man könnte alſo daran eine Druhe anmachen, die man mit Steinen anfüllte.

78.

Um zugleich den Sand, und Schlamm von dem Boden wegzureiſſen, und weiter zu bringen, im Falle, da es der Fluß wegen langſamer Bewegung des Waſſers ſelbſt zu thun nicht im Stande wäre, ließen ſich noch verſchiedene Maſchinen erdenken. Ich will es hier wagen, dazu dienliche von meiner Erfindung anzugeben, welche, wenn ſie etwann noch nicht ihre gehörige Vollkommenheit haben ſollen wenigſt Gelegenheit geben können, vollkommnere zu erdenken.

79.

Man ſeze (Fig. 26.) zwiſchen parallelen ſtarken Seitenſtützen AB , AB einige Brettchen E , E , E , 2c. deren unterſte Seite mit ſchneidenden Eiſen K , K , K beſchlagen ſey. Vor ihnen gehe parallel mit dieſen Brettchen das Holz CD , welches man den Rechen nennen könnte, in welches eine Reihe eiſerner Meſſer die Erde zu durchſchneiden ſenkrecht auf den Boden, oder unten zurückgeneigt, daß ſie ſchief einſchneiden, eingeſetzt, und mit Schraubenmüttern befeſtigt ſeyen. Die ſchneidenden Eiſen K , K gehen gähling einen halben Zoll tiefer als die Seitenwände AB , AB , und die Meſſer ſchneiden noch ein wenig tiefer in die Erde ein. Die Figur G iſt das Profil des

des Holzes, indem die Messer *H* eingesetzt, und wenigst 6. bis 8. Zolle je eines von dem andern, daß die Steine ausweichen können, entfernt sind. Es fiel mir, nachdem ich die 26te Figur schon gezeichnet hatte, ein, daß es besser sey, die Deichsel (Fig. 27.) *L M* aus ein besonderes Holz *m n*, welches mit zween Zapfen, als Achsen innerhalb den Seitenwänden *AB*, *AB* in runden Löchern oder Pfannen beweglich sey, als an das Holz *CD* zu befestigen; weil es also nicht nöthig seyn wird, die Achse wie in der 26. Figur bey *P* abzugliedern, und so wird sie diese Schleife gerader fortziehen: wozu es auch dienen wird, die Deichsel *L M* lang zu machen.

80.

Fährt man nun mit dieser Schleife (Fig. 26.) ober oder unter dem Wasser über einen Boden daher, zerschneiden die Messer die Erde mit kleinen parallelen Einschnitten, die Eisen *K K* scharren sie auf, und die aufgescharrte Erde, oder der Sand wird zwischen die Brettchen *E, E*, hineingeschoben (daß vorderste *F* dient nur zu verhindern, daß die von dem ersten Brettchen *E* abgeschabte Erde nicht alle vor dem Rechen *CD* bleibe). Der Raum zwischen den Brettchen *E, E, E*, *ic.* wird endlich mit Erde und Sand erfüllet, und die Maschine wird immer schwerer, und muß endlich ausgelehret werden. Je härter die Erde ist, über die man damit herfährt, je weniger schaben die Eisen, *K, K*, ab; und je länger also kann man damit fortfahren, bis der Raum zwischen den Brettchen voll wird. Wenn aber die Erde lind oder sandigt ist, so daß sie leicht zerschabet werden kann, so kann man nicht weit mit dieser Maschine kommen, ohne daß man sie wieder ausleeren muß: zwar wenn man die Seiten *AB*, *AB* höher machte und vornen und hinten mit einem Brett schloße, so könnte dieser Kasten mehr Erde fassen, aber es geht auch immer schwerer her, daß die Erde zwischen die Brettchen hineingeschoben werden je mehr schon darinnen ist, so von der nachkommenden muß vor sich weg

geschoben werden; deswegen kann sie nicht gar zu viel fassen. Ist diese Maschine einmal mit Sande erfüllet, so ziehe man sie mit Seilen, die in die Ringe eingemacht werden, in die Höhe, und hinten höher, als vornen, so wird der Sand herausfallen, und man wird sie auf ein neues brauchen können. Ich glaube, es würde besser seyn, wenn man sie Obenher mit darauf befestigten Brettern zudeckt, damit der Sand oben nicht könne herausgeschoben werden; den also wird sie, nachdem sie einmal voll ist, über den Boden ohne ihn mehr anzugreifen herzuschleppen seyn, welches darum bequem ist, weil man den an einem Ort eingefassen Sand gemeiniglich nicht gleich nächst daran ausleeren darf, sondern weiter führen muß, bis man ihn an den verlangten Ort bringt.

81.

Diese Maschin also wird unter dem Wasser dienen können, den Schlamm von einer Seite des Ufers in die Mitte, oder von der Mitte zur einer, oder beyden Seiten, oder auch nach der Direction des Strommes auf oder abwärts zu bringen: sie wird dienen kleine, und auch größere Hügel nach und nach abzugraben, und nicht zu weit davon entfernte Gruben, mit dem von dem abgegrabenen Hügel weggerissenen Sande zu ebnen. Man wird also damit ein rauhes, und ungleiches Kinnthal säubern, und glatt machen können, daß das Wasser darinnen ungehindert fortfließt, und man wird dadurch alles erhalten, was man durch Austräumen zu erhalten sucht.

82.

Aber auch auf dem trocknen Lande wird sie dienlich seyn einen Canal, sonderlich einen sehr breiten zu graben, oder auch einen andern graben zu machen, ja sogar einen Damm ohne große Kosten aufzurichten, denn es sey (Fig. 28.) *AB* die Direction des Grabens
oder

oder eine Linie, so mitten durch ihn gehen soll, fährt man mit dieser Schleife immer zwerch über diese mittlern Linie AB wechselsei von MM gegen NN , und von NN gegen MM , so ergiebt sich endlich der Graben $MM NN$. Ist er gar breit, so kann man von mm gegen NN , und von nn gegen MM fahren, bisweilen auch nach der Direction der Linie AB oder mit einer ihr parallelen in den Graben herunter, und so, wenn die Schleife erfüllet ist, zur Seite fahren, sie auszuleeren.

83.

Um aber mit dem so ausgeleerten Sande und Erde einen Damm zu machen, richte man von Holz einen Bock (Fig. 29.) eine Maschine nemlich von zween schief aufwärts gehenden Bäumen $m n$: darüber man die Schleife hinaufführt, so wird in diesem hinauffahren der Sand aus dem Brettchen zwischen die Bäume $m n$ fallen. Verlangt man aber, daß der Sand erst dann herausgeschüttet werde, wenn die Schleife zu einer gewissen Höhe gelangt ist, so darf nur eine große Tafel gerichtet seyn, über welche man die noch mit Sand gefüllte Schleife hinführe; und so kann man die auf dieser Tafel stehende Schleife sammt derselben auf den Bock hinaufführen, bis man so weit ober dem verlangten Orte kömmt, als die Schleife lang ist. Lasse man darnach dieselbe über die Tafel, die man unterdessen mit einer Kette, oder auf eine andere Weiß anhält, zurücke gehen, so wird sie erst in dem zurücketretten, den Sand ausschütten. Man müßte aber dieser Tafel zu äußerst ein paar Leisten geben, die an selber mit vielen Nägeln befestigt wären, damit zwischen ihnen die Messer und untersten Theile der Brettchen, so mit Eisen beschlagen sind, und unter die Seitenwände hinunter gehen, beschützt würden, also daß die Seitenwände der Schleifen auf diese Leisten hinkämen. Auch zu vorderst an dieser Tafel müßte eine starke Leiste fest gemacht werden, damit sie, wenn man mit der Schleife weiter fortfährt, von

S s s

sel

selber mitgenommen werde. Endlich müßten die Bäume selbst stehen haben, zwischen denen sowohl die Seitenwände, als das darunter gefetzte Brett glitschten. Zur Erleichterung ihrer Bewegung wurden zwischen die Bäume des Bockes eingesezte, und mit ihren Achsen in Eisernen, oder besser messingenen Pfannen bewegliche Walzen sehr nützlich, oder fast nöthig seyn.

84.

Wenn das Gerüst aus mehreren aneinander gesezten, und mit einander vereinigten Bockten bestünde (Fig. 30.) also, daß die Bäume, *ab*, *bc*, *cd* unter schiefen Winkeln zusammengesezt wären, da würden solche Walzen bey den Ecken *b*, *c*, *d*, *ic.* sehr nothwendig seyn. Sie dienten auch zu verhindern, daß das Seil, mit dem die Schleife gezogen würde, nicht an den Balken, so die Bäume der Bockte zusamm hielten, verwehet würde.

Um die Sache durch eine Figur zu erklären, sey in der 31. Figur *A* das Profil eines Baumes, *C* einer starken Leiste, oder des Theiles, mit dem er eine Ruth macht, *nn* eines Theiles des Brettes, so unter die Schleife geschoben wird, ehe man sie über den Bock hinaufführt; *m* der Leiste, die auf dieses Brett fest angenagelt ist, *B* der Seitenwände der Schleife, *DD* eines Theiles der Walze, die mit ihren eisernen Zapfen in dem Baum *A* in einer eisernen oder messingenen Pfanne umläuft. Man wird sich wohl einbilden, daß auf der rechten Seite des Bockes alles eben so aussieht, wie hier auf der linken, ausgenommen das, was hier rechterseits gewendet ist, dort linkerseits gewendet sey; dessentwegen habe ich nicht nöthig selbe besonders vorzustellen; ich will mich auch mit Erklärung der Weisheit aufhalten, wie die Schleife über einen einfachen Bock (Fig. 29.) und wie sie über ein ganzes Gerüst (Fig. 30.) zu bringen sey. Ich habe auch bisher kein Maß der Maschine angegeben, weil selbst
nach

nach verschiedener Beschaffenheit des Bodens, und der Kräfte die man zu ihrer Bewegung anwenden kann, gar verschieden seyn mag, nur das will ich noch anmerken, daß so man sie mit Pferden, über einen einfachen Bock führen will, man das Seil, mit dem sie gezogen wird, auch unten, um eine Walze A (Fig. 29,) herumziehen müsse, damit das Pferd auf der horizontalen Fläche fortgehen möge. Das Gestell aber dieser Walze oder Scheibe wird man mit vielen Steinen beschweren, damit es nicht aufgehoben werde.

85.

Die bisher beschriebene Schleife, wie man sich selbst leicht einbilden wird, ist nicht bestimmt, um von Menschen, sondern von Pferden oder Ochsen, oder in gewissen Umständen, wie wir bald sehen werden, von dem Stromme selbst gezogen zu werden; sie wird aber ohne einige Aenderung auf steinigten Böden nicht wohl zu gebrauchen seyn, und auf gar lockeren bald voll werden, daß man also nicht weit damit fahren kann ohne wieder umzukehren; da sie mir dessen ungeachtet ziemlich nützlich zu seyn schien, glaubte ich, sie wäre würdig, daß ich sie bekannt machte. Jetzt aber wollen wir zu einer andern Maschine schreiten, die man entweder durch eine Menge Pferde, oder durch den Stromm selbst, wie wir darnach zeigen werden, so weit, als man nur immer will, und es die Beschaffenheit des Bodens leidet, ziehen, und mit der man auch auf einem ziemlich steinigten Boden einen Graben machen, oder ein Rinnsaal räumen kann.

86.

Wir wollen uns einen Begriff von dieser Maschine zu machen der 32 und 33ten Figur bedienen: derer eine die Maschine, die wir einen Grabtarren nennen, von oben, die andere von der Seite zu sehen, aber nicht perspectivisch, sondern die erste gleichsam im Grund-

riffe, die andere im Profile vorstellt. Der bewegte Maßstab soll nur 3. B. dienen, denn die Größe der Maschine soll nach Verschiedenheit der Umstände verschieden seyn.

AB , AB sind zwei lange starke Hölzer, oder Bäume, unter denen die zwei Achsen HH und BB durchgehen, und mit eisernen Ringen und Holz, welche die Figur nicht vorstellt, fest damit verbunden sind. Man würde um diese Maschine fester zu machen, wohl noch ein paar Hölzer bey LL und NN mit HH oder BB parallel, und zwischen selbe einen Kreuzriegel beysen, die ich aber hier um das übrige nicht zu verdecken, nicht vorstelle. An den Achsen stecken zu äußerst die Räder, doch die hintern Räder (wie ichs erst, nachdem sie schon gezeichnet waren, bemerkt habe) würden besser innerhalb den Hölzern BB bleiben, und an der Achse angemacht seyn; die aber mit Zapfen in den Hölzern AB , AB gehen, aber alsdann müßte anstatt der Achse ein anderes Querholz, oder selber, oder bey derselben herübergehen, um die Hölzer AB und AB mit einander zu verbinden. Zwischen diesen Hölzern ist zu vorderst bey A , A noch eine Achse, die mit Zapfen darinnen geht, und an welche die Deichsel C D angemacht ist. Aber es ist nicht nöthig, daß die Zapfen mitten in diesen Hölzern gehen, wie sie hier gezeichnet sind, sie würden noch besser unter ihnen in Pfannen umlaufen, die man mit Kluppen schließen, und um die Achsen nach belieben auch wieder heraus zu nehmen, öffnen könnte, und eben solche Kluppen wären auch bey den Zapfen der Achse der hintern Räder wohl angelegt.

Unter den Hölzern AB , AB ist vornher das Scharwerk angemacht; FS , PS sind die zwey Hölzer (es stellt die 33te Figur nur eines davon vor, das andere ist dahinter, und beyde sind in der 32ten Figur unter den langen Hölzern AB , AB verborgen) in denen die 4. Querhölzer LL , MM , NN und NN befestiget sind, deren die zwey ersten eine Reihe starker Meßer, n , n , n 2c. die 2ten

derer MM und LL eine Art Scharren und Schaufeln m, m, m tragen. Die Messer welche vertical stehen, durchschneiden den Boden, und die Scharren, deren flache spitzige, und schneidende Seite horizontal ist, graben sie auf, und machen also einen Theil von den Boden los; die Messer sowohl als die Scharren sind in die Querschlitzer fest eingesezt, und mit Schraubenmüttern angemacht; die Scharren können auch zu ihrer Befestigung Stützen haben, mit denen sie an einem hinteren Querholz sich anstehen, und sie können auch daran befestigt seyn.

Hinter dem Scharrenwerk kommt das Verticale Schiebbrett FE , welches die abgescharrte Erde, oder Schlamm, da man mit der Maschine fortführt, schief vor sich her, und also zur Seite nach und nach hinüber schiebt. Es würde vielleicht noch besser seyn, wenn der Winkel BFE , den es mit dem Holze AB macht, noch spiziger, und folglich die Maschine noch länger wäre. Es sollte aber dieses Brett, wenn die hinteren Räder innerhalb den Hölzern AB und AB blieben, kürzer seyn, und bey E für das Holz AB nicht herausgehen. Doch man kann auch die Räder, wie sie hier vorgestellet sind, von außen angemacht seyn, und das Brett für das Rad bey E herausgehen lassen; aber in solchem Falle muß man das Holz MM auf der nämlichen Seite verlängern, und noch eine Scharre, und außer derselben ein Messer anbringen; doch ist die vorangeführte Einrichtung besser. Die 34te Figur zeigt das Profil einer Stütze, deren zwei an den Bäumen AB und AB bey K und K fest sind, und das Brett FE tragen, welches auch noch in der Mitte durch eine Spreiße G erhalten wird, so daß es sich nicht biege. Zu unterst ist dieses Brett mit einer eisernen Schienen beschlagen, daß es sich an der Erde nicht verwege.

Es würde an dieser Maschine sehr gut seyn, wenn man das Scharwerk, und auch das Schiebbrett nach belieben erheben, und erniedern, und wieder fest stellen könnte, damit man nach Verschiedenheit des Bodens, auf einmal die Scharren und Messer mit einander mehr oder weniger tief könnte gehen, und mehr oder weniger Erde zumal ausgraben lassen. Dieses aber ließ sich leicht erhalten; die vier Arme, womit das Scharwerk an den Bäumen oder Stangen *AB*, *AB* befestiget ist, dürften nur von starken Eisen mit Schraubengängen versehen, und mit Müttern, unter und ober den Bäumen angeschraubet seyn, so könnte man sie leicht mehr erheben, oder erniedern. Das Brett höher oder niedriger an seine Stützen anzuschrauben, wird sich jeder selbst eine gute Weise anzugeben wissen.

Nun mit diesen Grabkarren kann auf einmal viel Erde aufgehoben, und zur Seite geschoben werden. Schraubet man das Scharwerk davon ab, so kann das Brett allein die schon vorherin losgemachte Erde, (wenn man mit dieser Maschine darüber fährt) zur Seite zu schieben dienen. Schraubet man das Scharwerk auf einer Seite ein wenig höher, als auf der andern, so kann man auch machen, daß sie auf einer Seite tiefer, als auf der andern eingreifen. Ist die Maschine so eingerichtet, daß man das Schiebbrett *EF* nach belieben zur rechten oder linken Seite gewendet daran befestigen kann, so kann man wechselweise die Erde auch auf einer sowohl als auf der andern Seite hinauschieben. Mit zweyen Brettern, die man voreinander spitzig zusammensetzte, könnte man machen, daß die abgegrabene Erde zum Theile auf eine, zum Theile auf die andere Seite hinausgeschoben würde. Aber wir werden gleich sehen, was wir für einen Vortheil dabey haben können, wenn sie nur allein auf eine Seite herausgeschoben wird. Ich muß nur noch zuvor erinnern, daß, wenn das Brett die Erde nur auf eine Seite schiebet, man hinten an diesen

Kar.

Karren noch ein verticales Meſſer (oder zwey ſolche) anbringen mit ſie, welches in die Erde einſchneide, nicht um ſie zu zertheilen, ſondern gleich als ein Steuerruder zu dienen, und zu verhindern, daß der fortgezogene Wagen ſich ſeitwärts wende; denn die Erde, ſo von dem Brett ſoll weggeſchoben werden; ſucht durch ihren Widerſtand auch entgegen das Brett, und ſolglich die ganze Maſchine von ſich zu ſchieben. Dieſes Meſſer aber, welches ziemlich breit ſeyn dürfte, würde das Hinüberſchieben dieſer Maſchine hindern. Die Länge der Deichſel *CD* (von der wir hier nur den hinterſten Theil ſehen) mag auch dazu dienen, oder gar alleine ohne das Rudermeſſer die Maſchine ziemlich grad erhalten.

88.

Wenn man mit dieſem Karren über einen Boden, der ſich damit bemeiſtern läßt, ſo wird ein langer und breiter, aber gar nicht tiefer, und zur Seite mit einem Büſing, oder langen Hügel *A* befränzter Graben *AB* entſtehen, (*) welcher nemlich ſo breit als der Karren iſt, ſo tief, als die Scharren eingegrifen haben, und ſo lang, als lang die Streife Landes war, über die man damit herfuhr. Zieht man dieſen Karren ohne ihn den Boden berühren oder angreifen zu laſſen, zurück, ſo kann man, da man wieder für ſich fährt, einen zweyten (Fig. 36.) graben *BC* mit dem vorigen parallel neben ihm machen, der ſich mit dem Büſinge *B* befränzen wird. Es wird alſo nicht mehr brauchen, als das Büſing *B* weggeräumt werde, ſo werden beyde Graben *AB* und *BC* einer ſeyn, der die Breite *AC* hat. Und eben ſo kann man den dritten *CD* (Fig. 37.) und ſo viel andere als man will, an die vorigen hinſetzen. Dieſe Maſchine (**) un-

(*) Die Figuren 35. biß 42. ſind Profile von Gräben, welche entſtehen, wenn eine verticale Fläche die Länge eines Grabens über quer durchſchneidet.

(**) Man macht an dieſen Karren auch zwey Trugen an, die mit Steinen gefüllt werden, wenn man ſich ihrer unter dem Waſſer bedienet.

unter dem Waſſer zurück zu führen, ohne daß ſie den Boden angreife, iſt leicht, denn man führe ein kleines Schiſchen ober ihm daher, ſo kann man ſelben leicht mit Stricken in die Höhe ziehen, und von dem Schiſchen getragen zurücke bringen. Ich will mich aber mit Erklärung der Weiſe dieſes zu thun nicht aufhalten. Auf dem Lande könnte man unter die Räder Hölzer, wie man ſie braucht die Sperr einzulegen, hineinſetzen, damit ſie von dem Boden erhoben würden, aber man würde ihn lieber umkehren, und den zweyten Graben mit gegenseitigen Fahren machen, und alſo würden alle Gräben nacheinander mit hin und wieder fahren entſtehen: da dann die von zweyen Gräben aufgeworfene Erde auf einem Büſing zuſamm kommen würde.

89.

Dieſe Büſing auszuräumen wollen wir ſehen, wie ſie ſich von einem Orte zum andern ſchieben laſſen. Es ſey ein Büſing *C* (Fig. 38.) und man fahre mit dem Karren (die Scharren deſſelben laſſe man hier nicht den Boden angreifen) über ihn her, ſo wird dieſe Erde in *B* hinüber geſhoben. Eben ſo kann man ſie darnach an *A* hinbringen, wenn alſo Anfangs 3. Büſinge *B, C, D* in dem Graben *AE* (Fig. 37.) waren, die ihn in 4. Theil theilten, ſo ſchiebe man erſtens den Büſing, der in *B* iſt, zu den Büſinge *A* in *b* hinüber (Fig. 39.) alſodann den Büſing *C* zu erſt in *B* und von *B* in *c*; man bringe endlich den Büſing *D* in *C*, und darnach in *B*, endlich in *d*, ſo wird der Graben von *d* bis *E* offen ſtehn. Führt man alſodann (Fig. 39. und 40.) über die aufgeworfene Erde *Abcd* einige mal her, ſo kann man ſie gegen *a* (Fig. 33.) hinterſchieben. Die Erde aber, aus dem Graben zu erheben, würde es gut ſeyn, wenn man an dem Brett *EF* bey *E* ein dreyeckiges Brettchen *abc* in ſchiefer Stellung anmachte (43. Fig.) darauf die Erde in die Höhe geſhoben würde: müſte ſie aber hoch erhebet werden, ſo müßten auch die Räder des Karrens, und das Schiebbrett höher ſeyn, als ſie in der Figur vor

gestellt werden. Das Brettchen *a b c* würde mit Gelenken bey *a* und *b* beweglich, und an der vordern Seite *b c*, mit der es die Erde auffaßt, mit Eisen beschlagen seyn. Der Graben wird also nach und nach die Gestalt *A E* (Fig. 40.) gewinnen, aber noch nicht tiefer seyn, als die Scharren unter die Räder langten. Vertieft man ihn weiter, so erhält er die Gestalt, deren Profil die Figur 41. vorstellt, und so geschieht es endlich, daß nach etlichen Vertiefungen seine Form zu jener wird, die im Profile durch die 42te Figur geschildert ist. Man sieht also leicht, wie man mit dieser Maschine den Schlamm von einem Ufer zum andern hinüber rücken könne; bisweilen aber wird man ihn von der Mitte an ein oder beyde Gestade, oder von solchen nur in die Mitte bringen, damit er von dem Wasser, das in der Mitte schneller läuft, fortgeführt werde.

90.

Wollte ich auf dem Lande einen Graben machen, und die ausgegrabene Erde beyderseits auswerfen, so würde ich den halben Graben mit hin, und den andern halben mit herfahren aufwerfen. Das Umwenden des Karren auf der Erde würde zwar bey dieser Einrichtung desselben noch beschwerlich seyn; man müßte wohl um die Scharren zu erhöhen, auch die vordere Räder, so oft man den Karren umwenden wollte, mit untergeschobenen Sperren erhöhen, oder auf andere Weise denken, wie man diese Maschin, die ich hauptsächlich nur unter dem Wasser damit zu arbeiten bestimme, in diesem Stücke in vollkommeneren Stande bringe. Wenn man aber unter dem Wasser die Erde zur rechten und linken Seite des Graben auswerfen will, und sie nicht von Pferden, sondern von dem Stromme sollte gezogen werden, würden wir die Aenderung mit dem Schiebbrett machen müssen, so, daß wir es eine Zeitlang gegen jene Seite wendeten, auf die wir zu erst die ausgegrabene Erde schieben wollten, alsdann solches, nachdem es auf die andere Seite, um auf selbe die übrige Erde hinüber

über zu bringen, gewendet worden, befestigten. Sollte aber der Strom selbst den Sand wegführen, so würden wir das Schiebrett nicht nöthig haben.

91.

Ich habe nun diesen Grabkarren, so viel ich es, einen Begriff davon zu geben nöthiger achtete, beschrieben, und seinen Gebrauch erklärt; jetzt bleibt mir nur noch übrig, daß ich eine Weise zeige, kraft welcher ihn der Strom selber zu ziehen vermögend ist. Ich gehe weder diesen, noch die Schleife für vollkommener Maschinen aus, an denen sich nichts verbessern ließe, vielmehr vermute, und wünsche ich, daß sie das fast allgemeine Schicksal neuer Erfindungen haben, die mit neuen Aenderungen und Zusätzen mit der Zeit immer in der Vollkommenheit wachsen. Ich eigne mir auch nicht allein die Ehre der Erfindung zu, denn ich gestehe es, und man wird es sich nicht schwer einbilden, daß die Betrachtung des gemeinen Pfluges, und anderer Maschinen Gelegenheit gegeben haben, diese zu erdenken. Alle oder fast alle Erfindungen haben eine gewisse Verbindung miteinander, da immer eine aus der andern ihren Ursprung nimmt, und darinn haben auch die alten Erfinder an den neuen Erfindungen einen Theil, als welche uns mit den ihrigen auf den Weg unserer neuen Erfindung geleitet haben.

92.

Nun müssen wir noch sehen, wie das Wasser selbst wirken, und diese Maschinen ziehen könne. Die Sache ist wichtig, weil gar viele Kosten dabey erspart werden; denn die Kraft des Wassers kann oft wohl für die Kraft einer ziemlichen Menge Pferde gelten, und kostet uns außer der Einrichtung der Maschinen, und einiger weniger Leuten Arbeit sie zu regieren nichts, da im Gegentheile die Pferde ungemein kostbarer seyn würden.

Wir

Wir nehmen nun die Figuren 44, 45, 46 für uns, deren die erste den Grundriß der Maschinen, welche wir ein Zugwerk nennen, die andere das Profil, und die letzte die Maschine selbst perspectivisch darstellt.

Es sey DA ein Schiff, dessen vorderer Theil A spizig, der hinter Theil mn gerade abgeschnitten ist: B und C seyen kleine Zillen: DN , DN , und NN seyen lange Bäume, welche diese Schiefe miteinander verbinden, es soll wenigstens die obere Seite eines Baumes DN und NN eben seyn, und lehnen beygesetzt werden, daß man darauf sicher aus einem Schiffe in das andere als einen Steg gehen könne. Diese Bäume sind an den Schiefen dort, wo sie aufliegen mit Eisenwerk sehr fest angemacht. Zu äußerst an den Enden des Baumes NN sind die Gelenke, um welche die Arme NM , NN , die den Flügel MM tragen, beweglich sind: dieser Flügel MM kann in das Wasser gelassen werden, in welcher Stellung ihn die 44te Figur vorstellt, und aus selben mit einer Kette, welche um die auf einer perpendicularen Säule eingesezte Rolle geht, durch Hülfe eines Haspels G kann heraus gezogen werden, dabey man, wenn der Flügel gar schwer wäre, die Bewegung zu erleichtern ein Schiebrad, oder ein anderes gezähntes Rad mit einem Getriebe gebrauchen könnte, damit zwei Personen allein im Stande wären, den Flügel aufzuziehen, und nieder zu lassen.

93.

Wird nun an dieses Zugwerk oder an dieses Schief ein festes Seil oder Kette fest angemacht, so wird man den oben S. 86. beschriebenen Karren, oder die Schleife, oder auch Leupolds starken Pflug und andere dergleichen Maschinen, sowohl unter dem Wasser, als ober selben nächst dem Ufer oder auf einer Insel nach der Direction des Strommes fortführen könne, ob er gleich an den Boden,

den er durchgraben soll, großen Widerstand leidet. Man wird auch ihn nach andern Directionen führen können, wenn nur die Kette, oder das Seil lang genug ist, und durch Walzen oder Rollen C (Fig. 48.) über die die Kette gehet, die Direction geändert wird: aber die Maschine, an der eine solche Walze oder Rolle um ihrer Achse beweglich angemacht ist, muß selbst sehr fest und unbeweglich, z. B. ein tief in die Erde eingeschlagener starker Pfahl seyn. Ich will mich aber hier nicht einlassen, alle Behutsamkeiten zu beschreiben, die man zur Erhaltung des Seiles, oder der Kette, und der leichteren Bewegung etc. anwenden solle. Gewiß ist es, daß diese Maschine mit großer Gewalt wirken werde, und zwar mit desto größerer, wie schneller der Stromm an dem Orte fließt, da man den Flügel einsenkt, und je größer die Oberfläche desselben ist; es ist auch klar, daß die Größe dieser Maschine gar verschieden seyn könne.

94.

Nachdem man mit dieser Maschine eine Weile den Stromm hinunter gefahren ist, und es Zeit ist wieder umzukehren, zieht man den Flügel aus dem Wasser, und erhöht ihn, so wird das Zugwerk wirklich leicht gegen den Stromm zu ziehen seyn, auch das Hinaufziehen des großen Zugwerks könnte durch ein anders kleines Zugwerk nemlich durch ein Schifchen, das mit einem viel kleinern Flügel versehen ist, geschehen (wie es wirklich die 46ste Figur vorstellt, die 47ste aber giebt den Grundriß davon) wenn man an dem Ufer oder an einem Joch einer Brücke etc. eine Rolle befestigen, und ein Seil darum ziehen kann, so beyde Schif mit einander verbindet, so, daß wenn das kleine Zugwerk mit niedergelassenen Flügel den Stromm hinunter fährt, das große mit aufgezoogenem Flügel davon gegen selben hinauf gezogen werde (*) hingegen würde das kleine, nachdem es mit Hinauf-

(*) Man besche hiervon S. 231. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

aufziehung des großen seine Dienste gethan, und sein Flügel wieder erhebt worden ist, durch das große abwärts gehende wieder gegen den Strom hin aufgezogen werden.

Ich glaube eine einige Person würde im Stande seyn, das kleine, und zwei bis 4. Personen, das große Zugwerk zu regieren, wenn nur das Aufziehen des Flügels genug erleichtert wird, welches durch ein an die Walze, um die man das Seil, oder die Kette aufwindet, befestigtes Schiebrad leicht zu erhalten wäre, denn ist das Rad nicht gar zu klein, und stehen die Zähne nicht zu weit von einander, und das Schiebeisen ihren Ruhepunkt nahe, so kann damit eine Person viele Zentner heben; die Gestalt eines Schiebrades mag man in Leupolds Schauplatz des Grundes mechanischer Wissenschaften Tab. XXVI. Fig. VI. abgebildet sehen.

95.

Je länger die Kette oder das Seil ist, mit dem das Zugwerk den Karren oder starken Pflug zieht, je bequemer wird es seyn, wegen der Direction derselben, und je weiter mag der Pflug oder Karren von dem Wasser entfernt gezogen werden, z. B. (Fig. 17.) wenn das Seil bis *F* langet, da das Zugwerk unter *E* stehet, so kann man mit selben den Graben *FG* machen, um die Theile des Rinnsaales *A* und *E* dadurch zu vereinigen.

Eben so kann man ein steiles Ufer, dessen oberster Theil in den Fluß zu stürzen ist (S. 54.) mit parallelen Gräben *m n* (Fig. 48.) zerreißen. Die beliebige Direction kann dabey dem Schif mit einem Steuerruder, oder wenn man mit Stangen an den Boden, oder das nahe Ufer stößt, gegeben werden.

96.

Ein langes Seil ist auch deswegen gut, und wenn der Fluß
tief,

tief, und der Boden auszuräumen iſt, nöthig: ſonſt würde der Karren unter dem Waſer nicht fortgezogen, ſondern erhebt werden. Daß man aber den Karren, wenn man über den Fluß hinauffährt zuvor von den Boden erheben müſſe, iſt für ſich ſelbſt klar. Ich hab ſchon oben gemeldet, daß dieſes vielleicht beſſer, durch zwey kleine Schiſſen, die mit darüber gelegten Balken verbunden würden, geſchehen müſſe: doch wird es keinesweges erfordert, daß man ihn ganz aus dem Waſer hebe, welches viel ſchwerer wäre, ſondern man führt ihn ſammt den Schiſſen, an die er angehengt iſt, mit Pferden oder auf andere Weiſe den Stromm hinauf, um wieder damit herunter zu fahren.


97.

Man könnte anſtatt des Seiles oder der Kette, ſolang ſie gerade fortgehen darf, ſich auch an einander geſetzter Hölzerner Stangen bedienen, und es würde nützlich ſeyn, an ſelbe Rollen oder kleine Rädchen anzufehen, davon ſie auf dem Lande getragen würden, wenn nur ein geſchickter Mechaniker dabey iſt, der die nöthigen Behutſamkeiten in acht zu nehmen weiſ; denn ein ſolcher iſt zu allen Waſerbaue, wenn er gut, und mit wenigen Koſten ſoll vorgenommen werden, nöthig: ohne einen ſolchen Mann aber ſind alle, auch beſte Vorſchläge vergeblich. Leute die nur nachzumachen wiſſen, was ſie anderswo geſehen haben, ohne eine gute Theorie der Mechanik und einen erfinderiſchen Geiſt zu beſitzen, können keine gute Waſerbauweiſer abgeben, weil ſie in Tauſend Fällen der Rath und die Hülfe verläßt. Darum wird oft eine gute Erfindung verworfen, und kömmt in üblen Ruſe, weil ſie nach übler Anordnung eines ſolchen Mannes keine gute Dienſte leiſtet. Dieſe Leute, welche ſich anſtatt der Vernunft, wie die Beſtien nur der Erwartung ähnlicher Fälle bedienen wollen, betriegen ſich öfters gar ſehr, weil es ihnen an Wiſe und Scharffſinnigkeit fehlt, die Ähnlichkeit oder den Abgang derſelben zu

ent-

entdecken, und wenn nur eine kleine Aenderung vorkommt, so ist ihnen das, was sie wissen, nicht mehr brauchbar. Es wäre desto wegen zu wünschen, daß jene, die zu solchen Unternehmungen bestimmt werden, mit einer guten Theorie versehen, und von Jugend an, zum Nachdenken angewiesen würden: man sollte ihnen aber auch zugleich ein gewisses Mißtrauen auf ihre eigne, und auch fremde Erfindungen die noch von der Erfahrung nicht bestätigt worden sind, eindrücken, daß sie im großen nichts ungewisses wagen; denn ein verständiger und behutsamer Baumeister ist das beste Mittel den Bau, so viel es möglich ist, wohlfeil und gut zu machen.





Register,

der merkwürdigsten Sachen, welche in dem achten Bande enthalten sind.

Abscissen und Ordinaten zu allen bestimmten Kegelschnitten Gleichgültigkeit. 45.

Anlegung neuer Weyher. 14. 15.

Arbuthnot (P. Benedict) Abhandlung von den Kräften der Körper und Elemente. 179. und folg.

Arbuthnot (P. Benedict) Abhandlungen vom Hochgewitter. 399. electrische Versuche. 403. und folg.

Aufzischung der Karpfen - Weyher. 11. Mittel wider die Auf- und Absteigung der Fische Ebendaf.

Ausbreitung des Lichts. 68. 69.

Ausräumung der Flüße. 495.

Backöfen Unndthigkeit. 132.

Bellidors irriger Sag von der Gestalt des Flusses in seinem in der Mitte ver-
tiefsten Bette. 472.

Befezung der Weyher. 13.

Boscovichs Curva. 200. und folg.

Bouguers Erinnerung in seiner optischen Abhandlung vom Zunahme des
Lichtes. 113. Brunn

R e g i s t e r.

- Brunnwieser** (Matthias) lithologische Betrachtungen: 153. und folg.
Buffons Tonnerde vom zerstörten Sande: 168.
Cartes und Malebranche tägliche Veränderungen in der Natur: 226.
Coffee und Thee: Getränk: 141.
Dämmenbau zur Einschließung eines Flusses: 463. Beschaffenheit und Anlegung derselben. ebendas.
Dichtigkeit des Lichts, und dessen Eigenschaften: 63. Begriff dadurch von Klarheit: 64. Größe der Erleuchtung: 65.
Ebene, ungleichförmige Erleuchtung derselben: 65. und folge.
Electrische Versuche wider die Hochgewitter: 428.
Elemente der Materie Beschaffenheit: 182. Kräfte: 183. 209. Verschiedenheit der Theilchen nach dem Elementen: 215. Kein allgemeines Gesetz weder der Cohäsion, noch der Repulsion: 195. 197.
Epp (Käveri) Abhandlung von dem Zusammenhang der Theile in den Körpern, und dem Anhang der flüssigen Materie an die Solide: 221. und folg.
Erleuchtung eines Flächenraumes nach der Dichtigkeit des darüber gleichförmig verbreiteten Lichtes: 87. Erleuchtung des Lichts von einer leuchtenden Fläche: 94.
Erze und Glas mit Wind: Ofen und Stein: Kohlen geschmolzen: 130.
Fische, welche in dem Karpfenweyher zu gebulden, oder nicht sind: 10. und folg.
Fischweisser Aberglauben: 7.
Flusses zu enger Rinnsaal: 441. schädliche Gegenwehre wider den Flus: 443. Einschränkung desselben: 458.
Flüssiger Materien - Anklebung an die soliden Körper: 240. Ausnahme ebendas. Schwere beider Körper: 241.
Ursache der Anklebung: 251. Kraft der soliden Körper gegen die Wassertheilchen: 256. verschiedene Erscheinungen: 260. Anmerkungen: 269.

R e g i s t e r.

Forschtwirthschaft mangelnde ächte Grundsätze. 146.

Fütterung für das Vieh. 137.

Gerlachs Briefe von den verschiedenen Wittungen des Lichtes. 73. und folg.

Glockengeläute bey dem Hochgewitter. 417.

Gmelins (Joh. Georg) Rhubarbarum officinale. 325. und folg.

Hambergers Gründe von der Schwere des Quecksilbers. 246.

Helfenrieders (Johann) Wasserbau. 437.

Henfels kieselartige Grunderde des Eisen. 167. 174.

Hercynische weitschüchtige Wald der Deutschen. 123.

Heuernde Eintheilung. 312. Wetterbeobachtung. Ebenas. Graß. 313.

Grummet. ebenas. und folg.

Hochgewitters Natur. 409. Versuche. Ebenas. und folg. Bisherige Mittel dawider. 417.

Hohe Zimmer und Stuben. 138.

Holzmangels Ursachen. 125.

Hydrostatick, Beobachtungen 335. Beschaffenheit der anziehenden und wegstreibenden Kraft. 338. 341. Verschiedene Bewegungskräfte. 340. Gesetze der Zusammenhangung. 359.

Hyperbel meiste Verschiedenheit. 38. Und Folgen jeder Hyperbel in verticaler Lageverwendung. 42. und folg. Ähnlichkeit dieser Lage mit den Parabolen. 43.

Karpfenerziehung und Wachsthum. 6. und folg. Die Altväter aus Bienen. ebenas. Ihre Einwerfung. ebenas.

Karsten (Wencesl. Joh. Gustav) Untersuchungen über die ersten Gründe der Photometrie. 55. und folg.

Karstner wider Gerlach. 73.

Regelschnitten vorausgesetzte Vorbereitungen. 20. und folg. Regels Vorführung ohne bewusster Gattung der Regelschnitten. 29.

Regelschnittes Beschaffenheit in Rücksicht dessen gegebenen Regels und Lage 50. 504.

I n d e x.

Kochherdes Beschreibung. 148.

Körper allgemeine Verbindniß. 223. ungleiche. 224. Verschiedenheit derselben. ebendas. Ihr Widerstand. ebendas. und folg.

Dieser Widerstand ist eine wahre Gegenwirkung. 227. Die Verbindniß der Elemente der Körper von dem Schöpfer. 233. und folg.

Küche, Holzverschwendung darinn. 139.

Lacys von Lyrene Betrüge unsrer Sinne. 225.

Lamberts erster eigentlicher Lehrbegriff von der Photometrie. 57. 111. und folg.

Lechi Einwendung wider Pitots Instrument, von Untersuchung der Schnelligkeit des Wasser. 453. Vertheidigung dieses Instruments. 454.

Lechmanns Chrysoprastesteine. 164.

Leupolds Urtheil von den Eindämmungen der Flüße. 487.

Licht von dem leuchtenden Punkt. 58. Lichtesverhaltung zu den Lichtstrahlen. 59. Verhältniß der Lichtmengen. 63. Lichtflamms betrachtet als ein Punkt. 70. und folg.

Maulwurfs Vertreibung aus den Wiesen. 311. 312.

Models (Joh. Georg) Entdeckung des Seleniten in der Rhabarbar. 317. und folg.

Muschenbroeks Cohäsion der Körper. 192.

Newtons Cohäsion in den Lichtstrahlen. 195.

Ofen große und kleine. 133. 134. 137. Feuer hinten im Ofen. 136.

Photometrie Annnehmung jeder Erleuchtung und Strahlenmenge. 118. 119.

Pörner und Baume Abstammung aller Erden von der Kiesel Erde. 169.

Pitots Instrument zur Untersuchung der Schnelligkeit des Wassers. 446.

Quecksilber, Versuche davon. 249. und folg.

Rechenvermuthung für das Durchschwimmen der Fische. 12. 13.

Rhabarbar von Petersburg. 326. 332. und folg.

Stinnsals Aenderung der Flüße. 468.

Salzes und ihres Acidum Ursprung. 329.

Scheides (Karl August) Betrachtungen und Mittel ab den allgemein einreißenden Holzmangel in Deutschland. 121. und folg.


See

R e g i s t e r.


- Seefeld** (Anton Grafen) Abhandlung von der Fruchtbarkeit der Wiesen und des Heuwuchses. 299. und folg.
- Seemuscheln** auf den höchsten Bergen. 178.
- Seleniten**, eine gypsartige Kalkerde in der Rhabarbar. 321. Zufällige Versuch: ebendaß. und folg.
- Sezlinge** der Fische verschiedene Verfertigung. 9.
- Silberschlags** Preisschrift. 143.
- Stattler** (Benedict) Ausnahme von den Gefäßen der Hydrostatick. 333. und folg.
- Stein Rhabarbar** aus China. 324.
- Steinerne Gebäude**. 144.
- Streckweyher** zu Karpfenzucht. 5. 8. Dauer ihrer Brut. 9.
- Stücke** Abfeuerung bey dem Hochgewitter. 421. Pyrotechnische Maschinen. 427.
- Torporos** (Augustin) Abhandlung von den Regelschnitten. 17. und folg.
- Ueberschwemmung**, Gräbenzeichnung derselben. 460.
- Venette** Abhandlung von den Steinen, aus dem Französischen übersezt. 162.
- Verwitterungs** Grade der Steine. 158.
- Ufer** Ueberkleidungen. 482. Eindämmungen. 483. Befreyung von dem Einreißen. 486.
- Victorini** (Wencesl. Max.) Entwurf über die Benützung des Weyher und Erziehung der Karpfen auf böhmische Art. 1. und folg.
- Unverwitterter** Steine im 2. und 3. Grade weißliche Flecken. 159.
- Wald**, ein gebautes Dorf darüber. 126.
- Wasserbaues** Wichtigkeit. 439.
- Weyher** Anzahl. 4. 5. gute Benützung. 10. und folg.
- Wiesen**, verschiedene Arten derselben. 303. Ihre Bereitung. 304. Düngung. 308. Bestes Wasser dazu. 309.
- Winter** oder Kammer: Weyher. 9. und folg.
- Ziegel** Kalk: und Gypsbrennungen. 131.
- Zusammenhang** der flüssigen Körper unter sich. 372. Zusammenhang mit dem Eisen. 377.
- Zusammenhang** der Eisen. 393.
- Zwoe** unendlich kleinen Ebene gegen einander einetley Wengeltisches. 98. und folg.

Tab. I

K



F







Stanford University Libraries



3 6105 005 484 196

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

--	--

